



Poruchy výživy ve stáří

Senioři – nejohroženější skupina

náklady spojené
s léčbou následků
malnutrice dosahují
dvojnásobné výše
než v případě
obezity

v České republice se náklady na léčbu
malnutrice pohybují kolem 60 miliard Kč

jen 40 % hospitalizovaných
pacientů zkonzumuje
nemocniční stravu



Prevalence malnutrice u hospitalizovaných geriatrických pacientů

- Ek et al. (1990) 482 pacientů / 28,5 %
- Lansey et al. (1993) 47 pacientů / 45 %
- Potter et al. (1995) 69 pacientů /22 %
- Gariballa et al. (1998) 201 pacientů /31%
- ESPEN (2009) víc než 50%

Corish, Kennedy. Protein-energy undernutrition in hospital in-patients. British Journal of Nutrition (2000), 83, 575-591.



Malnutrice (ESPEN Guidelines 2015)

- deficit, přebytek/nerovnováha energie, proteinů a nutrientů způsobuje měřitelné vedlejší účinky na tkáně, funkce a výsledný klinický stav

BMI < 18,5 kg/m²

Kombinace

- úbytek na váze >10% za ne definované období nebo >5% za 3 měsíce
- BMI < 20 pod 70 let / BMI < 22 nad 70 let
- FFMI <15 u mužů a 17 kg/m² u žen



Klasifikace malnutrice

- **Lehká** BMI >18

Pokles hmotnosti méně než 10% za 6 měsíců,
bez somatických a funkčních poruch

- **Středně závažná** BMI 16-18


Pokles hmotnosti < 10 %
úbytek podkožního tuku, nejsou funkční poruchy

- **Těžká** BMI <16

Pokles hmotnosti o 15 %, deplece podkožního tuku, svalová
atrofie, otoky, špatné hojení ran, nízká vitální kapacita

Sarkopenie

- úbytek svalové hmotnosti a svalové síly
 - jedna z hlavních příčin geriatrické křehkosti (frailty)
 - pokles svalové hmoty maskován obezitou s množstvím tuku (sarkopenická obesita)
- 50 % nad 80 let
- RF - fyzická inaktivita, genet.faktory,kouření,alkohol, špatná výživa,hormon.změny,zvýš.hladina prozánět. cytokinů
 - snížení fyzické aktivity, zvýšení rizika pádů zhoršení mobility a soběstačnosti



Důsledky malnutrice

- klesá výkonnost dýchacích svalů, zhoršení plicní ventilace, riziko pneumonie
- zhoršení hojení ran, tvorba dekubitů, imobilizační syndrom
- zhoršení chronických onemocnění včetně kognitivního deficitu
- prodlužuje se hospitalizace
- stoupá mortalita



Příčiny malnutrice u seniorů

- multifaktoriální (změny trávicího traktu, chronické onemocnění, psychické poruchy, farmaka, socioekonomické faktory)
- změna stavby těla (svalová hmotnost ve věku 70 let klesá ve srovnání s věkem 30 let ze **30 na 17%**, tuk stoupá ze **14 na 30%**, obsah vody klesá na 53%)
- častý výskyt GIT onemocnění (27 % přijímaných seniorů)
- poruchy dentice (osteoporóza, parodontóza, snížená péče o chrup)
- dysfagie (pseudobulbární paralýza po CMP, Alzheimerova demence, Parkinsonova nemoc)
- častější výskyt refluxní choroby a peptických vředů (NSAID)
- zpomalené vyprazdňovaní žaludku, změny sekrece GIT hormonů
- změny architektoniky klků, bakteriální dysbalance, nárůst divertikulární nemoci a karcinomu tračníku

Příčiny malnutrice u seniorů

- psychické poruchy –deprese nebo demence (pokud je zajištěna adekvátní péče nemusí vést ke snížení příjmu)

88% pacientů s demencí nedosahuje potřebného kalorického příjmu a 37% nepřijme doporučené množství proteinu

Young KW, Greenwood CE. Shift in diurnal feeding patterns in nursing home residents with Alzheimer's disease. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 56, 2001.

- ekonomika – nedostatek financí pro nákup stravy
- sociální faktory – zhoršení soběstačnosti, pokles IADL, neschopnost nakoupit, navařit
- polypragmasie (17% populace / 30% preskripce) –anorektický efekt léčiv

Diagnostika malnutrice


- Nutriční anamnéza
- Dotazníky : Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002), Mini Nutritional Assessment -Short Form (MNA-SF), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)
- Antropometrické měření (obvod paže, kožní řasa nad tricepsem)
- Laboratorní metody (albumin, bílkovina, prealbumin, transferin, cholesterol, ŠŽ, kreatinin, anemie, lymfopenie)
- Funkční stav svalové tkáně- síla svalového stisku(dynamometr)
- Zobrazovací metody - množství svalové hmoty (CT, MR, DXA, bioimpedance nebo experimentální podvodní vážení)

MNA-SF (Mini-nutritional assessment-short form)

- Došlo v posledních 3 měsících ke ztrátě chuti k jídlu, zažívacím potížím nebo poruchám přijímaní potravy
- Úbytek hmotnosti poslední 3 měsíce
- Pohyblivost/ Mobilita
- Prodělal v posledních 3 měsících akutní onemocnění, úraz, psychické trauma?
- Psychický stav
- BMI

Hodnocení : 12-14 bodů : norma

11 bodů a méně : porucha výživy/ podvýživy



Výživa seniorů

- Příjem energie 1,3 násobek BMR (bazální metabolické potřeby), při potřebě nárůstu váhy 1,7 BMR
- Protein 1-1,2g/kg/den (u malnutrice 1,5g/kg/den)
- Tuky 30% celkového energetického příjmu
- Sacharidy 55-60% (omezit jednoduché, nutno využít komplexní sacharidy)
- Vláknina 20-25 g
- Tekutiny 30 ml /kg
- Minerály a vitamíny

Enterální výživa

- fortifikace diety – modulární dietetika
- první volba enterální cesta (sipping)
(podmínka nepoškozený GIT, nutno zachovat objem stravy)
- NGS- krátkodobé řešení hospitalizovaných seniorů
- NJS – noční režim v kombinaci s perorálním příjmem
- PEG – perkutánni endoskopická gastrostomie nebo gastrojejunostomie
- chirurgická gastrostomie nebo nutriční jejunostomie

Parenterální výživa seniorů

- věk není kontraindikací
- pokud pacient hladoví více než 3 dny a pokud není možný enterální příjem
- pokud je orální nebo enterální příjem nedostatečný více než 7-10 dnů
- použít ihned pokud není možný orální nebo enterální příjem (přštěle)
- centrální/periferní PEV

u geriatrických pacientů nedochází k specifickým komplikacím ale komplikace jsou častější vzhledem polymorbiditě



Demence a výživa



Clinical Nutrition

Volume 34, Issue 6, December 2015, Pages 1052-1073



ESPEN Guideline

ESPEN guidelines on nutrition in dementia

Dorothee Volkert ^{a,✉,✉}, Michael Chourdakis ^b, Gerd Faxen-Irving ^c, Thomas Fröhwald ^d, Francesco Landi ^e, Merja H. Suominen ^f, Maurits Vandewoude ^g, Rainer Wirth ^{a,✉,✉}, Stéphane M. Schneider ⁱ

Demence a výživa

- We recommend screening every person with dementia for malnutrition. In case of positive screening, assessment has to follow. In case of positive assessment, adequate interventions have to follow
- We recommend the use of ONS to improve nutritional status.
- We recommend that each decision for or against artificial nutrition and hydration for patients with dementia is made on an individual basis with respect to general prognosis and patients' preferences.

Demence a výživa

- We recommend **against the initiation of tube feeding** in patients with severe dementia
- We recommend **against the use of artificial nutrition** (enteral nutrition, parenteral nutrition and parenteral fluids) **in the terminal phase of life**

Závěr

- u seniorů je výskyt malnutrice velmi častý
- malnutrice zvyšuje morbiditu a mortalitu geriatrických pacientů, prodlužuje délku hospitalizace a zvyšuje náklady na léčbu
- včasná diagnostika je klíčová pro intervenci, bez ní mohou být následky malnutrice fatální
- v terminální fáze života dementních pacientů není nutriční podpora doporučována



87-letý Jiří Soukup – nejstarší český maratonec |