



Sociální deprivace seniorů

Deprivace

- nedostatečné uspokojení důležité psychické, či fyzické potřeby jednotlivce
- nedostatek prokazovaného a vnímaného osobního respektu, pocitovaného bezpečí, sdílené lásky nebo vzájemných sociálních vazeb, ale i osobního strádání z nedostatku dalších smyslových podnětů.

Původ slova

- privō* – zbavit
- deprivation* – odpírání
- deprivace* –
 - ztráta, zbavení, nedostatek něčeho,
 - utrpení z nedostatku smyslových podnětů
 - dlouhodobý nedostatek tělesných a psychických potřeb, smyslových podnětů

Sociální deprivace

- sociální deprivace* - ztráta sociální identity
 - ztráta kontaktů s blízkými
 - ztráta zaměstnání
 - ztráta bydliště
 - ztráta rodiny a blízkých - odmítnutím vlastní rodinou a blízkými

Efekty deprivace

- odpíráme-li někomu
lásku, přátelství,
zájem, naslouchání,
tedy to, na co by měl
mít z naší strany
nárok, posilujeme v
něm pocity zklamání
a deziluze a
nedostatku



Senioři a deprivace

- inventura událostí druhé poloviny života
- 5 – 6 syndrom prázdného hnízda
- 5 – 6 ukončení aktivního zaměstnání
- 5 – 7 snížení životní úrovně
- 5 – 7 ztráta společenského uznání
- 5 – 9 ztráta partnera, blízkých
- 6 – 9 výskyt chronických chorob,
chronické bolesti



**V dětství děláte opičky
do zrcadla, ve středním
věku Vám to zrcadlo
vrací**

Inventura událostí druhé poloviny života

6 - 9 uvědomění si ztráty výkonnosti

7 – 9 pocit neužitečnosti

7 – 9 ztráta společenských kontaktů

**7 – 9 závislost na okolí v běžných
činnostech**

7 – 9 institucionalizce

**Ohнете се,
абысте си завázали tkaničky,
а najednou se sami sebe ptáте:**

**Co bych tak ještě mohl udělat,
když už jsem tady dole ? ☺**

Běžný smutek denního života

- je považován za běžný **atribut stáří**
- vede k **přehlížení příznaků deprese**
- vede k **poddagnostikování deprese**

Deprese

□ 12-15% ve vlastním
prostředí

□ 30% v institucích

výskyt deprese se bude zvyšovat

Rysy deprese ve stáří

- patická depresivní nálada, smutek**
- zpomalené psychomotorické tempo**
- poruchy subjektivního vnímání – negativizmus, pocity zbytečnosti**
- nedostatek sebedůvěry, nízké sebehodnocení**
- poruchy spánku, nechutenství**
- poruchy soustředění, paměti**
- pocity beznaděje, sebeobviňování**
- ztráta zájmů, kontaktů, osamělost**
- časté myšlenky na smrt**
- somatizace**

Realita

- ✓ 3 okresy jižní Moravy
- ✓ 161 probandů, 62 mužů, 101 žen žijících ve vlastním prostředí
- ✓ výskyt deprese – 18%, DG 3%
- ✓ celkový počet užívaných léků u depresivních o 1,5 – 2 druhy
- ✓ vyšší výskyt hypertenze, horší výsledky kognitivního testování, horší výsledky ADL, IADL u depresivních

Záchyt deprese

Otázka	Odpověď
Jste v zásadě spokojen(a) se svým životem?	Ano – Ne
Opustil(a) jste mnoho ze svých aktivit a zájmů?	Ano – Ne
Máte pocit, že Váš život je prázdný?	Ano – Ne
Pociťujete často nudu, prázdnотu?	Ano – Ne
Máte většinou dobrou náladu?	Ano – Ne
Obáváte se, že se vám přihodí něco zlého?	Ano – Ne
Jste většinou šťastný (šťastná)?	Ano – Ne
Cítíte se často bezmocný (bezmocná)?	Ano – Ne
Zůstáváte raději doma, než byste šel (šla) ven a podnikal(a) nové věci?	Ano – Ne
Máte pocit, že máte více problémů s pamětí než ostatní?	Ano – Ne
Myslíte, že je pěkné žít v této době?	Ano – Ne
Tak, jak jste na tom právě nyní, připadáte si bezcenný (bezcenná)?	Ano – Ne
Cítíte se plný (plná) energie?	Ano – Ne
Pociťujete svou situaci jako beznadějnou?	Ano – Ne
Myslíte si, že většina lidí je na tom lépe než vy?	Ano – Ne

Každá tučně označená odpověď = 1 bod. Hodnocení: 0–5 bodů norma, 6 a více bodů suspektní deprese (česká standardizace podle Tošnerové). Původní hodnocení z r. 1999: 0–7 norma, 8–12 mírná deprese, 13–15 těžká deprese.

Léčba deprese

- **sekundární deprese** – deficit B12, D,
tyreopatie, srdeční selhání
- **sezónní deprese** –
 - ✓ pobyt venku
 - ✓ sluneční záření
 - ✓ aplikace bílého světla

Kvalita léčby deprese dle Radkina Honzáka

- **POUZE ANTIDEPRESIVA!!! Šolíchání anxiolytiky je jen na škodu!!!**
- nejlepší - po zacvičení sám PL
- velmi dobré - ve spolupráci s psychiatrem
- dobré - odeslat psychiatrovi s vysvětlením
- slabé - odeslat tamtéž bez vysvětlení
- ničemné - ignorovat depresi

Další faktory potencující vznik sociální deprivace

- miniaturizace, dravý vývoj techniky, složité ovládání přístrojů
- senzorické deficity
- kognitivní deficit
- inkontinence

Technika

- ❖ mobilní telefony
- ❖ běžné kuchyňské přístroje s displayem
- ❖ automatická pračka
- ❖ vstup do domů – zabezpečení
- ❖ narůstající provoz na silnicích i chodnících
- ❖ pojízdná schodiště

Senzorické deficity


- zrak** – zhoršení orientace mimo domov
- sluch** – ztráta komunikačních schopností
- hmat** – ztížení ovládání tlačítek, nehody v obchodech
- čich** – nevnímání vlastního pachu

Kognitivní deficit

- subjektivní kognitivní deficit – SCI
- mírný kognitivní deficit – MCI
- lehká demence
 - *náhled, obava z kontaktu s okolím*
- střední demence
- těžká demence
 - *u původně společenských jedinců nevhodné chování, pečovatelé se obávají kontaktu s veřejností*



Vém věku už mi nevadí,
když se mé myšlenky někam
zatoulají,
jen se vždycky trochu bojím,
jestli se ještě vrátí.




Rotterdamská studie

- **5% populace 65leté trpí demencí**
- **každých 5 let se výskyt *zdvojnásobí***
- **50-60% demencí je Alzheimerova choroba**
- **každý pátý 80letý trpí Alzheimerovou chorobou**
- **průměrná praxe praktického lékaře má 20-22 klientů s demencí**
- **diagnostikováno a léčeno je pouze 10% z nich**



Realita



Léčba kognitivních poruch

- ❖ léčba sekundárních kognitivních poruch – hypovitaminóza B12, D, hypotyreóza, arytmie, metabolické poruchy
 - ❖ aktivátory cholinesterázy – donepezil, rivastigmin
 - ❖ inhibitory nikotinových receptorů – galantamin
 - ❖ blokáda aktivačních aminokyselin – memantin
 - ❖ blokáda kalciových kanálů – nimodipin, nitrendipin
- nootropika neprokázána jako efektivní terapie*

Inkontinence

- vždy negativně ovlivňuje sociabilitu seniora**
- obava z nedostupnosti WC**
- obava ze společensky neúnosných situací**
- omezení vycházení na veřejnost**
- omezení zvaní návštěv do domu/bytu**

Výskyt inkontinence

- 5-8% světové populace
- méně než polovina hledá pomoc
- v ČR 20% žen okolo 45 let věku
- výskyt s věkem stoupá
- celkem 510 000 žen a 160 000 mužů
- v institucích 32-70% inkontinentních
- s prodlužující se střední délkou života bude celkový počet inkontinentních narůstat

Typy inkontinence

- **urgentní inkontinence** – naléhavé nucení s únikem
- **motorická** – stahy detruzoru
- **senzorická** – hypersenzitivita detruzoru (litiáza, BHP, nádor, cystitida)
- **stresová inkontinence** – únik moči při zvýšení nitrobřišního tlaku bez stahu detruzoru
- **smíšená inkontinence** – až 40%
- **reflexní inkontinence** – hyperreflexie detruzoru, uvolnění uretrálního mechanizmu
- **paradoxní inkontinence** – ischuria paradoxa

Cíle léčby inkontinence

- zajistit kontinenci**
- zachovat renální funkce**
- zabránit uroinfekci a komplikacím**
- umožnit nemocnému běžné sociální aktivity**
- předcházet technickým problémům**
- udržet přiměřenost ekonomických nákladů**

Principy léčby inkontinence

- úprava režimu**
- farmakoterapie**
- rehabilitační přístupy**
- operační řešení**
- reflexní terapie**

Sociální deprivace seniorů

- problém v mnoha ohledech preventabilní
- problém často přehlížený, a tudíž jeho příčiny zůstávají nediagnostikované
- problém v mnoha ohledech řešitelný

Děkuji za pozornost



webpark.ru

<http://go.funpic.hu>