


Definice: Popáleninové trauma vzniká dostatečně dlouhým, přímým nebo nepřímým působením nadprahové hodnoty tepelné energie na lidský organismus

Hodnocení rozsahu popálenin dle Lund- Browderových tabulek



Hodnocení hloubky popálení

I. Stupeň	<u>Povrchové popálení</u>
II. Stupeň	I.-IIa. St
III. stupeň	<u>Hlubkové popálení</u> IIb-III. st



Kritické popáleninové trauma

0-3 roky: nad 15%TBSA
3-10 let: nad 20 % TBSA
10-15 let: nad 30% TBSA
Nad 15 let a dospělí: nad 40 %TBSA

První pomoc

- Chladit vodou o teplotě nižší než 8°C
- **Nechladit ledem** (prohloubení rány)
- Maximálně do rozsahu popálenin do 5% TBSA

Escharotomie



Nekrektomie



Léčba na JIP

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| • Zajištění DC | • Zajištění invaz. vstupů | • Kortikosteroidy |
| • Tekutinová resuscitace | • Očkování | • Péče o popálené plochy |
| • Analgosedace | • Prevence TEN | • RHB |
| • Monitoring VF | • Vasopresory | |
| • Odběr biologického materiálu | • ATB | |