

# INFEKČNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ

1

# INFEKČNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ

- infekce způsobené:

- bakteriemi
- houbami
- parazity
- viry
- priony

# ZÁKLADNÍ POJMY

## ○ Bakteriemie

- stav, kdy v krvi kolují nevirulentní nebo málo virulentní bakterie, jsou imunitním systémem rychle rozpoznány a ničeny
- běžný stav (př.: po extrakci zuba)

# ZÁKLADNÍ POJMY

## ○ Toxemie

- bakteriální toxiny v krvi po vstřebání z potravy (stafylokoky), po poranění (*Clostridium tetani*)
- alimentární enterotoxikóza (hodiny)
- regresivní změny parenchymových orgánů (játra, srdce, ledviny) různého stupně

# ZÁKLADNÍ POJMY

## ○ Sepse/ septikemie

- systémová odpověď organismu (SIRS) na generalizovanou infekci, spojená s dysfunkcí orgánů
- život ohrožující stav
  - nejč. pyogenní infekce – hemolyt. streptokoky a stafylokoky

## ○ morfologické projevy sepse na vnitřních orgánech

- slezina – septická slezina
- zvětšení LU - reaktivní změny
- septické mikroabscesy – metastazující sepse

# SIRS – syndrom systémové zánětlivé odpovědi

- v počátku infekce zánět lokalizovaný, kontrolovaný imunitním systémem
  - pro další vývoj rozhodující **stav pacienta** (věk, stav výživy, genetika, komorbidita, léčba)
  - klíčová **reakce s tvorbou cytokinů**
- **silná cytokinová reakce** > rychlá aktivace makrofágů a granulocytů > **smrt většiny mikrobů** > pozdní fáze - k sepsi nedochází, **množství cytokinů klesá** > reakce je mírná, spontánně odeznívající
- **nedostatečná cytokinová reakce** > malá reakce makrofágů a granulocytů > pozdní fáze - **většina mikrobů přežívá a množí se v cirkulaci** > výrazně se **zvyšuje hladina cytokinů** >>> systémová reakce na zánět = **SEPSE**  
riziko vyčerpání a zhroucení imunitního systému  
> septický šok > smrt

# ZÁKLADNÍ POJMY

## ○ Pyemie

- v krvi shluky mikrobů – tzv. vegetace
- původ: hnisavá tromboflebitida, endokarditida
- dělení:
  - periferní
  - centrální
  - portální
  - umbilikální (novorozenci)

# ZÁKLADNÍ POJMY

## ○ **Toxinfekce** – alimentální nákazy

- vyvolány mikroorganismy (často ze zvířat), uvolňujícími ve střevě endotoxiny, které poškozují sliznici střeva a vyvolají onemocnění
  - *Campylobacter jejuni* – drůbež, mléko: enteritis, kolitis
  - *Shigella dysenterie* – úplavice: pseudomembranózní a ulcerativní kolitis, HUS

## ○ **Intoxikace** (enterotoxikózy)

- jsou onemocnění, způsobená potravinami, ve kterých se pomnožily bakterie, které do jídla uvolnily toxiny, a které vyvolají otravu(stafylokokový enterotoxin, botulotoxin)

# KOKOVÉ INFEKCE

## ○ Stafylokoky (G+)

- ohraničená (+/-) hnědavá ložiska v kůži
  - furunkl, karbunkl, panaritium
- staf. masttitida kojících
- staf. osteomyelitida (při sepsi)

## ○ Streptokoky (G+)

- **s. alfa hemolytické**

- s. mutans – zubní kaz (sacharáza > k. mléčná > demineralizace)
  - s. pneumoniae = pneumokok (záněty HCD, lobární pneumonie – fibrinózní krupózní zánět, sepse, meningitis)

- **s. beta hemolytické**

- s. pyogenes- angína, spála (erytrogenní toxin), erysipel (růže), sepse. Riziko komplikací - revmatická horečka, postinfekční glomerulonefritida
  - viz patologie KVS bude odpřednášeno

# NEISSERIOVÉ INFEKCE (G-DIPLOKOKY)

## ○ **N. meningitidis**

- n. meningitida – sporadicky, epidemie v dětských kolektivech
- vstup nosohltanem > meniny > !!! m. sepse
  - krvácení do kůže
  - krvácení do nadledvin – Waterhouse-Friedrichsen syndrom (DIC)

## ○ **N. gonorrhoeae**

- STD
- muži - uretritida > prostata > semenné váčky
- ženy- kolpitida, cervicitida > endometritida > tuby > ovárium > zánětlivý adnextumor > sterilita


# HNISAVÁ LEPTOMENINGITIDA (POVRCHOVÝ HNISAVÝ ZÁNĚT)

kopie



# HNISAVÁ LEPTOMENINGITIDA

(POVRCHOVÝ HNISAVÝ ZÁNĚT)



1 Mozková tkáň  
2 Neutrofily  
→ Pia mater

# KORYNEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE

- **Corynebacterium diphtheriae** (G+ tyčka)

- **Záškrt**

- přenos vzduchem, dříve epidemie
- vyvolává těžké onemocnění HCD s tvorbou pablán
- fibrinózní povrchový zánět sliznic – **bude probráno obecná patologie zánět**
- riziko udušení
- komplikace: myokarditida, obrna
- po roce 1946 – povinné očkování

## KOLIBACILÁRNÍ INFEKCE

- infekce způsobené G- bakterií **Escherichia coli**
  - součást běžné mikrobiální flóry tenkého i tlustého střeva
- infekce **GIT traktu** - průjmová onemocnění
  - dle produkovaného toxinu
    - ETEC: cestovatelské průjmy v tropech
    - EPEC: těžké průjmy novorozenců a kojenců s dehydratací
    - EIEC: hemoragické průjmy větších dětí a dospělých s horečkou připomínající úplavici
    - EHEC: Ag O157, produkce verotoxinu - poškození ery > agregace trombocytů > vznik hyalinních trombů >>**HUS**

## KOLIBACILÁRNÍ INFEKCE

- infekce **extraintestinální** - většinou endogenní při oslabení imunity
  - většinou neobvyklé sérotypy, odolné k běžným ATB
  - infekce močových cest
  - infekce žlučových cest
  - kojenci a malé děti: meningitidy, sepse

## SALMONELÓZY (G- TYČKY)

### ○ **S. typhi** – typhus abdominalis

- alimentární nákaza > bakteriemie > pomnožení ve žlučníku > žlučí zpět do střeva > maximum zánětu v ileu
- stádia nemoci
  - pomnožení v lymfatické tkání ilea - tyfomy > nekrózy a příškvary sliznice > vředy > hojení
- komplikace
  - perforace, krvácení, nosičství (žlučník)

- **S. paratyphi** - paratyfus

- mírnější průběh

- **S. typhimurium, S. enteritidis** - gastroenteritidy

- přenos kontaminovanou živočišnou tepelně špatně upravenou potravou
- ileum, kolon - eroze a smíšená zánět. celul. LP
- komplikace vzácné (meningitis, endokarditis)

## ANAEROBNÍ INFEKCE


- růst v prostředí s velmi malým obsahem kyslíku
  - pomalý růst
- 
- **sporující – klostridie (G+tyčky)**
  - **nesporující**
    - většinou nepatogenní, součást běžní flóry
  - onemocnění v místech, kde je nižší sycení kyslíkem
    - rány s cizím tělesem, dutiny se sekretem > **abcesy, granulomy, píštěle + toxemie**

## ○ Klostridiové infekce

- **tetanus** (*C. tetani*)
  - toxin proniká podél nervů do míchy (přední rohy)
  - tetanické křeče, risus sardonicus
  - histol.: Zenkerova vosková nekróza svalů
- **plynatá snět'** (*C. perfringens*)
  - gangrena emphysematosa
- **botulismus** (*C. botulinum*)
  - toxin ze špatně tepelně upravených konzerv
  - diplopie, poruchy polykání, svalové obrny > smrt
- **pseudomembránzní kolitida** (*C. difficile*)
  - po ATB terapii

# PSEUDOMEMBRANÓZNÍ KOLITIDA (ETIOLOGIE CLOSTRIDIE)



- 1 Pablána s koloniemi bakterií  
2 Reziduální sliznice



# AKTINOMYKÓZA

- aktinomycety (*A. israeli*) G+ vláknité bakterie > aktinomykotické drúzy
- běžně v dutině ústní, v periodontu při paradentóze
- chronický aktivní zánět
  - **cervikofaciální forma**
    - zánětlivý infiltrát v DÚ, tkáň velmi tuhá
    - postiženy měkké tkáně i mandibula, časté kožní píštěle
  - **intrathorakální** - postiženy plíce
  - **abdominální** - zdroj: **IUD** (zánětlivý adnextumor ! sterilita) appendix, plíce- provalením

# AKTINOMYKÓZA



## MYKÓZY


- houbové infekce způsobené mikromycetami tvořenými septovanými či neseptovanými myceliemi
- dělení
  - povrchové (dermatomytózy - kůže, adnexa)
  - **hluboké** (orgánové, systémové včetně postižení kůže; imunokompromitovaní)
- diagnostika v tkáňových preparátech
  - speciální barvení - PAS, Grocott

## HLUBOKÉ MYKÓZY

### ○ Kandidózy (C. albicans, ....)

- C. albicans- potenciální patogen u imunokompromitovaných, existence i vysoce virulentních kmenů napadajících zdravé
- tvoří pablánu
- př.: stomatitida (soor), ezofagitida, vulvovaginitidy (! pro plod), bronchopulmonální formy
- při hematogenní diseminaci: ledviny, mozek, játra, plíce (granulomatózní ložiska)

# MYKOTICKÁ EZOFAGITIDA PŘEHLED (GROCOTT)



## HLUBOKÉ MYKÓZY

### ○ Aspergilóza (mnoho druhů)

- septovaná mycelia
- přenos vzduchem/ alimentárně (podeštýlka, trus ptáků, prach..)
- postižení plic (hemoragické pneumonie s infarkty - angiotropismus s trombózami)
- postižení mozku - zdroj očnice, sinusy, střední ucho...


# HLUBOKÉ MYKÓZY

- **Mukormykózy** (rody Mucor, Rhizopus...)
  - neseptovaná mycelia
  - plicní a rhinocerebrální (mortalita až 100%) forma
- **Pneumocystóza** (P.carinii)
  - progresivní intersticiální pneumonie s vysokou mortalitou
  - u osob s poruchou celulární imunity (AIDS), u nedonošenců
- **Kryptokokóza** (C. neoformans - kvasinka)
  - výskyt: půda, rostliny, živočichové
  - nejčastěji postižení plic a CNS

# PNEUMOCYSTOVÁ PNEUMONIE



1. Interalveolární septa prostoupená lymfoplazmocelulárním infiltrátem
2. Pěnité hmoty intraalveolárně



# PROTOZOÁLNÍ INFEKCE

## ○ Trichomoniáza

- *Trichomonas vaginalis*
- hnisavé kolpitidy STD

## ○ Toxoplazmóza

- *Toxoplasma gondii*
- antropozoonóza (oocysty přenášené z trusu koček - definitivní hostitel; mezihostitel vepř, králík, ovce, člověk)
- přenos alimentární, transplacentární
  - rizika pro plod: potrat, poškozený mozek, oči; encefalomyelitis s pseudocystami a nekrózami; epilepsie
  - rizika pro ostatní: toxoplazmová granulomatózní lymfadenitis; osoby s poruchami imunity: encefalomyelitis, pneumonie, myokarditis

# PROTOZOÁLNÍ INFEKCE

## ○ Amébová dyzenterie

- Entamoeba histolytica
- těžké průjmy s ulceracemi střeva a abscesy jater

## ○ Malárie

- původce Plasmodia (P. falciparum, vivax, ovale, malariae....)
- přenos moskyty druhu Anopheles
- celosvětový výskyt, ročně zemře až 1,5 milionů lidí
- nepohlavní vývoj v lidském těle: krev > hepatocyty > množení parazita a zánik hc > erytrocyty – pomnožení a rozpad ery = horečky, zimnice, třesavka v cyklech > nakažení moskyta při sání krve
- současně aktivace systému mononukleárních fagocytů: zvětšení jater a sleziny; při shlukování ery (p. falciparum) mozkové ischemie, myokarditis, DIC > !+

# PARAZITÁLNÍ INFEKCE


## ○ Enterobióza

- Enterobius vermicularis (nejč. střevní parazit u nás – roup dětský)
- přenos fekálně orální cestou
- appendicopathia oxyurica

## ○ Askarióza

- Ascaris lumbricoides – škrkavka dětská
- rozvojové země
- přenos vajíček potravou či vodou
- larvy v tenkém střevě > krví do srdce a plic – škrkavková pneumonie, Löfflerův syndrom

# PARAZITÁRNÍ APENDIKOPATIE – ROUP DĚTSKÝ V LUMEN



# PARAZITÁLNÍ INFEKCE

## ○ Teníozy

- *T. saginata* (hovězí maso)
- *T. solium* (vepř)= cysticerkóza
  - mezihostitel: vepř, skot, člověk
  - definitivní hostitel (i člověk) postižení střeva; malé potíže
  - mezihostitel !!! v orgánech a ve svalech (u člověka i v **mozku, míše, oku, plících, srdeci...**) váčkovitá larva- boubel
  - infekce pozřením nedostatečně upraveného masa

## ○ Echinokokóza

- *E. granulosus* (měchožil zhoubný)
  - psovité šelmy
  - přenos **larev** do mezihostitele (člověk) potravou – tenké střevo > **játra** (cysty). Riziko ruptury a alergické anafylaktické reakce
- *E. multilocularis*
  - liška, vlk, pes – Evropa, Sibiř, Kanada
  - přenos obdobný > mnohokomorové cysty v **játrech a plících** bez pouzdra > riziko metastazování, dif. dg.tumor (portální HT, ascites), často fatální

# VIRY

- charakteristika

- závislost na žijící buňce, ve které se množí
- pouze 1 druh NK: DNK x RNK
- malá velikost, prostupnost antibakteriálními filtry

- cesty infekce

- RT (RS virus, chřipka)
- GIT (hepatitis, poliomyelitis)
- transplacentární (CMV, zarděnky)
- krví, krevními deriváty, tělními tekutinami (hepatitidy, HIV)
- hmyzem (klíšťová encefalitis)

# VIRY

- projevy virové infekce

- nekrózy povrchového epitelu, pablány, hemoragie u akutní fáze zánětu
- v zánětlivém infiltrátu dominují lymfocyty
- někdy tvorba inkluzí – intranukleárních (CMV), intracytoplazmatické (rabies)
- někdy tvorba mnohojaderných buněk (spalničky, zarděnky, RSV)

# VIRY

- **typy infekcí:**

- **akutní** (chřipka)

- krátká inkubační doba, trvání dny (týdny)

- **chronické** (HPV)

- roky, někdy spontální vymizení, jindy progrese v neoplazii

- **latentní** (HSV)

- po iniciálním infektu různě dlouhlé bezpříznakové latentní období, při snížení imunity reaktivace

- **perzistující** (CMV)

- tvorba virionů v infikovaných buňkách (inkluze), ale bezpříznakové

## AKUTNÍ VIROVÉ INFEKCE- PŘÍKLADY

- Variola
- Varicella/ herpes zoster
- HSV - př. latentní infekce viz orální patologie
- EBV - infekční mononukleóza
- CMV - př. perzistující infekce ! přenosu na plod, ! generalizace u imunokompromitovaných
- Spalničky (morbilli)
- RSV- Adamsova pneumonie
- Příušnice - komplikace orchitis po pubertě


## KORONAVIROVÉ INFEKCE

- obalené RNA viry
- infikují obratlovce (hlavní rezervoár netopýři)
- **běžné** lidské koronaviry
  - nízká virulence
  - mírné infekce HCD
- **vysoce patogenní** koronaviry
  - epidemie SARS-CoV 2003 (cibetky, netopýři) R4
  - epidemie MERS-CoV 2012-2013 (velbloudi, netopýři)  
R1
  - epidemie Covid 19 2019-?

## CHRONICKÉ VIROVÉ INFEKCE- PŘÍKLADY

- HPV
  - low risk HPV
  - high risk HPV (16,18,31,33,35)
  - vztah k onkogenezi viz patologie genitálu a nádory orofaciální oblasti - bude odpřednášeno
- Hepatitidy (akutní i chronické infekce): viz patologie jater - bude odpřednášeno


# CONDYLOMA ACCUMINATUM



Papilomatózní uspořádání dlaždicového epitelu



# DYSPLÁZIE DĚLOŽNÍHO ČÍPKU CIN II



Cytonukleární atypie v  
dolních 2/3 šíře epitelu,  
koilocytóza

# HIV INFEKCE

- HIV typ 1 a 2 (retrovirus); 1981
  - nyní 37 milionů HIV+
  - většina v subsaharské Africe, 40 % žen a lidí mezi 5-24 lety
  - v ČR nyní cca 4000 případů
- Cesty nákazy: sexuální styk, krví, spermatem, transplantovanými orgány, vertikální přenos z matky na dítě, kojení
- cílové bb: CD4+ T lymfocyty, makrofágy a dendritické bb


# STÁDIA HIV INFEKCE

- **Akutní retrovirový syndrom** (glandular fever-like illness) 3-4 týdny po infekci
- **Bezpříznakové stádium** (i několik let)
- **Perzistující generalizovaná lymfadenopatie, časné symptomatické stádium** (moučnivka, opary, průjmy, ztráta váhy, noční pocení,...)
  - signifikantní pokles CD4 lymfocytů
- **AIDS, pozdní symptomatické stádium (opportunní infekce a nádory)**: pneumocytová pneumonie, CMV, herpetické infekce, cerebrální toxoplazmóza, atypické mykobakteriózy, systémové mykotické infekce, cryptokokózy, parazitární infekce GIT,...., Kaposiho sarkom (HHV typ 8), non-Hodgkinovy lymfomy (EBV))

## PRIONOVÉ INFEKCE

- **PRION** (proteinaceous infectious particle)
  - normální fyziologický v řadě buněk = nestabilní
  - abnormální= s pozměněnou konformací; stabilní, neodbouratelný; původce prionů
- Papua Nová Guinea - kanibalové - KURU
- Creutzfelt-Jakob (JCD)
  - sporadicky, familiárně, iatrogenně
  - variantní CJD (Velká Británie) potrava???
- Viz patologie CNS - bude odpřednášeno

# CREUTZFELDTOVA-JACOBOVA NEMOC



Spongiformní dystrofie



# DĚKUJI ZA POZORNOST!

