

Epileptický záchvat

Z. Rozkydal

Epilepsie je onemocnění mozku
s opakovanými záchvaty:

Porucha vědomí

Porucha motorických, senzorických,
senzitivních a vegetativních funkcí

Patologické EEG

Příčina:

Idiopatická, posttraumatická, nádorová,
po zánětu

Grand mal – velký epileptický záchvat

Předchází aura:

Senzitivní- mrtvění, pálení, svědění, hučení

Senzorická- zvláštní pocity zrakové, sluchové aj.

Viscerální- palpitace, říhání, tlak v břiše

Psychická- podrážděnost, nedůtklivost
příznaky již viděného a slyšeného

Vlastní záchvat:

Náhlé bezvědomí, pacient upadá na zem

V úvodu: tonické křeče svalů končetin, žvýkacích svalů hrudníku a bránice

Později klonické křeče – nejdříve flekční,
pak extenční

Pomočení, pokálení

Tonická křeč dýchacích svalů- apnoická pauza

Pěna u úst, pohyby očních bulbů

Namáhavé dýchání

Na konci upadá do hlubokého spánku

Pozáchvatový stav:

Spavý, mrákotný, unaven, amnézie

Petit mal – malý epileptický záchvat

Trvá obvykle několik vteřin

Záklon hlavy, rozhození končetin, bleskové křeče

Akinetické záškuby

Absence- zahledení, ztrnulost

Myoklonické záškuby- rozhození, upuštění věci
z ruky

Psychomotorický záchvat

Pacient jeví nezvyklé chování –
Zmatené pobíhání, neadekvátní pohyby, zíve

Status epilepticus

Hluboké bezvědomí, opakující se záchvaty
vícekrát za den

Prevence

Medikace, životospráva, pravidelný spánek
Zákaz alkoholu, jídlo pravidelně a přiměřené množství
Nepoužívat větší množství tekutin
Vhodné pracovní zařazení, psychoterapie

První pomoc

Uložit nemocného, aby se neporanil
Vložit do úst kapesník
Sledovat dýchání
Diazepam i.v.

Léčba

Antiepileptika (Sanepil, Sodanton, Biston,
Mysoline, Heminevrin,
Succilep, Depakine,...)

Životospráva

Operace- odstranění epileptogenního fokusu