


# Ženský pohlavní systém

Aleš Hampl


Říjen 2024




# Funkce ženského pohlavního systému

1. **Oogeneze**
2. **Kopulace** - zachycení spermatu muže
3. **Produkce hormonů**
4. Vytváří prostředí pro **fertilizaci, implantaci a vývoj zárodku**
5. Představuje **porodní cestu**

# Ženské pohlavní orgány - Anatomické poměry 1





# Ženské pohlavní orgány - Anatomické poměry 2



Délka - 3 cm  
Šířka - 1.5 cm  
Tloušťka - 1 cm

# Vaječník - Všeobecné stavba





## Kůra

- Folikuly
- Značně vaskularizované stroma


## Dřeň


- Cévy
- Řídká pojivová tkáň

# Vaječník - Povrch



# Klíčová období vývoje vajíčka - oogeneze





# Oogeneze - celoživotní průběh

Na konci 6. měsíce fetálního vývoje  
~ 6 - 7 milionů oocytů 1. řádu



Atrézie


V době narození  
~ 500 tisíc oocytů 1. řádu




Atrézie  
Ovulace (~ 500 oocytů)

V době nástupu menopauzy  
max. 100 - 1000 zbývajících oocytů


# Oogeneze - produkce pólóvých tělísek




# Oogeneze - stádia vývoje oocytu





# Oogeneze - Celkový obraz stavu uvnitř vaječníku



Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.





# Oogeneze - Primordiální follikuly




Oocyt 1. řádu

- Organely v okolí jádra
- Hojné mitochondrie
- Hojné drsné ER

# Oogeneze - Primární folikuly



Unilaminární






Multilaminární


Zona pellucida  
(5-10  $\mu\text{m}$ )

Granulózní buňky


# Oogeneze - Sekundární (antrální) folikuly



# Oogeneze - Terciární (Gráfův, preovulační) folikul



# Oogeneze - Stěna a okolí terciárního folikulu




## Theca interna

- Vaskularizovaná
- Androstendion - granulózní buňky - estradiol


## Theca externa

- Fibrózní s hladkosval. b.


# Oogeneze - MI oocyt obklopený buňkami corona radiata



# Oogeneze- MII oocyt




## Oogeneze - Ovulace




- iniciace zvýšenou hladinou LH
- ischemie v oblasti stigmatu
- kontrakce hladké svaloviny - theca f. externa

# Oogeneze - Ovulovaný oocyt



# Žluté tělísko = Corpus luteum 1



Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.


## Granulózní buňky - Granulozaluetinové b.

- velké (20-30  $\mu\text{m}$ )
- 80 % CL
- konvertují androstendion na progesteron a estradiol

## Theca interna - Thecaluteinové b.

- menší (10-15  $\mu\text{m}$ )
- vaskularizace - fenestrované kap.
- produkce steroidů

# Corpus luteum 2



Granulozaluteinové buňky

Thecaluteinové buňky

# Corpus luteum 3




Thecaluteinové buňky



Granulozaluteinové buňky

## Corpus luteum 4




### CL graviditatis

- průměr 2 - 3 cm
- udržuje graviditu
- stimulováno choriovým gonadotropinem (HCG)
- maximální ve 2 měsících
- mění se v c. albicans v měsících 4-5



### CL menstruationis

- 10 - 12 dní
- mění se v c. albicans (husté vazivo - kolagen + fibroblasty)

# Corpus luteum & albicans





# Corpus albicans



# Atrezie folikulů

- folikuly ve všech stádiích
- apoptóza folikulárních buněk
- autolýza (autofagie) oocytů
- fagocytóza makrofágy
- nejdéle „přežívají“ zona pellucida a bazální lamina



# Ovariální cyklus - 28 dní

## Preovulační fáze





- dny 1 až 14
- růst a zrání folikulů
- produkce steroidních hormonů

## Ovulace


- den 15

## Postovulační fáze

- dny 16 až 28
- corpus luteum
- produkce progesteronu




Mescher, 2010




# Vejcovod = Ovidukt = Tuba uterina

- spojuje vaječník s dělohou
- délka 12 až 15 cm x 0.7 až 5 cm průměr
- místo oplození a časného embryonálního vývoje





Teachmeanatomy.info




University of Leeds Histology, histology.leeds.ac.uk

# Vejcovod - Ampula





- **velmi zřasená sliznice**
- **podélné řasy**
- **labyrint**

# Vejcovod - Ampula





# Vejcovod - Isthmus



- menší zřasení



# Vejcovod



## Tunica mucosa

- *lamina epithelialis* - jednovrstevný cylindrický epitel
  - 1.) **ŘASINKOVÉ BUŇKY** - mechanický posun vajíčka a embrya
  - 2.) **SEKREČNÍ BUŇKY (PEG)** - produkují výživné látky
- *lamina propria* - řídká pojivová tkáň (značně vaskularizována)

# Děloha = Uterus 1




- **Mechanical protection and nutritional support to developing embryo**
- **Bends anteriorly (anteflexion)**
- **Stabilized by broad, uterosacral, round, and lateral ligaments**


# Uterus 2

Uterine wall ~ 1.5 - 2 cm

1. Endometrium - *T. Mucosa*
2. Myometrium - *T. muscularis*
3. Perimetrium - *T. Serosa*



# Uterus - Endometrium 1



Dartmouth Medical School, Virtual Histology  
<http://www.dartmouth.edu/~anatomy/Histo>

- **lamina epithelialis + lamina propria**
- epitel - **jednovrstevný cylindrický** - **sekreční a řasinkové** buňky
- lamina propria - **řídke pojivo** s mnoha **fibroblasty**, + **hojná základní amorfnní hmota** → **děložní žlázy** - **jednoduché tubulární žlázy** (jednovrstvý cylindrický epitel))

## 1. **Stratum functionalis** (~ 5 mm)

- podléhá dramatickým změnám - menstruační cyklus (řízen hormony)
- zaniká během menstruace!

## 2. **Stratum basale** (~ 1 mm)

- minimální změny během menstruačního cyklu
- zůstává zachováno během menstruace !
- zdroj buněk pro obnovu stratum functionalis !


## Uterus - Endometrium 2

Jednovrstevný  
cylindrický epitel





Endometriální  
žlázky



# Uterus - Endometrium - Cévní zásobení



# Uterus - Menstruační cyklus (28 dní)




**Menstruační fáze (1. - 4. den)**

**Proliferační fáze (5. - 15. den)**  
(řízena estrogyeny)

**Sekreční fáze (16. - 27. den)**  
(řízena progesteronem)



**Ischemická fáze (28. den)**

## Endometrium - Proliferační fáze



- **estrogeny z vyvíjejících se folikulů**
- **novotvorba stratum functionalis**
- **dlouhé a přímé endometriální žlázy - nefunkční**



## Endometrium - Sekreční fáze



Sobotta, 1995


- kontrolována estrogeny a progesteronem
- endometriální žlázy plně funkční, produkce glykogenu
- **zakřivené a dilatované žlázy + dlouhé spirální arterie**

# Endometrium - Menstruační fáze



- absence progesteronu po involuci corpus luteum
- buňky stratum functionalis umírají, tkáň ztrácí anatomickou integritu, rozpadá se a uvolňuje se ze stratum basalis


# Uterus - Myometrium




- **tři propletené vrstvy** hladké svaloviny
- během gravidity - **hyperplazie + hypertrofie** hladkosvalových buněk
- kontrakce vyvolané oxytocinem v průběhu porodu

# Cervix + Orificium externum uteri

- délka 2-3 cm
- **cylindrický** tvar
- cervikální kanál: dutina dělohy - dutina pochvy
- četné **mukózní žlázy**
- mění tloušťku během ovariálního cyklu
- důležitý pro graviditu a porod
- přispívá ke **kapacitaci spermii**



uvahealth.com



Vícevrstevný dlaždicový ep.

Cylindrický ep.

# Cervix



Cervikální žlázy  
(tubulární, rozvětvené, mucus)

Jednovrstevný cylindrický ep.

Přechod - cylindrický na vícevrstevný dlaždicový ep.

Vícevrstevný dlaždicový ep.


a VAGINA

# Vagina 1

- během kopulace přijímá ejakulát
- slouží jako porodní cesta


## 3 vrstvy

- T. mucosa - **vícevrstevný dlaždicový ep. (nekeratinizující)**
- T. muscularis - **dvě vrstvy hladké svaloviny**
- T. adventitia - řídké vazivo





## Vagina 2

Epitelie syntetizují a akumulují **glykogen** (díky stimulaci estrogenu)



# Vagina 3

Preovulační fáze  
(čtyři vrstvy)



Uvolňuje se po ovulaci

- glykogen
- Lactobacillus
- acidifikace

### Cervikální stěr - barvení Giemsa

1 Obsah glykogenu

2


3

4


5

# Labium minus

Pokryto bezchlupou kůží.



Mazové žlázy



# Placenta 1

= přechodně existující orgán

## Functions

- 1) **transport** (voda, kyslík, oxid uhličitý, živiny, protilátky, chem. látky = léky, odpadní látky, ...)
- 2) **metabolismus** (syntéza glykogenu, cholesterol, mastné kyseliny)
- 3) **produkce hormonů**

**steroidy:** progesteron, estrogeny - udržení gravidity

**peptidy:** lidský choriový gonadotropin, lidský placentární laktogen, relaxin, leptin, růstové faktory

(a) Day 5


(b) Day 6

(c) Day 7

(d) Day 9

(e) Day 11


## Implantace



Copyright © Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

**Syncytiotrofoblast invaduje  
do okolního stromatu**

## Placenta 2




(c) 16-day embryo

**Choriové klky** - prstovité výběžky embryonální tkáně, které přicházejí do kontaktu s krvácějícím endometriem


**Deciduální buňky** - fibroblasty endometria (velké, kubické, velmi aktivní proteosyntéza)

**Placenta** - silný disk tvořený choriovými klky a deciduálními buňkami (vytvořena na začátku 4. měsíce)

# Placenta 3



(d) 4½-week embryo




(e) 7-week embryo

**Decidua basalis** - mezi embryem a myometriem

**Decidua capsularis** - mezi embryem a děložní dutinou (postupně se ztenčuje)


diskovitá  
15 - 20 cm  
400 - 600 g

# Placenta 4




## Discoidalis + Hemochorialis

- **pars fetalis** - choriová ploténka, choriové klky (úponové, volné = terminální)
- **pars materna** - decidua basalis
- **intervilózní prostory** - vznikají postupnou expanzí lakun



# Placenta 5



# Placenta 6

Amniový epitel  
(ektoderm)


**Pars fetalis**

Choriová ploténka

Úponové klky

Volné klky

**Pars materna**




# Placenta 7




Choriová ploténka

Úponový  
klk

Volné (terminální) klky  
(průřezy)



# Placenta 8 - Volné klky



Maternální krev


Extraembryonální vaskulatura

Syncytiotrofoblast

# Placentární bariéra


## Do poloviny gravidity

- endotel kapilár
- basal lamina endotelu
- **rosolovité vazivo**
- **cytotrofoblast**
- bazální lamina syncytiotrofoblastu
- syncytiotrofoblast



## Od 5. měsíce

- endotel kapilár
- basal lamina endotelu
- bazální lamina syncytiotrofoblastu
- syncytiotrofoblast



# Pupečník


- spojuje fetus s placentou
- délka cca 55 - 60 cm

Whartonův rosol  
(rosolovité vazivo)

Amniový epitel  
(ektoderm)

Pupečnickové tepny

Pupečnicková žíla



**Děkuji za pozornost!**

Dotazy a komentáře na:  
[ahampl@med.muni.cz](mailto:ahampl@med.muni.cz)