

Paraziti člověka

Základy biologie
2011 - 2012

Vzájemné vztahy (interakce) mezi populacemi

- Populace – soubor jedinců téhož druhu žijících na v určitém čase na určitém místě
- Rozlišujeme:
 - A) negativní – konkurence, parazitismus
 - B) kladné (mutualismus)- symbióza
- **Parazitismus** = jeden organismus žije na úkor druhého organisma (hostitele); obvykle ho neusmrcuje

Ekologická potravní pyramida

- Vyjadřuje potravní vztahy ekosystému.
- Velikost „patra“ pyramidy odpovídá množství energie, které je v něm obsaženo.
- Spodní patro = zelené rostliny neboli **producenti**.
- Nad nimi **konzumenty I. řádu = býložravci**. Ti se živí producenty.
- Nad nimi **konzumenti II. řádu = masožravci**. Ti se živí býložravci.
- Do této pyramidy vstupují také **rozkladači a paraziti**. V každém patře pyramidy se velká část energie ztrácí v podobě nevyužitelného tepla. Živočichové v každém patře pyramidy využívají asi 10 % energie a látek z patra předcházejícího.


predátoři konzumenti 3. řádu


predátoři konzumenti 2. řádu

býložravci konzumenti 1. řádu


zelené rostliny

anorganický svět





Vzájemný vztah biotických a abiotických faktorů stanoviště



Potravní řetězce

- Rozlišujeme 3 základní typy potravních řetězců:
 - 1) pastevně kořistnický
 - 2) rozkladný (dekompoziční)
 - 3) cizopasný (parazitický)

Pastevně kořistnický

- Na počátku je vždy producent = zelené R
- Dalšími články jsou vždy konzumenti vyšších řadů
- Konzument vyššího řádu má tělo větší, ale populační hustotu nižší
- Příklady: tráva ↔ hraboš ↔ poštolka
bylina ↔ saranče ↔ ještěrka ↔ liška
řasy ↔ perloočky ↔ ryby ↔ dravé ryby ↔
tuleň ↔ člověk

Rozkladný (dekompoziční) řetězec

- Rozklad organické hmoty na anorganické látky = mineralizace
– uzavření řetězce – návrat látek – jsou nepostradatelní
- **Nekrofágové** – potravou jsou uhynulé organismy
- **Saprofágové** – potravou jsou těla v takovém stupni rozkladu, že již nemají zachovanou strukturu („hnijící“)
- RŘ vede od odumřelé R nebo Ž hmoty přes četné návazné dekompozitory až k mikroorganismům, kteří mrtvou organickou hmotu zcela rozkládají a v konečné fázi mineralizují
- Velikost jejich těla se postupně zmenšuje, početnost naopak zvyšuje až k neobvyčejně vysokým hodnotám.
- Iniciálními (počátečními) dekompozitory jsou živočichové, finálními (koncovými) rozkladači jsou mikroorganismy.
- Protéká tudy **nejvíce energie** obsažené v ekosystému (až 90%)

Cizopasný (parazitický) řetězec

- Parazit žije na úkor hostitele, obvykle ho neusmrcuje.
- Zahrnuje obvykle 2 - 3 články: hostitel (případně mezihostitel), parazit, hyperparazit (konzumující tělo parazita).
- Velikost těla parazitů se zmenšuje, jejich početnost naopak zvětšuje.
- Potravní vazby parazitů jsou často složité, někdy dochází ke střídání hostitelů nebo i rozdílným hostitelům u samců nebo samic parazita.
- O těchto vztazích pojednává parazitologie.


Paraziti

- Endoparaziti – uvnitř těla - tasemnice
- Ektoparaziti – vně těla - blecha

1. Prvoci

Jednobuněčné organismy

- Oddělení: Bezbřví
 - Bičíkovci
 - Kořenonožci
 - Výtrusovci
- Oddělení: Obrve
- Nálevníci




A. Cizopasní bičíkovci

- Trypanosoma spavičná (Trypanosoma gambiense)
- Bičenka poševní (Trichomonas vaginalis)
- Lamblie střevní (Giardia lamblia)
- Ničivka (*Leishmania*)


Trypanosoma spavičná

(*Trypanosoma gambiense*)

- Přenášena mouchou tse-tse v trávicím sekretu
- Onemocnění – spavá nemoc
- Parazituje v krevní plazmě
- Způsobuje zduření mízních uzlin
a stále častěji se opakující horečky =
postižení bez léčení za několik měsíců
umírají naprostým vyčerpáním
- Přenašeč – moucha bodalka (tse- tse)
- Místo výskytu – rovníková Afrika



Trypanosoma spavičná



Přenašeč trypanosomy spavičné




Moucha tse-tse na zvířecí kůži




Moucha tse-tse na lidské kůži

Životní cyklus trypanosomy spavičné






Trypanosoma spavičná mezi červenými krvinkami




Trypanosoma brucei

Lifecycle of African trypanosomes




Bičenka poševní (*Trichomonas vaginalis*)

- Způsobuje nemoc **trichomoniázu** = úporné záněty močových cest a hnisavé výtoky z pochvy
- Šíří se pohlavním stykem – **muž přenašeč** (netrpí příznaky)






DATA • RESEARCH • PEOPLE™
<http://www.dpd.cdc.gov/dpdx>




Lamblie střevní (Giardia lamblia)



- Způsobuje **horečnaté záněty tenkého střeva** - mechanicky ničí svým přísavným diskem jeho stěnu
- Pokryjí sliznici střeva, kterou tak zbaví resorpční schopnosti a naruší tím trávení - proto se jí říká tzv. **kobercový parazit**.
- Nákaza - tvoří cysty, které odcházejí z těla ven - prostřednictvím znečištěné vody nebo potravin.

Ničivka (*Leishmania*)


- Původce nemoci leishmanióza – různé druhy ničivek
– různé formy nemoci - postihuje játra, slezinu, kůži...
- Nejzávažnější forma leishmanízy známá také jako *kala azar* (z hindštiny = černá horečka) - parazitičtí prvoci se usídlují v lidských útrobách, především v játrech a slezině, což vede ke zvětšení a snížení funkce těchto orgánů.
- Dále se projevuje horečkou, váhovým úbytkem a anemií.
- Neléčená viscerální leishmaníza vede téměř vždy ke smrti hostitele
- Přenašeči - komáři



Životní cyklus ničivek

- Probíhá mezi člověkem (hostitel) a komárem rodu *Phlebotomus* (přenašeč).
- V těle hostitele se vyskytuje ve formě bez bičíku a napadá buňky jaterní nebo slezinné.
- Množí se dělením, až buňka praskne a noví prvoci napadají další buňky.
- Komár nasaje krev s parazity a v jeho zažívacím traktu vzniká bičíkatá forma, která se množí a při sání se opět nakazí člověk a v něm se zase množí bezbičíkatá forma.

Životní cyklus leishmanie (ničivky)



Kožní leishmanióza




- Je nejčastější forma leishmanízy, při níž parazité napadají kůži a působí její poškození. Neléčená kožní leishmaníza není smrtelná nemoc a většinou se poškozené okrsky kůže zahojí jizvou.

B. Kořenonožci

Měňavka úplavičná (*Entamoeba histolytica*)

- střevní parazit
- způsobuje krvavé průjmy a horečky



C. Výtrusovci

- Paraziti bezobratlých živočichů i obratlovců
- Střídají hostitele i generace pohlavní a nepohlavní = složité cykly
- Název od sporogonie - stádia v rozmnožovacím cyklu – vznik „výtrusů“.
- Patří sem: kokcidie, krvinkovky, toxoplazma



Zimnička čtvrtodenní

Kokcidie jaterní (*Eimeria stiedae*)

- Nemoci zvířat - králíků a zajíců
- Kokcidióza – hnisavé záněty žlučovodů – játra s bělavými skvrnami – nepoživatelná
- Nákaza - v žlučovodech vzniká oocysta, ta je se žlučí vyplavena do střev a s výkaly se dostává z těla - zdroj nákazy dalších jedinců
- Ochrana – okyselit vodu, pelyněk




Krvinkovky - Zimnička čtvrtodenní

- Vyvolává u člověka malárii.
- Šíří se v tropech a subtrovech.
- Napadá červené krvinky.
- Proces rozpadu erytrocytů je provázen horečkami.
- Komár *Anopheles* – přenáší zimničku ve střevním traktu.



Přenos malárie



Toxoplasma gondii

- Parazituje zejména v bílých krvinkách
- Je přenosná ze zvířat – nejčastěji koček
- Projevy – dlouhodobé horečky, zduření mízních uzlin, únava
- Nebezpečná pro těhotné ženy – poškození plodu


2. Kmen: Ploštěnci (Plathelmintes)

- Motolice
- Tasemnice
- Uzpůsobení těla parazitickému způsobu života
 - redukce (NS) nebo ztráta některých soustav (trávicí)
 - silně vyvinuta rozmnožovací soustava
 - dýchání anaerobní
 - kutikula – ochrana před trávicími enzymy

Motolice jaterní (*Fasciola hepatica*)


- celosvětově rozšířený parazit – nemoc **fascilioza**
- má složitý vývoj - mezihostitel – plž (plovatkovití – v Evropě bahnatka malá)
- definitivní hostitel: skot, ovce – žije v játrech a živí se krví
- škody - 2 miliardy USD ročně
- první zmínky už rok 1379 Francie – zpráva pro Karla V o produkci vlny – nemoc ovcí = jaterní hniloba – nevěděli, kdo to způsobuje – v 17. stol. objeven původce





Krevnička močová (*Schistosoma haematobium*)

- Motolice - parazituje v cévách močových cest, způsobuje patologické změny v cévách, zduření jater a sleziny.
- Projevem je krev v moči a ve stolici. Definitivním hostitelem je člověk, mezihostitelem měkkýši
- Vajíčka vycházejí z těla s močí - mají hrot, při uvolňování způsobují krvácení při močení..
- Nemoc – **bilharzióza**
- Samička a samec trvale spojeni – samička v rýze




Tasemnice (Cestoda)



- **Tasemnice dlouhočlenná** (*Taenia solium*)
- **Tasemnice bezbranná** (*Taeniarhynchus sagianus*)
- **Měchožil zhoubný** (*Echinococcus granulosus*)
- **Škulovec široký** (*Diphyllobothrium latum*)
- Endoparaziti – nemají tráv. soustavu, kutikula
- Stavba těla – skolex (hlavička, rostelum – příchytné háčky, přísavky) + proglotidy (články)
- Hermafrodití – mnoho vajíček
- Larva – onkosféra, klidové stádium = boubel (*larvocysta*)

Tasemnice dlouhočlenná (Taenia solium)

- Žije v tenkém střevě člověka
- Zdroj nákazy – vepřové maso s boubelí
- Cyklus – uvolněná vajíčka pozře prase – vylíhne se onkosféra – krevní cestou je zanesena do svalu, kde tvoří boubely – člověk pozře nedokonale ošetřené maso – boubely se dostanou do žaludku, pak do střeva, kde se uchytí a tvoří články – dospěje, vznikají články plné vajíček, které jdou s výkaly ven
- Hnojení výkaly – hygiena!!!



Tasemnice dlouhočlenná




Článek s pohlavními orgány


Tasemnice bezbranná

(*Taeniarhynchus sagitanus*)


- Dlouhá až 10 m – 2000 článků
- Nemá háčky na skolexu
- Zdroj nákazy nedokonale tepelně upravené hovězí maso



Vývoj tasemnic



**Tělo
tasemnice
z článků**



i = Infective Stage
d = Diagnostic Stage

Měchožil zhoubný



(*Echinococcus granulosus*)

- Velmi nebezpečný parazit člověka
- Tělo jen 6 mm – hlavička + č články
- V dospělosti v těle šelem
- Mezihostitel – srnčí, zvěř, skot, ovce, kozy i člověk
- Onkosféra se usazuje v játrech nebo plicích, kde vytváří boubel = echinokok velikosti až kedlubny – v něm mnoho hlaviček



Photo by: Dr SM Sadjjadi
parasito@sums.ac.ir

Vývoj měchožila





Škulovec široký

(*Diphyllobothrium latum*)

- U obyvatel živících se rybami
- 10 m - 4000 článků
- 3 larvální stádia – v buchance – v rybě a konečném hostiteli



Vývojový cyklus škulovce širokého



3. Kmen: HLÍSTI (*Nemathelminthes*)

- Hlístice (**nematoda**) – převážně parazitické
- oblé, válcovité nebo vláknité tělo
- až na výjimky gonochoristé - pomocné pářící orgány: kutikulární bradavky, 1-2 pářící jehlice (spikuly), pářící plachetka
- Lehká vajíčka – šíří se i vzduchem



Stručný přehled hlístic

***Ascaris lumbricoides* - škrkavka dětská**

- Vajíčko s výkaly (3-4 týdny larvy). Po spolknutí vajíčka se uvolňují larvy ve střevě - krevním oběhem do plic - do hltanu - do tenkého střeva - dospívání. Toxiny, odnímání živin, perforace střeva.
- Podobné druhy u jiných obratlovců (prase, pes, kůň.)

***Enterobius vermicularis* - roup dětský**

- 3-12 mm, slepé a tlusté střevo, u dětí (nechutenství, poruchy trávení). Autoinfekce.
- Samička klade v noci vajíčka v okolí řitního otvoru - svědění.
- Velmi hojný v dětských kolektivech.
-

***Wuchereria bancrofti* - vlasovec mízní**

- V lymfatickém systému člověka: městnání lymfy - elefantiáza. Hypertrofie orgánů.
-

***Dracunculus medinensis* – vlasovec medinský**

- V tropech, samička vysouvá část těla z těla hostitele ve vodním prostředí. Symbol lékařství.
-

***Trichinella spiralis* - svalovec stočený**

- Samičky 3-4 mm, k vývoji mezihostitel. Při pozření svaloviny s encystovanými larvami - uvolnění ve střevě - do cévního systému - larvičky zanášeny do svaloviny - encystace (i několik let). U nás - prase divoké (bránice).
-

Životní cykly hlístic

- **geohelminté** – část vývojového cyklu prodělávají ve vnějším prostředí a dospělci cizopasí – např. tenkohlavec, roup, škrkavka
- **biohelminté** – larvální vývoj probíhá v mezihostiteli (plži, hmyz, žížaly, obratlovci)
- infekční larvy (u parazitických hlístic) přicházejí do těla hostitele:
 - a) pasivně - s potravou
 - b) aktivně - pronikají pokožkou a vnikají do krevního oběhu, odkud jsou zaneseny do místa lokalizace

Škrkavka dětská (*Ascaris lumbricoides*)


- Celosvětově rozšířený parazit člověka a lidoopů – nejběžnější parazit člověka – 1,4 miliardy lidí infikováno – nemoc **askarióza**;
- parazituje v tenkém střevě;
- nákaza je nebezpečná při velké invazi škrkavek - nebezpečí perforace nebo ucpání střeva nebo dýchacích cest.
- Na tyto komplikace ročně na světě umírá 8 000 – 100 000 lidí.

Vývojový cyklus škrkavky


- 1) Oplozená vajíčka se uvolňují ven z těla hostitele společně s výkalý.
 - 2) Při nedostatečné hygieně jsou pozřena člověkem.
 - 3) Larva se z trávicího ústrojí dostává do krve.
 - 4) Larva putuje krevním oběhem do plic – vykašláváním a následným polknutím se vrací do trávicí trubice.
- V poslední fázi se larvy dostávají do tenkého střeva, kde pohlavně dospívají.

Škrkavka dětská

Vajíčka vydrží v půdě životaschopná 2–6 let. Ničí se kompostováním.




Vajíčka odcházejí z těla spolu se stolicí.



dospělé škrkavky

Z plic larvy migrují průduškami až do hrtanu. Vylézají do hltanu a jícнем se dostávají zpět do tenkého střeva, kde dospívají.


vajíčka škrkavek jsou spolknuta



V duodenu se vajíčka mění na larvy a ihned pronikají střevní stěnou do krevního oběhu. Krví cestují do plic.

larvy škrkavek v plicní tkáni


Vývojový cyklus škrkavky



Škrkavka dětská



Škrkavka dětská



Vajíčko škrkavky



LARVA OPOUŠTĚJÍCÍ VAJÍČKO – ŠKRKAVKA PSÍ




Škrkavka kočičí




Roup dětský (*Enterobius vermicularis*)

- Žije v tenkém střevě dětí, případně dospělých
- Onemocnění oxyurióza – podráždění až vyčerpání, úporné svědění, vyrážky
- Samičky kladou v noci vajíčka kolem řitního otvoru – svědění
- Nákaza – vzduchem, infikované prádlo, nedostatečná hygiena
- Autoinfekce

Roup dětský




Roup dětský




Samička roupa dětského



Vajíčka roupa dětského






- 1) Vajíčka se vylučují stolicí.
- 2) V půdě vajíčka procházejí vývojem dvoubuněčného stadia,
- 3) buňky se dělí,
- 4) dále se z nich vyvinou embrya; vajíčka se stanou přenosnými v průběhu 15 až 30 dní.
- 5) Po infikování (ruce, které přišly do kontaktu s kontaminovanou půdou, nebo kontaminovaným jídlem) se vajíčka zahnízdí v tenkém střevě, uvolní larvy, které dospívají a vyvinou se v dospělé paraziti v tlustém střevě .
- 6) Dospělí červi (přibližně 4 cm délky) žijí ve slepém střevě a vzestupném tlustém střevě. Dospělí červi se v této oblasti uhnízdí ve sliznici. Dospělé samičky nakladou vajíčka 60 až 70 dní po nákaze.

Tenkohlavec lidský (*Trichuris trichiura*)

- Hlístice také nazývaná „lidský bičíkovec“
- Dospělá samička měří zhruba 35-50 mm, a dospělý sameček okolo 30-45 mm.
- Dospělé samičky uvolní ve slepém střevě zhruba 3.000 až 20.000 vajíček denně. Délka života dospělých červů je zhruba jeden rok.



Tenkohlavec lidský (*Trichuris trichiura*)

- přední část těla je nitkovitá, zadní část silnější;

- tenkou částí se zanořuje do střevní sliznice, tlustší konec vyčnívá do střeva;


- parazitují u savců ve střevní sliznici tlustého střeva – živí se krví a tkání (záněty);

- velikost 30–55 mm;

- žije až 6 let;

- vajíčka se objeví ve stolici až za 60 – 90 dní po nákaze

- nepotřebuje mezihostitele – larvy dospívají během 3 měsíců




Tenkohlavec lidský (*Trichuris trichiura*)


- **Projevy:** trávicí obtíže, nevolnost, bolesti břicha
- závisí množství parazitů = toxoalergické působení parazitů + traumatizace zažívacího traktu: lehčí záněty - různě intenzivní krvácení - slizniční vředy - prolaps rekta (vyhřeznutí konečníku)
- **Trichurióza/trichocefaloza** je zvláště v rozvojových zemích jednou z častých příčin podvýživy, růstové retardace a trvale snižuje imunokompetenci hostitele.
- **Nákaza:** vodou nebo potravou kontaminovanou vajíčky (typický tvar citrónu) - jsou vysoce odolná, v půdě vydrží infekční až 6 let.
- Nejstarší nálezy pocházejí z koprolitů amerických indiánů starých snad až **11 tisíc let**.
- Známý je i jejich objev ve střevním obsahu zmrzlé mumie muže zemřelého před **5300 lety** v Ötzalských Alpách.

Svalovec stočený (*Trichinella spiralis*)

- způsobuje „trichinelózu“ u masožravců i všežravců včetně člověka
- k nákaze dojde pozřením nedostatečně tepelně zpracovaného masa, ve kterém jsou zapouzdřené larvičky
- hostitelé – drobní hlodavci, divoká prasata, lišky, ale mohou to být i domácí zvířata (prase, méně kočka nebo pes)
- nákaza koluje především u divoce žijících masožravců a všežravců



Svalovec stočený (Trichinella spiralis)




Svalovec stočený (*Trichinella spiralis*)

- Nákaza – infikovaným masem - kontrola na jatkách - v masném průmyslu je dodnes postup zavedený již roku 1864 Rudolfem Virchowem
- již druhý den po pozření infikovaného masa uvolněné larvy svalovce v tenkém střevě dospívají a kopulují
- po dalších pěti dnech přichází na svět první živé larvy,
- během až dvouměsíčního života samička uvolní 500–1500 larev = masivní nákaza,



Svalovec stočený (*Trichinella spiralis*)

- **Trichinelóza – dvě fáze: střevní a svalová**
- **Střevní fáze** trvá přibližně týden a projevuje se jako bolesti břicha, zvracení a průjem – léčba silnými projímadly.
- **V svalové fázi** larvy pronikají ze střeva do lymfy a krve - po 2–3 dnech se dostávají do příčně pruhovaných svalů – opouzdří se, encystují v modifikovaných svalových buňkách, které jim zajistí výživu.
- Při napadení jiných tkání se cysta nevytvoří - larva je buď zlikvidována imunitním systémem, nebo se vrací do oběhu.
- **Průběh svalové fáze** závisí na množství larev v organizmu - projevuje se horečnatým stavem, únavou, otoky, vyrážkou, bolestmi v postižených příčně pruhovaných svalech i poruchami jejich funkce...
- Při masivní infekci a vysoké toxémii může trichinelóza i dnes končit smrtí.

Trichinella spiralis – vývojový cyklus



Zapouzdřené larvy svalovce




Trichinelóza



Vlasovci

- **Vlasovec mízní (*Wuchereria bancrofti*)**
 - ucpávají mízní cévy hostitele - městnající lymfa způsobuje zbytnění částí těla – elefantiáza
- **Vlasovec medinský (*Dracunculus medinensis*)**
 - v tropech, samička vysouvá část těla hostitele ve vodním prostředí. Symbol lékařství.



Vlasovec mízní

(*Wuchereria bancrofti*)




Elefantiáza



Vlasovec oční (Loa loa)

- Ve spojivkovém vaku – způsobuje:
 - oční záněty
 - nádory kůže – kamerunské boule



4. Kroužkovci (Annelida)

- Vnější paraziti – chitinové zoubky
- Pijavky
- Hltanovky

Třída: Pijavice (Hirudinea)

Pijavka lékařská

(*Hirudo medicinalis*)

V ústech jsou 3 jemně ozubené kutikulární zuby, sloužící k nařezávání pokožky hostitele nebo drcení drobných živočichů.

- až 15 cm
- saje krev teplokrevným živočichům
- do rány přitom vylučuje protisrážlivý hirudin
- po plném nasátí vydrží několik dní hladovět
- u nás v teplých stojatých vodách na J Moravě

Ve středověku byla pokládána na těla nemocných – odebírala jim „nemocnou zkaženou krev“.





Hirudo medicinalis



Pijavka lékařská



- V přední části s vychlípitelným chobotem nebo třemi svalovými lištami s ozubenými čelistmi.
- Sací jícen, žaludek s četnými slepými výběžky.
- Řitní otvor na dorzální straně.
- Dlouhodobé trávení krve.

Pijavka lékařská

(Hirudo medicinalis)









typická lokalita výskytu pijavky lékařské



Tropická suchozemská krevsající pijavice rodu *Haemadipsa*.

Třída: Pijavice (Hirudinea)

Hltanovky

Hltanovka bahenní

(*Erpobdella octoculata*)

Na stěnách dlouhého hltanu 3 podélné svalové lišty na drcení potravy.

- 5 cm
- tekoucí i stojaté vody
- nejběžnější pijavice u nás
- živí se drobnými živočichy
- snáší i mírný stupeň znečištění




Třída: Pijavice (Hirudinea)

Chobotnatky

Chobotnatka rybí (*Piscicola geometra*)


Středem ústní přísavky se vychlipuje svalnatý a chobotovitý hltan k sání krve a lovení drobné potravy.

- ektoparazit ryb
- saje krev
- velké kruhovité přísavky
- píďalkovitý pohyb nebo vlnivé plavání




Blechy

- Dospělé blechy jsou vnějšími, druhotně bezkřídlými (ekto-) parazity ptáků a savců, jejichž krví se živí. Mají ze stran zploštělé tělo klínovitého tvaru a porostlé dozadu směřujícími tuhými brvami.



Dospělec




Larva blechy

Vši

- Veš dětská
- Veš šatní
- Veš muňka




Ploštice – Štěnice domácí



**Ektoparazit
člověka**

Ploštice – Štěnice domácí



**Ektoparazit
člověka**

Ploštice – Štěnice domácí



**Detail
sacího
ústrojí**


5. Členovci

- Roztoči:
- Klíště obecné




Nemoci přenášené klíšťaty

- Klíšťová encephalitida
- Lymeská borelioza
- Tularemie
- Varoáza




Ohniskové nákazy



Lymeská borelioza

- Lymeská borelióza (LB) je komplexní onemocnění vyvolané bakteriemi *Borrelia burgdorferi*. Je to bakterie patřící ke spirochetám, což jsou bakterie spirálovitého tvaru a patří mezi ně i původce syfilis a leptospirózy.



Projevy boreliozy - erytém



Použité zdroje

- Daněk, G.: *Zoologie*. SPN, Praha, 1978
- Nováček, J.: *Biologie*. Credit, Praha, 1997
- <http://www.hlasek.com>
- <http://www.insektenfotos.de>
- <http://www.foto-album.cz>
- <http://www.hmyz.net>
- <http://www.biolib.cz>

Použité zdroje

- <http://www.tfsoft.cz/photo>
- <http://www.microscopy-uk.org.uk>
- <http://www.bioweb.uncc.edu>
- Bašovská, M. a kol.: *Biologie pro 2.ročník gymnáziií.* SPN, Praha, 1985
- Romanovský, A. a kol.: *Obecná biologie.* SPN, Praha, 1985

A už zase umíte o kus víc!!!

