

## Eusporangiátní kapradiny (*Ophioglossidae*)

### hadilka obecná (*Ophioglossum vulgatum*)

Drobná kapradina, z **oddenuku** vyrůstá každoročně **jediný list**, členěný v plochou celistvou **asimilační část** (je pokládána za **aflebii**, tj. ochranný útvar s funkcí palistu) a ve stopkovitou **fertilní část** nesoucí dvouřadě uspořádaná **sporangia**. **Výtrusnice eusporangiátní, izosporické**, kulovité, větinou přisedlé, otvírají se vrcholovou štěrbinou.

Zakreslete habitus rostliny.

### vratička měsíční (*Botrychium lunaria*)

Drobná kapradina, z **oddenuku** vyrůstá každoročně **jediný list**, členěný v plochou celistvou **asimilační část** (je pokládána za **aflebii**, tj. ochranný útvar s funkcí palistu) a ve stopkovitou **fertilní část** nesoucí dvouřadě uspořádaná **sporangia**. **Asimilační část** listu (**aflebie**) peřenodílná, **fertilní část** listu až dvakrát větvená. **Výtrusnice (sporangia) eusporangiátní, izosporické**, kulovité, otvírají se vrcholovou štěrbinou.

Zakreslete habitus rostliny, vyznačte asimilační a fertilní část listu.

V dopadajícím světle pozorujte kulovitá eusporangiátní sporangia a zakreslete je, vyznačte vrcholovou štěrbinu.

## Leptosporangiátní kapradiny (*Polypodiophyta*)

### osladič obecný (*Polypodium vulgare*)

**Oddenek** plazivý, větvený. **Listy** vesměs přezimující, vyrůstají ve 2 řadách. Čepel hluboce členěná v páry střídavých úkrojků. Výtrusnicové kupky na rubu listů v řadě po obou stranách střední žilky úkroku. **Výtrusnice** jsou leptosporangiátní, stopkaté, s řadou buněk tvořících prstenec (anulus), otvor vzniklý prasknutím stěny výtrusnice se nazývá ostium. Výtrusnice nejsou kryté ostěrami.

Zakreslete habitus rostliny.

### prothalium kapradin

**Prothalium** je zelené, srdčité, obouohlavné, s rhizoidy. Na prothaliu se nacházejí **archegonia i antheridia**.

Zakreslete tvar prothalia, umístění gametangií a vyznačte rhizoidy.

### sleziník červený (*Asplenium trichomanes*)

**Oddenek** vodorovný, krátký, bohatě kořenující. Listy v hustém trsu, zpravidla přezimující. Čepel jednoduše zpeřená, čárkovitě kopinatá. **Výtrusnicové kupky (sory)** po 4–6 na jednom lístku, podlouhlé. Ostěra (indusium) bělavá, celokrajná.

Zakreslete habitus rostliny, umístění a tvar výtrusnicových kupek na spodní straně listu.

### jelení jazyk celolistý (*Phyllitis scolopendrium*)

**Oddenek** vystoupavý až přímý, se svazčitými kořeny. Vrchol oddenuku, mladé listy a řapíky i střední žebra starších listů pokryty rezavými plevinami. Čepel listů **nedělená**, úzce eliptická, listy přezimující. **Výtrusnicové kupky** čárkovité, nestejně dlouhé, souběžné s žilnatinou. Ostěry celokrajné.

Zakreslete habitus rostliny, umístění a tvar výtrusnicových kupek na spodní straně listu.

### kaprad' samec (*Dryopteris filix-mas*)

Hustě trsnaté bylinky s mohutným, hustě plevinatým **oddenkem**. Listy stejnotvaré. Listová čepel široce podlouhlá, k vrcholu pozvolna zúžená, 2x zpeřená. **Výtrusnicové kupky (sory)** ca 1,5 mm v průměru, 4–6 na každém úkrojku. **Ostěry** ledvinité, tuhé, ploché. Výtrusnice jsou leptosporangiální, stopkaté, s řadou buněk tvořících **prstenec (anulus)**, otvor vzniklý prasknutím stěny výtrusnice se nazývá **ostium**.

Zakreslete habitus rostliny, umístění a tvar výtrusnicových kupek na spodní straně listu.

Pod preparačním mikroskopem pozorujte výtrusnicové kupky a výtrusnice a zakreslete, na výtrusnici vyznačte anulus a ostium.

### marsilka čtyřlistá (*Marsilea quadrifolia*)

Drobná vodní bylina. **Listy** dlouze řapíkaté, čtyřčetné, široce klínovité. Ve spodní části lodyhy vyrostají obouphavné dlouze stopkaté ledvinité sporokarpy. **Sporokarpy** obsahují mikrosporangia a megasporangia.

Zakreslete habitus rostliny.

### nepukalka vzplývající (*Salvinia natans*)

Jednoleté vodní byliny. Lodyhy tenké, málo větvené, 10–15 cm dlouhé. **Listy vstřícné, čepel** zelená, široce eliptická, zaokrouhlená, celokrajná. Na spodu listového páru jsou nezelené nitkovité úkrojky, na jejichž bázi je několik (3–8) krátce stopkatých **sporokarpů**.

Mikrosporokarpy obsahují četná mikrosporangia (každá obsahuje 64 triletních mikrospor), megasporokarpy obsahují malý počet megasporangií (s jedinou megasporou).

Zakreslete habitus rostliny.