

Cykasy (*Cycadophyta*)

Cycas revoluta

Trofofyly (megafyly syntelomového původu) kožovité, až 3 m dlouhé. Čepel listů podlouhlá, jedenkrát zpeřená, lístky čárkovité, po délce naspod podvinuté. Megasporofyly plstnaté, v horní části zpeřené, nesou čtyři až osm vajíček. Výskyt: Japonsko.

Nakreslete trofotyl a megasporofyl.

Cycas circinalis

Megasporofyly plstnaté, v horní části kopinatě rozšířené a zubaté, na okraji nesou čtyři až osm vajíček. Výskyt: východní Indie až Indočína.

Nakreslete megasporofyl.

Ceratozamia mexicana

Mikrostrobilus tvořen četnými mikrosprofyly, které nesou na spodní straně velký počet mikrosporangií. Megastrobilus tvořen četnými megasprofyly se dvěma megasporami. Výskyt: Mexiko.

Nakreslete mikrostrobilus. V preparačním mikroskopu pozorujte megasporofyl a mikrosporofyl a zakreslete.

Jinany (*Ginkgophyta*)

jinan dvoulaločný (*Ginkgo biloba*)

Široce klínovité dvoulaločnaté listy (trofotyly) vyrůstají na tlustých **brachyblastech**.

Megastrobilus nese **dvě nahá vajíčka**, z nichž se většinou jen jedno vyvíjí v semeno. Zralé **semeno** má zdužnatělý integument žluté barvy a vnitřní tvrdou vrstvu. Páchne po kyselině máselné.

Autochtonní výskyt: malé území ve východní Číně. Od počátku 18. století se pěstuje v parcích na řadě míst po celé Evropě.

Nakreslete větvičku s brachyblasty, tvar listu, samičí šištici a semeno.

Jehličnany (*Pinophyta*)

chvojník dvouklasý (*Ephedra distachya*)

Nízký polokeř s **opadavými článkovými větvemi**. Listy vstřícné, křížmostojné, šupinovité.

Rostlina je dvoudomá.

Nakreslete habitus rostliny. Vyznačte článkované větve a vstřícné listy.

borovice lesní (*Pinus sylvestris*)

Jehlicovité listy jsou na málo zřetelných brachyblastech ve svazečcích po dvou. Pylová zrna mají dvě vzdušná pouzdra. Samičí šištice jsou tvořeny pouze semennými šupinami, z nichž každá nese dvě vajíčka (později okřídlená semena).

Zakreslete větvičku s jehlicemi, semeno. V procházejícím světle pozorujte pylová zrna a zakreslete je.

borovice vejmutovka (*Pinus strobus*)

Měkké jehlicovité listy sedí na málo zřetelných brachyblastech ve svazečcích po pěti
Zakreslete větvičku s jehlicemi.

cedr atlaský (*Cedrus atlantica*)

Má na dvouletých a starších větévkách jehlicovité listy ve svazečcích na zřetelných
brachyblastech, na letorostech jednotlivé. Šupina samičí šištice srůstá z podpůrné a semenné
části.

Zakreslete mikrostrobilus a šupinu samičí šištice.

modrín opadavý (*Larix decidua*)

Samičí šištice (**mikrostrobily**) převislé na brachyblastech, na bázi obalené střechovitě se
kryjícími šupinami, **tyčinky** se dvěma prašnými pouzdry. Samičí šištice (**megastrobily**)
vzpřímené na brachyblastech, na bázi s jehlicovitými listy, **podpůrné šupiny** červené barvy,
s výrazně protaženým středním žebrem, jsou v době květu větší než **semenné**. Na bázi semenné
šupiny dvě vajíčka.

Zakreslete větvičku s jehlicemi, mikrostrobilus a megastrobilus. Semennou šupinu s vajíčky pozorujte v dopadajícím
světle a zakreslete.

jedle bělokorá (*Abies alba*)

Listy jehlicovité, dvouřadě uspořádané, tupé, na bázi rozšířené, po odpadnutí zanechávají na
větvičce okrouhlou jizvu, na rubu obvykle se dvěma bílými proužky. Samičí šištice vzpřímené,
tvorené semennými a podpůrnými šupinami. Šišky za zralosti dřevnaté, rozpadavé.

Zakreslete větvičku s listovými jizvami a s polozpadlou šíškou.

douglaska tisolistá (*Pseudotsuga menziesii*)

Šišky převislé, krátce stopkaté. **Semenné šupiny** kožovité, zaokrouhlené. **Podpůrné šupiny**
dvouzubé se silně protaženým středním žebrem (vypadají jako 3cípé), delší než semenné.
Zakreslete samičí šištici.

jalovec obecný (*Juniperus communis*)

Listy jehlicovité, krátké, usporádané v trojčetných přeslenech. Samičí šištice (**makrostrobily**) při
dozrávání dužnatějí a srůstají v útvar podobající se bobuli (**galbulus**). Galbuly kulovité, tmavě
modré, černé nebo hnědé, užívají se jako koření popř. k aromatizování likérů.

Zakreslete větvičku s postavením a typem jehlic a galbulus.

zerav (túje) západní (*Thuja occidentalis*)

Šupinovité listy matné, na rubu bez bílé kresby, jsou k větvičkám těsně přitisklé. Šišky
podlouhlé, ze 3-5 páru semenných šupin.

Zakreslete větvičku s šíškou.

tis červený (*Taxus baccata*)

Dvoudomý strom. Samičí šištice (**mikrostrobily**) malé, kulovité, na spodu loňských větviček,
tyčinky (**mikrosporofylly**) štítkovité, s osmi až dvěma **mikrosporangii**. Pylová zrna bez
vzdušných váčků. Samičí šištice (**megastrobily**) velmi malé, pupenům podobné, složené
z několika podpůrných listenů a většinou jediného **vajíčka**. Semeno ve zralosti obklopuje
dužnatý nepravý míšek červené barvy (**epimacium**).

V dopadajícím světle pozorujte mikrostrobilus a megastrobilus a zakreslete epimacium.