

Zdroje

Lechta, V. (2010). Kocktavost. Praha: Portál.

Lechta, V. a kol. (2003). Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.

Lechta, V. a kol. (2003). Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.

Model č. 4 Patogeneze kocktavosti (Lechta, 2000b)

**1. fáze: Vývojová dysfluence.** Fyziologické neplnylosti (zpravidla repetice bez nadměrné námahy a psychické tenze) jako doprovodný příznak ontogeneze řeči, která ve většině případů spontánně zanikne.




V případě nepříznivých okolností (např. genetická zátěž, chybná reakce prostředí na neplnylosti dítěte, orgánové odchylky, atypické mozkové procesy) dojde postupně k druhé fázi, přičemž se mohou střídát fáze kocktavosti a plynulé řeči (*borderline stuttering*).

**2. fáze: Incipientní kocktavost.** Přeochod do patologie, zpočátku s omezením na proces mluvení; začínající průnik dysfluencí a nadměrné námahy. Mohou se vyskytnout prvky uvědomování si problému s řečí – zejména během aktu mluvení, první zátžky ztráty kontroly nad řečí.



V případě nepříznivých okolností fixace symptomatiky s postupným uvědomováním si handicapu (fixovaná kocktavost) a pozvolný přechod do 3. fáze.



**3. fáze: Chronická kocktavost.** Kompletní klinický obraz s postupnou habituací vzájemného průniku příznaků dysfluence, nadměrné námahy a psychické ten-

Neplnylost	Nadměrná námaha	Psychická tenze
<b>Chronická kocktavost</b> (přibližně 14 let a více) habituace příznaků	prodlužování bloků spolu s tremorem rtů, sanice	logofobie, únikové, vyhýbavé chování, silné pocity frustrace a obav z komunikace, změny ve složitosti mluvy
<b>Fixovaná kocktavost</b> (asi 7–13 let) převaha prolongací, repetice hlásek	bloky, napětí, tlačení, zápolení se slovy, narušené koverbální chování	rozpaky, pocit blamáže, vyhýbavé chování, situace ní strach, anticipování bloků a obtížných komunikačních situací
<b>Incipientní kocktavost</b> (přibližně 5–7 let) prolongace, opakování částí slov, redukováná samohláska – schwa, sporadický výskyt období fluentní řeči	nepřirozená artikulace, vegetativní příznaky, znaky svalového napětí, někdy narušené koverbální chování, zvýšení tónu nebo akcelerace při dysfluenci	projevy netrpělivosti, hektika, občas uvědomění si obtíž, nejasné pocity frustrace, ustupující zrakový kontakt
<b>Vývojová dysfluence</b> (asi 3–4 roky) vsuvky, slovní repetice, opravy nekompletních vět	žádné nápadné projevy	žádné projevy

Tab. 6 Babulotogram

BALBUTIOTGRAM																			
Jméno a příjmení	Datum narození:	Věk: c.	m.																
<b>Dýchání (stupně)</b>	<b>Fonace (stupně)</b>	<b>Artikulace (stupně)</b>	<b>Prozodické (stupně)</b>																
<input type="checkbox"/> nepravidelné <input type="checkbox"/> mělké <input type="checkbox"/> hlasy vdech <input type="checkbox"/> dýchací spazmy <input type="checkbox"/> narušené dýchání <input type="checkbox"/> i v klidu <input type="checkbox"/> jiné:	<input type="checkbox"/> tvrdé hlas, začátky <input type="checkbox"/> inspiraceí tvořba hlasu <input type="checkbox"/> nepřirozeně vysoký hlas <input type="checkbox"/> kolísání nízký hlas <input type="checkbox"/> dysfonie <input type="checkbox"/> jiné:	<input type="checkbox"/> nepřirozené artikulační postavení <input type="checkbox"/> nazalizace <input type="checkbox"/> dýslalie <input type="checkbox"/> problémové hlásky <input type="checkbox"/> jiné:	<input type="checkbox"/> přízvuk <input type="checkbox"/> tempo <input type="checkbox"/> melodie <input type="checkbox"/> rytmus:																
<b>KLINICKÝ OBRAZ</b>																			
<b>Dysfluence (%)</b>	<b>Nadměrná námaha (stupně)</b>	<b>Psychická tenze (stupně)</b>																	
<input type="checkbox"/> R1 – repetice částí slov/slabik <input type="checkbox"/> RS – repetice celých slov <input type="checkbox"/> RSZ – repetice slovních zvrátů <input type="checkbox"/> P – prologace <input type="checkbox"/> I – interjekce <input type="checkbox"/> TPA – lichá nesr. lokaliz. pauza <input type="checkbox"/> PRER – přerušované slovo <input type="checkbox"/> NEK – nekompletní slovní zvrát <input type="checkbox"/> OP – oprava <input type="checkbox"/> jiné:	<input type="checkbox"/> b – blik <input type="checkbox"/> nakoch – Naruš. koverb. chování (5 nejvýraznějších symptomů NaKoch, s etiologií NN – symptom, stupně): 1. 2. 3. 4. 5.	<input type="checkbox"/> Včh – vyhýbavé chování <input type="checkbox"/> Lg – logoblie <input type="checkbox"/> nakoch – Naruš. koverb. chování (3 nejvýraznější symptomy NaKoch, s etiologií PT – symptom, stupně): 1. 2. 3. <input type="checkbox"/> situační PT (3 nejléžší kom. sat.) <input type="checkbox"/> jiné:																	
% dysfluenci:	IA:	IZ:	Frekvence dysfluencí/min:																
<b>Balbutiograf</b>																			
<table border="1"> <tr> <td>1. šepot</td> <td>2. simultánní řeč</td> <td>3. zpěv</td> <td>4. automaticky</td> <td>5. reproduce</td> <td>6. dokončování vět</td> <td>7. čtení/pís obrázků</td> <td>8. spontánní řeč</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <input type="checkbox"/> Úlohy  <input type="checkbox"/> Vývojová dysfluence  <input type="checkbox"/> Incipientní koktavost  <input type="checkbox"/> Chronická koktavost               </td> </tr> </table>				1. šepot	2. simultánní řeč	3. zpěv	4. automaticky	5. reproduce	6. dokončování vět	7. čtení/pís obrázků	8. spontánní řeč	<input type="checkbox"/> Úlohy <input type="checkbox"/> Vývojová dysfluence <input type="checkbox"/> Incipientní koktavost <input type="checkbox"/> Chronická koktavost							
1. šepot	2. simultánní řeč	3. zpěv	4. automaticky	5. reproduce	6. dokončování vět	7. čtení/pís obrázků	8. spontánní řeč												
<input type="checkbox"/> Úlohy <input type="checkbox"/> Vývojová dysfluence <input type="checkbox"/> Incipientní koktavost <input type="checkbox"/> Chronická koktavost																			
Závěr: <input type="checkbox"/>																			
Jiné: <input type="checkbox"/>																			
Datum: <input type="checkbox"/>																			

Tab. 4a Záznamový arch – projev narušeného koverbálního chování

Localizace	Symptomy	Stupeň	Etiologie
HLAVA	nepřirozené pohyby hlavy grimasy		
TVAR A RŮK	evidentní spazmy na krku sraňování čela nepřirozené mhouření zvedání obočí		
OČI	přerušování zrakového kontaktu v momentě dysfluence pohyby řty		
ÚSTA	přehrocení otevřených ust během bliku temorů		
NOS	Frischešov symptom zatínání dlaní v pěst		
RUCE	nepřirozená gestikulace		
NOHY	dopnutí při přerušování bliku zvedání ramín		
TRUP	pohyby trupem		
VEGETATIVNÍ PRÍZNAKY	pození zčervenání zrychlování hlasu		

Index NaKoch

Obr. 9 Hierarchie příznaků breptavosti

<b>Příznaky breptavosti první úrovně (týkající se obsahu výpovědi)</b>	neuvědomování si problému slabé chápání výpovědi
<b>Příznaky breptavosti druhé úrovně (týkající se formy výpovědi)</b>	chudá skladba
<b>Příznaky breptavosti třetí úrovně (týkající se substance výpovědi)</b>	rychlé tempo řeči opakování hlásek, slabik, slov a vět embolofraze chybná artikulaace

Tab. 15 Podobnosti a rozdíly mezi breptavostí a koktavostí

Hlavní rozdíly	Breptavost	Koktavost
Základ poruchy	centrální / porucha řeči	neurovegetativní dysfunkce
Charakter poruchy	nekrébovité	krébovité
Uvědomění si poruchy	není	projevuje se

Charakteristické znaky:

- specifické příznaky
- tempo řeči
- stavba výpovědi
- obava z vyslovnosti
- některých hlásek
- koncentrace pozornosti na řeč
- relaxace, uvolnění
- drží jazyky
- souřtyby a grimasy
- záznam EEG
- experimentálně vyvolány
- ochrnění
- melodie výpovědi

Hlasité dění:

- dobře zřetelného textu
- nezřetelného textu

Písmo

- špatně
- špatně
- nekalé, mnoho oprav a škrtnů
- zružené

Účinky:

- alkoholu
- lebova efektu

Psychické vlastnosti

- bezstarostnost
- pichlavost
- impulzivnost
- povrchnost

Příběh poruchy

- stálý
- spontánně zlepšování a zhoršování (návrtný)

Podstata terapie

- zkoncentrování pozornosti na řeč
- psychologické, jakož i odvrácení pozornosti od řeči na emocionálním postižení pacienta

opakování často příliš rychlé mnohdy nesprávná

neobjevuje se zlepšuje řeč zhoršuje projev zlepšují řeč často rozsáhle

opakování často příliš rychlé převážně normální objevuje se často obvykle v normě

odchytky od normy více monotonní

plynule špatně

plynule špatně

neuvlivňují záporně oslabují

nesmělost nejistota brzdění aktivity nedůvěra

spontánně zlepšování a zhoršování (návrtný)

psychoterapie, jakož i odvrácení pozornosti od řeči na emocionálním postižení pacienta

