

## Zde začni


# KLÍČ K URČOVÁNÍ SLADKOVODNÍCH BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ





Zde jsou užitečné informace

Larvy much mají méně než 15 článků, obvykle vypadají jako kroužkovci a někteří mají hlavu



Vé vodě je mnoho různých druhů larv. Některé z těch, které můžete nejčastěji najít vidíte zde

### larvy much - dvoukřídlí

můžeme mít i panožky



Má článkované nohy? Podívej se dole

NE



tvrđe, chitinózni, článkované, nebo kluovně spojené

ANO

nespleťte si panožky s článkovanými nohami



panožky

měkká, nečlánkovaná tkání. Vypadají jako svalnaté výbežky

NE



### vodní pavouci a vodní roztoči

vždy nemusí mít vzdušný (stříbrný) obal kolem těla



vodoule



vodní roztoč

Malí, mohou být menší než 2 mm

pouze 6 noh?  
pojděte za mnou



beruška vodní

NE

Je tento živočich rychlý plavec se sploštělým tělem?

ANO

### blešivec



ANO

Má na předním páru noh velká klepata?

NE

### rak

NE

ANO

Má více než 8 článkovaných noh? (4 páry)

NE

### vodní pavouci a vodní roztoči

NE

ANO

vodoule



vodní roztoč

Malí, mohou být menší než 2 mm

pouze 6 noh?  
pojděte za mnou



