


5.5.5.17 SUMÝŠOVCI (Sipunculida)

Tito výhradně mořští živočichové červovitého vzhledu obývají chodbičky ve dně či štěrbiny ve skalách a dosahují velikosti 1–66 cm. Tělo pokrývá silná **kutikula**, výkonná svalovina jím umožňuje aktivní rytí. Kolem úst se nachází věnec tenkostenných **obrvených tykadel** (obr. 5.446). Metabolity vylučují metanefridiemi. V tělní tektině ve velkém, na dvě části rozdeleném célovém najdeme několik typů buněk připomínajících krvinky a sloužících při hojení poranění, odstraňování metabolitů, ale obsahujících také barvivo schopné vázat kyslík (*hemerythrin*). Ostatní tělní soustavy jsou velmi jednoduché. Nervovou soustavu tvoří obhlitanový prstenec zesílený ve dvě ganglia a nepárový břišní pruh bez ganglií. Jsou odděleného pohlaví s nepřímým ontogenetickým vývojem. Patří sem asi 320 druhů.




Obr. 5.446 Sumýšovci (Sipunculida).
Sumýšovec rýhovaný (*Sipunculus nudus*) žije na dně moří, přední část těla se podle potřeby dlouze vysunuje a zpět zatahuje, ryje v písku a bahně.

5.5.5.18 RYPOHLAVCI (Echiurida)

Způsobem života se podobají předchozí skupině. Liší se různě utvářeným rypákovitým výběžkem na hlavové části těla (obr. 5.447), kterým shrabávají nárosty mikroorganismů či detrit ze dna či skal. Vylučují metanefridiemi, uzavřená cévní soustava vstupuje i do zmíněného rypáku. Ostatní soustavy jsou velmi jednoduché či chybí, jako například specializovaná soustava dýchací. Nervovou soustavu tvoří obhlitanový prstenec a nepárový břišní pruh bez ganglií. Jsou odděleného pohlaví s nepřímým ontogenetickým vývojem, který zahrnuje i jev nazývaný *metagamie*.

Ten spočívá v určení pohlaví nikoliv zygoticky, tedy díky chromozomové sestavě, ale vnějším vlivem. Z vajíčka se líhne obrvená plovoucí larva, která po určité době přisedá. Pokud tak




Obr. 5.447 Rypohlavci (Echiurida). (a) Rypohlavec obecný (*Echiurus echiurus*) a (b) rypohlavec dvouhlavý (*Bonellia viridis*).

učiní samostatně, na dno moře, vyvine se z ní samice. Pokud ovšem přisedne na rypák samice, ta svými sekrety ovlivní další vývoj larvy, který má za výsledek velmi drobného samce. Ten je na samici závislý i výživou a po jejím oplození hyne. Známe asi 140 druhů.

5.5.5.19 KROUŽKOVCI (Annelida)

Tyto červovité živočichy nacházíme v moři, ve sladkých vodách i na souši (zejména v půdě). Výraznou charakteristiku představuje célový tvořený mnoha páry váčků (tzv. **polymerní célový**). Páry célových váčků oddělují příčně od sebe přepážky (**disepimenty**), v podélném směru jsou mezi váčky v páru vytvořeny přepážky – **mezenteria** – závesy, v nichž vzniká a je uložena cévní soustava. Váčky neobsahují pouze první a poslední článek. Články se vzájemně podobají, a to i z vnějšku (**homonomní článkování**, obr. 5.448).

Povrch těla kryje proteinová **kutikula** vylučovaná pokožkou, pod kterou tvoří vrstva podélné a okružní svaloviny tzv. **kožné svalový vak**. Metabolity odstraňují metanefridie ústicí párem nalevek do célové dutiny článku a vycházejí




Obr. 5.448 Kroužkovci (Annelida). Rovnoměrné (homonomní) zevní článkování těla je patrné i na vnitřním uspořádání celomu: (a) nervová soustava starobylých kroužkovců; (b) příčný řez tělem, (c) zvětšené schéma metanefridie.

kanálkem na povrch článku následujícího. Cévní systém je uzavřený a tvoří ho břišní a hřebetní céva často vzájemně spojené postranními, prstencovitými cévami (viz obr. 5.318). Nervová soustava sestává z obhltanového prstence a podélných pruhů s ganglii v každém článku. U nejstarobylejších forem zřetelně rozděláváme pár podélných nervů (konektivy) spojujících jasné oddělené páry ganglií v článcích vzájemně příčně propojené komisurami. S vývojem skupin se tento „žebříčkovitý“ typ mění díky splývání


páru ganglií v jednu zauzlinu v každém článku, tím splývají i konektivy a původní „žebříček“ se mění spíše v řadu zauzlin (viz obr. 5.275). S tímto typem se setkáváme u většiny odvozenějších skupin na větší části jejich nervové soustavy.

Asi 17 000 druhů je děleno do této třídy:


Mnohoštětinatci (Polychaeta) obývají převážně moře, méně sladké vody a zcela výjimečně i půdu. Jejich tělo nese přívěsky – na hlavové části jakási tykadla, trupové články pak tzv. **parapodia** – v základě dvojlaločné krátké výběžky opatřené štětinami a někdy i tenkostennými přívěsky, které slouží jako žábry (obr. 5.449). Patří



Obr. 5.449 Kroužkovci (Annelida). Příčný řez tělem mnohoštětinatce (Polychaeta).



Obr. 5.450 Mnohoštětinatci (Polychaeta) mají typicky utvářenou larvu – trochoforou.




Obr. 5.451 Mnohoštětinatci (Polychaeta).

Typickými zástupci jsou např. (a) afroditka plstnatá (*Aphrodite aculeata*), (b) rounnatec paví (*Sabella pavonina*) nebo (c) nereidka různobarvá (*Nereis diversicolor*).

sem většinou gonochoristi s nepřímým ontogenetickým vývojem. Typická larva – **trochofora** (obr. 5.450) – nese dva věnce plovacích brv a žije planktonně. Známe mnohoštětinatce lezoucí, plovoucí, ale i trvale přisedlé. Některé se živí jako predátoři, jiní konzumují rostlinnou potravu a většina přisedlých si přihání drobnohlednou potravu tykadlovitými výběžky k ústům (obr. 5.451).


Zástupci třídy **lilijcovci** (Myzostomida) se přes řadu výhrad zařazují většinou mezi kroužkovce zejména díky své alespoň naznačené metamorphii (opakovanému výskytu některých orgánů v těle, obr. 5.452). To lze na nich pozorovat i přes naprostou ztrátu zevního oddělení článků a oválný zploštělý tvar těla. Jedná se o hermafrodity s nepřímým vývojem. Během evoluce se specializovali na život uvnitř těl lilijic, tedy ostnokožců, kde často vytvářejí jakési hálky. Tyto útvary se

Obr. 5.452 Lilijcovci (Myzostomida). Tito milimetroví ektoparaziti lilijic jsou vybaveni savými ústy na spodu zploštělého těla, háčky a přísavkami.



zachovaly již z prvohorních fosilií lilijic. Fylogenetickou alternativou může být jejich blízkost ke schizocelným kmenům, zejména k ploštencům.

Máloštětinatci (Oligochaeta) ztratili ve vývoji parapodia, kterým polohu i počtem odpovídají jako rudimenty drobné štětiny na článkách (obr. 5.453). Povrch trávicí soustavy pokrývá v přední části houbovitá tkáň, tzv. **chloragogen**, do kterého se ukládají zplodiny metabolismu v pevné,




Obr. 5.453 Máloštětinatci (Oligochaeta). Anatomie přední části těla žížaly (*Lumbricus*).

nerozpustné formě. Tím se snižuje výdej vody z těla. Máloštětinatci dýchají celým povrchem těla. Jsou to **hermafroditi** s přímým vývojem. V dospělosti se kromě gonád aktivují i kožní žlázy a vylučují prstencovitý útvar, tzv. **opasek (clitellum)**, do kterého se ukládají vajíčka a při jeho pohybu přes samci pohlavní otvory dochází k jejich oplození. Celý opasek se pak svléká s tělem, uzavírá se a vytváří se tak z něj **kokon** s vajíčky. Máloštětinatci vynikají regenerační schopností.

Nejznámější máloštětinatci – **žížaly** (např. rod *Lumbricus*) – patří k nejvýznamnějším půdním živočichům. Zatahují organický opad do půdy, rozrušují ho, větší druhy vytvářejí chodby pro vzdušňující půdu a umožňují vodě půdu pronikat, konzumují půdní mikroorganizmy. Ovlivňují tak cykly živin v půdě a její regeneraci. Máloštětinatce najdeme i ve dně sladkých vod (**nítěnky** – rod *Tubifex*), kde mají podobnou funkci jako půdní druhy.

mezi krevsající živočichy (**hematofágы**). Napadají obratlovce a do rány vstřikují ze slinných žláz látky (**hirudin**), které zabraňují srážení krve. Proto rána krvácí ještě po určitou dobu po odpadnutí pijavky. K nejznámějším patří poměrně vzácná **pijavka lékařská** (*Hirudo medicinalis*) napadající savce včetně člověka, kteří vstoupí do vody, chobotnatky – např. **chobotnatka rybí** (*Piscicola geometra*, obr. 5.454b) – sají na rybách a obojživelnících. Jejich přemnožení v chovných rybnících může způsobit značné škody. V tropech padají drobné pijavky se stromů na kolemjdoucí hostitele – savce. Některé pijavky však krev nesají a živí se jako predátoři patřičně velkými bezobratlými, např. **pijavka koňská** (*Haemopis sanguisuga*) či naše nejběžnější pijavky – **hlitanovky** (obr. 5.454a) – časté spolu se svými plochými kokony v pomalu tekoucích a stojatých vodách.


Máloštětinatci a pijavky mohou být také posuzováni na základě společných znaků jako jedna třída **opaskovci** (Clitellata).



Obr. 5.454 Pijavky (Hirudinea): (a) hlitanovka bahenní (*Erpobdella octoculata*), (b) chobotnatka rybí (*Piscicola geometra*).

5.5.5.20 BRADATICE čili VLÁKNONOŠCI (Pogonophora)

Obyvají rourkovité schránky na dně moří. Dorůstají velikosti 5 cm až 2 m. Členění těla odpovídá spíše enterocelním živočichům (tři oddíly célovnu) s koncovou čtvrtou částí nesoucí štětiny (obr. 5.455). U většiny druhů nese protocelní partie jedno až několik set chapadélek. Trá-



Obr. 5.455 Bradatice (Pogonophora):
(a) vláknonošec *Spirobranchia beklemischevi*
vytažený z rourky, ve které (b) je ukryto celé tenké
tělo složené ze čtyř oddílů.