

BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ

Živá a neživá příroda III.

2. přednáška

ŘÍŠE ŽIVOČICHOVÉ

Kmen: HOUBOVCI
ŽAHAVCI
PLOŠTĚNCI
PÁSNICE
MĚKKÝŠI
KROUŽKOVCI
ČLENOVCI
OSTNOKOŽCI
STRUNATCI

HOUBOVCI (PORIFERA)

- Živočichové převážně mořští, žijící přisedle
- Živí se drobnými organismy, které filtruje z vody
- Tělo využívá jehličky z uhličitanu vápenatého, oxidu křemičitého nebo rohovité hmoty – **sponginu (mycí houby)**
- Rozmnožují se dělením, pučením nebo pohlavně
- Gemule – shluky buněk obalené jehličkami schopné přežít nepříznivé podmínky




GEMULE



ŽAHAVCI (CNIDARIA)

- Vodní, převážně mořské organismy.
- Mají žahavé buňky s jedem – aktivní lov a obrana vůči predátorům
- Nervová soustava rozptýlená, statokineticke a světločivné orgány
- Trávicí dutina – **láčka** – rozvod živin a jejich trávení
- Rozmnožování pohlavně (přes larvu) i nepohlavně **pučením** (strobilací)
- Během vývoje střídání stádií **polypa a medúzy** (stádium medúzy může scházet)

Třída MEDÚZOVCI



Pravidelné střídání
stádií polyp a
medúza
(stádium medúzy
trvá déle).




Třída POLYPOVCI



Nezmaři

- Velikost maximálně 2 cm, převládá přisedlé stádium, žijí i ve sladkých vodách.
- Úplně u nich chybí stádium medúzy



Medúzka sladkovodní



Trubýši – pouze mořští, vlákna často až několik metrů dlouhá, některé druhy s s velmi silným jedem.

Třída KORÁLNATCI

Žijí v teplých mořích. Chybí stádium medúzy.

Někteří si vytváří schránky nejčastěji z uhličitanu vápenatého – **horotvorná činnost**.

Žijí solitérně (sasanky) nebo vytváří kolonie (koráli).



MĚKKÝŠI (MOLLUSCA)

- Mají měkké nečlánkované tělo, které se skládá z **hlavy, nohy a útrobního vaku**.
- Plášt' vylučuje **vápenatou schránku** (**ulitu** nebo **lasturu**)
- U některých může být schránka **výrazně redukována** (**sépie** – **sépiová kost**) nebo **úplně chybět** (**plzák**)
- Dýchají **žábrami** (vodní) nebo **plícemi**

Třída PLŽI

- Nejpočetnější třídou z měkkýšů (žijí na souši i ve vodě)
- Charakteristická je pro ně **stočená ulita**
- Na hlavě jsou **smyslová ústrojí**, svalnatá noha využívá sliz usnadňující pohyb
- Často jsou **hermafrodité** (přítomnost samčích i samičích pohlavních žláz na jednom jedinci)
- Mořští plži mají **vývoj nepřímý** přes larvu – **veliger**
- Sladkovodní a suchozemští mají **vývoj přímý**
- Živí se **rostlinnou** i **živočišnou** potravou (některí i dravě)
- Součástí ústního ústrojí – jazyková pánska **radula** (**strouhání potravy**)

Suchozemští plži



Slímák popelavý



Hlemýžď zahradní



Suchomilka



Plzák lesní



Páskovka keřová

Sladkovodní plži



Babenka živorodá



Plovatka bahenní



Okružák ploský



Mořští plži



Ušeň mořská



Ostranka jaderská

Homolice mramorovaná



Zavinutec tygrovany



Tritonka římská



Třída MLŽI

- Mají dvouchlopňovou schránku ze dvou **lastur** (v hřbetní části spojené vazem, někdy i zámkem, uzavírání řídí živočich pomocí svalů)
- Chybí hlava včetně **raduly**
- Mají **dva otvory** – **přijímacím** nasávají vodu, ze které filtruji mikroskopickou potravu a kyslík, druhým – **vyvrhovacím** otvorem pak odchází voda s odpadními látky ve z těla
- Většina jsou **gonochoristé** – odděleného pohlaví
- Vývoj je nepřímý přes **larvu**

Sladkovodní mlži



Škeble rybničná



Velevrub malířský



Perlorodka říční

Mořští mlži



Hřebenatka



Srdcovka



Slávka jedlá



Perlotvorka mořská



Třída HLAVONOŽCI

- Vývojově **nejpokročilejší** skupina měkkýšů
- Dobře vyvinutý **nervový systém** – hlavně hlavová zauzlina - **mozek**
- Dobrý zrak – **komorové oči**
- Tělo tvoří **útrobní vak**, **hlava** a **8 – 10 chapadel**
- Plavou **vlněním ploutevního lemu** nebo **vlněním chapadel** (v nebezpečí vypuzováním vody z nálevky mohou zrychlit svůj únik a znesnadnit vypouštěním barviva z inkoustové žlázy)
- U většiny **vymizela schránka**
- Loví pomocí chapadel s přísavkami - **draví**
- Kolem ústního otvoru je **rohovitá vrstva** připomínající zobák, slinné žlázy přeměněné na jedové
- **Gonochoristé**, vývoj **přímý**, pečují o **potomstvo**



Sépie



Krakatice



Chobotnice pobřežní



Oliheň

1b

KROUŽKOVCI - ANNELIDA

- Živočichové červovitého tvaru
- Článkované tělo je kryto kutikulou
- U nás třída **máloštětinatci**
 - dýchají celým povrchem těla
 - hermafrodité (při rozmн. e důležitý opasek)
 - napomáhají rozkladu organických látek v půdě



Nitěnky



Žížala obecná

ČLENOVCI - ANTHROPODA

■ Podkmen: TROJLALOČNATCI

(vyhynulí trilobiti)

■ Podkmen: KLEPÍTKATCI

(Pavoukovci: pavouci, sekáči, štíři, roztoči)

■ Podkmen: KORÝŠI

(Perloočky, buchanky, rakovci – raci, krabi, ...)

■ Podkmen: VZDUŠNICOVCI

(Stonožky, mnohonožky, hmyz)

Zástupcům tohoto kmene budou věnovány další dvě přednášky)

OSTNOKOŽCI - ECHINODERMATA

- Mořští živočichové s vnější vápenatou schránkou
- Uvnitř těla systém cév naplněných mořskou vodou – změnou tlaku v jednotlivých cévách a panožkách se živočich pohybuje – **ambulakrální soustava**
- Většinou jsou to **gonochoristé**, mají larvy
- Živí se **dravě nebo mikroorganismy**



Hvězdice



Sumýši

Ježovky

