

METODY ŘEŠENÍ MATEMATICKÝCH ÚLOH II - S 2

Neurčité rovnice

Růžena Blažková

Lineární neurčitou rovnicí o dvou neznámých x, y rozumíme rovnici

$$ax + by = c, \text{ kde } a \neq 0, b \neq 0,$$

koeficienty a, b, c této rovnice jsou celá čísla a x, y jsou také celá čísla.

Podmínky řešitelnosti:

- Jestliže $D(a, b) > 1$ a D nedělí c , pak rovnice nemá řešení. Např. rovnice $6x + 8y = 17$ nemá řešení tak, aby x a y byla celá čísla.
- Jestliže $D(a, b) > 1$ a D dělí c , upravíme rovnici na tvar tak, aby $D(a, b, c) = 1$, pak rovnice má řešení. Např. rovnice $6x + 8y = 10$ pravíme na tvar $3x + 4y = 5$.

Nutnou a postačující podmínkou pro to, aby neurčitá rovnice $ax + by = c$ měla alespoň jednu dvojici řešení x_0, y_0 je, aby největší společný dělitel koeficientů a, b této rovnice dělil c . Jestliže celá čísla x_0, y_0 jsou řešením této neurčité rovnice, pak všechna řešení rovnice jsou

dána parametrickými rovnicemi $x = x_0 + \frac{b}{D}t, y = y_0 + \frac{a}{D}t,$

kde t je celé číslo.

Motivační úloha

Je dána rovnice $x + y = 10$. Tato rovnice může mít např. v množině všech reálných čísel nekonečně mnoho řešení. Doplníme-li další podmínky, počet řešení můžeme omezit.

1. Doplníme další rovnici, např. $x - y = 4$, dostáváme soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, jejímž řešením je $x = 7, y = 3$.

Tato soustava může být formulována jako slovní úloha: Najděte čísla x, y , jejich součet je 10 a jejich rozdíl je 4.

2. Rovnici řešíme v oboru přirozených čísel, řešením jsou uspořádané dvojice:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	9	8	7	6	5	4	3	2	1

3. Požadujeme-li, aby x a y byla přirozená čísla a přitom $x > y$, dostáváme uspořádané dvojice:

x	6	7	8	9
y	4	3	2	1

Metody řešení neurčitých rovnic:

- metoda experimentální
- redukční metoda
- pomocí kongruencí.

Příklady

1. Maminka chtěla koupit ledňáčky za 70 Kč. Měla možnost koupit dva druhy, za 8 Kč za kus a za 6 Kč za kus. Kolik kterých mohla koupit, když chtěla utratit právě 70 Kč.
2. Jana měla 50 Kč a chtěla za ně koupit žvýkačky. V obchodě jí nabídli žvýkačky za 6 Kč a za 4 Kč. Kolik kterých mohla koupit, když chtěla utratit právě 50 Kč?
3. Kolika způsoby můžeme zaplatit 53 Kč, jestliže máme k dispozici pouze pětikorunové a dvoukorunové mince? Najděte všechny možnosti.
4. Jak podělíme 100 osob, jestliže má každá osoba dostat jeden dárek, máme k dispozici 1 000 Kč a dárkové předměty v ceně 5 Kč, 30 Kč, 100 Kč ?
5. Máme rozdělit 100 Euro mezi 100 osob tak, že každý muž dostane 3 Euro, každá žena dostane 2 Euro a dvě děti dohromady 1 Euro.
6. Za 100 Kč máme koupit 100 kusů tužek. Modré stojí 4 Kč, zelené 2,50 Kč a červené 0,50 Kč. Modrých má být třikrát více než zelených, červených sedmkrát více než modrých. Kolik kterých koupíme?
7. V místnosti jsou čtyřnohé a trojnohé židle. Na každé židli sedí jedna osoba. Všech nohou v místnosti je 39. Kolik je v místnosti židlí čtyřnohých, kolik trojnohých a kolik osob ?
8. Dopravní podnik má k dispozici dva druhy autobusů, označíme je A, B. Autobus A pojme 90 osob, autobus B pojme 150 osob. Je třeba přepravit 12 000 osob. Kolik kterých autobusů je třeba vypravit?
9. Turistického zájezdu se zúčastnilo 286 lidí. K dispozici byly autobusy se 17 sedadly a s 19 sedadly (řidiče a jeho sedadlo neuvažujeme). Kolik autobusů každého druhu bylo pro zájezd použito, jestliže byla obsazena všechna sedadla?
10. Jestliže vytváříme skupiny žáků po sedmi, zbude jeden žák. Jestliže vytváříme skupiny po šesti, zbude pět žáků. Kolik je ve třídě všech žáků? Po kolika žácích bychom mohli skupiny vytvářet, aby žádný nezbyl?
11. Určete takové číslo a , které při dělení číslem 5 dává zbytek 4 a při dělení číslem 7 dává zbytek 3.
12. Určete nejmenší a největší trojčíferné číslo, které při dělení sedmi i při dělení třinácti dává zbytek 5.
13. Určete celé číslo, jehož pětinasobek dává při dělení třemi zbytek 5 a zároveň jeho dvojnásobek dává při dělení sedmi zbytek 3.
14. Určete nejmenší trojčíferné přirozené číslo, které při dělení sedmi i při dělení třinácti dává vždy zbytek o jednu menší než je dělitel.
15. Strany pravoúhelníku jsou zadány celými čísly. Jakou mají délku, jestliže obsah pravoúhelníku je číselně roven obvodu?

