

Problematika sluchových vad u dospělých a seniorů

Presbyakuzie (presbyakusis)

- ◆ klinicky definováno jako sensorineurální porucha v oblasti vyšších tónů , provázena mnohdy tinnitem
- ◆ fyziologická stařecká nedoslýchavost

Následky sluchových ztrát

1.v komunikaci mluvenou řečí

2.v orientaci sluchově postiženého v (akustickém) prostředí

Nejčastější projevy:

- ◆ slyšení jen hlasité řeči
- ◆ řeč je vnímána nezřetelně a nejednoznačně
- ◆ neschopnost vést rozhovor ve ztížených akustických podmínkách, tzn. na poště, v bance, atd. (přes sklo, na přepážce,...)
- ◆ televize, rádio, atd.

Sluchové vady získané v dospělosti

- ◆ **hlavní problém:**
- ◆ **etiologie:**

Nejčastější potíže:

- ◆ komunikační bariéra
- ◆ strádání v oblasti vnímání podprahových podnětů (deprese, omezení sociálních kontaktů)
- ◆ obavy ze ztráty zaměstnání, příp. ztráta zaměstnání
- ◆ obranné mechanismy:
- ◆ malá informovanost:

neslyšící od narození x ohluchlí v dospělosti a ve stáří

◆ **neslyšící od narození**

◆ **ohluchlí v dospělosti a ve stáří**

Následná péče po ohluchnutí

- ◆ u některých případů dochází ke spontánní úpravě, příp. k výraznému zlepšení
- ◆ u ostatních:

-

často:

psychická traumata → psychoterapie

Problematika generace seniorů

- ◆ **Kvalita života stárnoucích osob** (změna z důvodu příchodu nových stresových situací)

Sociální izolace

Presbyakuzie a senioři v domovech důchodců