

3.2. Выпадение гласных в беглой разговорной речи

168 Читайте слова. Обратите внимание, что сильной редукции вплоть до полного выпадения могут подвергаться гласные второго предударного слога. Второй предударный слог предшествует обычно достаточно отчетливо произносимому первому предударному слогу: самолёт [сма'л'о'т].

Надоёл, человек, колобок, говори, фотокарточка, доносились, университет.

169 Читайте слова. Обратите внимание, что наибольшей редукции, а иногда и полной редукции подвергаются гласные первого заударного слога (ударный гласный является сильным гласным, поэтому возможно ослабление произношения первого заударного): десять [д'э'ц'т'].

Минуточку, достаточно, холодно, обедала, хватит, проходит, работал, двадцать, может, десять, видимо, относится, преподаватели, деточка, карточка, окончательно, блюдечко, пробовал, выдадут, старому, шепотом, последовательность.

170 Разделите слова на слоги. Подчеркните те из них, где, по вашему мнению, гласные подвергаются наибольшей редукции. Объясните, почему вы так думаете. Прочитайте эти слова.

Благодарен, города, доктора, минуточку, преподаватели, попробовал, филологический, достаточно, организовывать, здорового, университет.

171 Читайте слова. Обратите внимание, что сильной редукции вплоть до полного выпадения гласного способствует:

- 1) положение между одинаковыми согласными: хохотал [*хлтал];
- 2) положение после мягких согласных: вчера [фч'ра];
- 3) соседство с группой согласных: в комнате [фкóмнт'ь];
- 4) чаще выпадают гласные, находящиеся рядом с сонорными согласными: таракан [трл'кан].