


Areny

**Uved'te, kterou skupinu uhlovodíků označujeme jako tzv. ARENY:**

➤ *Aromatické uhlovodíky (Areny) jsou cyklické uhlovodíky, jejichž vzorec je **vždy odvozen od vzorce základního aromatického uhlovodíku → BENZENU.***




**Obr. 1.: Struktura molekuly benzenu**

## Uved'te charakteristiku molekuly benzenu:

- *Molekula benzenu je tvořena šesti atomy uhlíku spojených chemickými vazbami do tzv. **cyklu (kruhu)**.*
- *Vazby mezi jednotlivými uhlíkovými atomy jsou však v něčem zvláštní: každá vazba mezi dvěma atomy uhlíku jak by byla **1,5násobná** (což se vyjadřuje **kroužkem uvnitř vzorce**).*
- *Tento typ chemických vazeb se vyskytuje u všech aromatických sloučenin a dává jim specifické vlastnosti oproti ostatním organickým sloučeninám.*
- *Benzenové jádro je **velmi stabilní** a je součástí řady dalších organických sloučenin, jako jsou např. **polycyklické uhlovodíky (naftalen, anthracen, fenanthren...)**.*

## ? Jaké jsou chemické vlastnosti aromatických sloučenin ?

- *Všechny aromatické uhlovodíky jsou jedovaté.* 
- *Většina arenů patří mezi látky zdraví nebezpečné.* 
- *Většina arenů jsou hořlaviny.* 
- *! Mnohé areny patří mezi látky nebezpečné pro životní prostředí.* 
- *Charakteristickým typem chemických reakcí jsou u arenů substituce:*



## ? Jaké jsou fyzikální vlastnosti aromatických sloučenin ?

- *Aromatické uhlovodíky s jedním benzenovým jádrem jsou kapalné látky charakteristického zápachu (odtud název aromatické).*
- *Hořlavé areny hoří čadivým plamenem, při hoření uvolňují velké množství sazí.*
- *Aromatiké uhlovodíky mají menší hustotu než voda a ve vodě jsou nerozpustné.*


## Uved'te hlavní zdroje aromatických uhlovodíků:

- *Nejdůležitějšími zdroji aromatických uhlovodíků jsou ropa a černouhelný dehet – získávají se z nich: benzen, toluen a naftelen, ze kterých se následně vyrábějí ostatní aromatické uhlovodíky.*

# ZÁSTUPCI ARENŮ

## BENZEN ( $C_6H_6$ )


- Je to bezbarvá, těkavá kapalina, charakteristického zápachu.
- Je hořlavý a se vzduchem vytváří výbušnou směs .\*
- Je jedovatý a má karcinogenní účinky.
- Používá se jako rozpouštědlo organických látok a jako výchozí látka na výrobu dalších organických sloučenin (léčiv, barviv, plastů).



Obr. 2.: Zásobní láhev benzenu.

# NAFTALEN

- Je to bílá, krystalická látka, charakteristického záachu.
- Používá se jako insekticid k hubení molů a na výrobu barviv, léčiv a rozpouštědel.
- Má schopnost **sublimovat** – při zahřívání přechází přímo z pevného na plynné skupenství.



Obr. 3.: Molekula naftalenu.



Obr. 4.: Sublimace naftalenu.

# *TOLUEN ( $C_6H_5-CH_3$ )*

- Je to bezbarvá, těkavá, vysoce hořlavá látka.
- Používá se jako rozpouštědlo (ředitlo), při výrobě barev, lepidel, ale také na výrobu výbušniny trinitrotoluenu (TNT).
- Používá se rovněž v potravinářském průmyslu na výrobu umělého sladidla sacharinu.
- Bývá zneužíván k inhalaci jako droga. Způsobuje nevratná poškození mozku a vnitřních orgánů, především jater.

Obr. 5.: Obchodní balení toluenu.

