

DIETA A ONEMOCNĚNÍ

DIETA PŘI DIABETU I. TYPУ

- Cukrovka 1. typu je onemocnění vznikající poškozením tzv. beta-buněk v ostrůvcích slinivky břišní a ztrátou schopnosti produkovat inzulin.
- Nejčastější příčinou je **autoimunitní (protilátkami proti vlastnímu tělu vznikající) zánět**.
- Při záchytu cukrovky 1. typu je glykemie obvykle vysoká – nad 10 mmol/l, nemocný ztrácí hodně tekutin močí a má velkou žízeň. Často je z něho cítit aceton.
- Do objevu inzulinu po 1. světové válce tito pacienti umírali.
- Dnes je léčba onemocnění snadná mnoha typy **inzulinových injekcí**.
- V minulosti stejně jako dnes je **nezbytnou součástí léčby dieta**.

- V dietě diabetiků 1. a 2. typu **existují rozdíly a neexistuje tedy univerzální diabetická dieta**. Hlavní rozdíly se týkají **rozložení jídel a omezení kvanta přijaté energie u diabetiků 2. typu**.
- Diabetik 1. typu je nucen k velmi pravidelnému příjmu 6-ti jídel denně účinkem inzulinových preparátů.
- Hyperinzulinemie se fyziologicky do 2 hodin po jídle normalizuje, u diabetika je nutno v důsledku přetrvávajícího efektu aplikovaného inzulinu vložit po 2–3 hodinách další jídlo, aby nedocházelo k hypoglykemii.
- Diabetik 1. typu má však i zvýšenou tendenci k tvorbě acetonu (ketóze).

- **Diabetes 2. typu je podmíněn především geneticky.**
- Typicky se vyskytuje v rodinách.
- Riziko pro potomka dvou diabetiků je téměř 100%, pro potomka diabetika a nedиabetika je dnes riziko vyšší než 50 %.
- Geneticky založený diabetik během života **postupně obvykle onemocní složkami tzv. metabolického syndromu** – androidní obezitou nebo hypertenzí.
- V této fázi je důležitá dieta zaměřená na prevenci diabetu, která je schopna riziko diabetu 2. typu významně oddálit.
- **Diabetik 2. typu** - u obézních diabetiků 2. typu, ale i u diabetiků s mírnou nadváhou, je důležitou součástí léčby **redukce hmotnosti**.
- U mnoha nemocných diabetem 2. typu se redukcí hmotnosti pravděpodobně diabetu přechodně zbaví.

- U diabetu 2. typu je klíčové rovněž **omezení tuků ve stravě**.
- Strava bohatá na tuky **prohlubuje inzulinorezistenci, působí toxicky na beta-buňky a zvyšuje energetickou nálož stravy.**
- Je nevhodná u diabetu 2. typu, ale i u diabetu 1. typu je třeba dodržovat antisklerotický ráz stravy.

DIETY V ONKOLOGII

- Zatímco nutriční faktory mohou hrát určitou roli v prevenci i ve vzniku nádorových onemocnění, je podíl dietních opatření v léčbě onkologických onemocnění sporný.
- Hlavním opatřením je dnes prevence malnutrice.
- Nádorová **malnutrice** je u onkologicky nemocných běžná a představuje **důležitý negativní prognostický faktor**, podle některých autorů dokonce závažnější než stadium nádorové nemoci.
- Malnutrice **oslabuje buněčnou imunitu, zpomaluje hojení a také zpomaluje reparační reakce po léčbě**.
- S malnutricí souvisí i svalová slabost, horší hybnost a následně i vznik trombóz a infekčních komplikací.
- Za úbytek svalů je pravděpodobně odpovědný PIF (proteolysis inducing factor) produkovaný některými nádory.

- Onkologicky nemocní mívají **anorexii** (vyvolávanou například některými interleukiny), depresi se sníženým příjmem potravy, katabolizující efekt tumoru a další důvody malnutrice.
- Anorexie a postižení sliznic mohou být i důsledkem chemoterapie a radioterapie.
- **Kachexie (marasmus)** z postižení trávicího traktu se obvykle označuje za sekundární jev.
- Za kritický se považuje úbytek hmotnosti nad **10 % hmotnosti za 6 měsíců**.
- Strava se velmi často uplatňuje v rozvoji nádorových onemocnění. Průkaz, že dieta vyvolala nádor u konkrétního jedince, je však prakticky nemožný.

VÝŽIVOVÁ PREVENCE

- Karcinogenní jsou nepochybně **produkty smažení a fritování** a důležitá je tedy nejen vlastní strava, ale i její úprava.
- Strava má většinou **účinky spíše potenciační, stimulující nebo naopak protektivní** a téměř nikdy není hlavním spouštěčem vzniku nádorových onemocnění.
- Pravděpodobně hlavní úlohu má genetická dispozice a strava působí jako napomáhající faktor. Dle zpráv Světové zdravotnické organizace vyplývá, že strava se podílí na vzniku nádorů asi ze 30 %.
- Logicky se předpokládá větší význam stravy při vzniku nádorů trávicího traktu než u nádorů v jiných lokalizacích.
- Zatím neexistují důkazy pro to, že by některá dieta nebo způsob stravování jednoznačně dokázal zabránit vzniku nádorových onemocnění.

- ▣ Konzumace dostatečného množství **ovoce a zeleniny** je považována za **vysoce protektivní faktor u většiny nádorových onemocnění**.
- ▣ Rizikovými faktory pro nádory horní části trávicího traktu stejně jako pro nádory hrtanu je **kouření a konzumace alkoholu**, přičemž jejich účinek se znásobuje.
- ▣ **Karcinom žaludku** - třetí nejčastější typ nádorového onemocnění na světě.
- ▣ Za dominantní rizikový faktor se považovala donedávna infekce **Helicobacter pylori**.
- ▣ Současné znalosti svědčí pro to, že *H. pylori* není jedinou ani nutnou podmínkou vzniku karcinomu žaludku.

- Výskyt karcinomu tlustého střeva a konečníku ve světě velmi kolísá.
- Incidenci nádoru tlustého střeva zvyšuje **jednostranná konzumace masa, kouření a alkohol**.
- Tento nádor je také významně častější **u osob s nadváhou a obezitou**.
- Velmi vysoký je výskyt u diabetiků 2. typu.

- ▣ Také u nádorů **jater a slinivky břišní** má protektivní vliv především konzumace listové zeleniny.
- ▣ U nádorů **slinivky břišní**, stejně jako u jiných nádorů, kde je významným rizikovým faktorem cigaretový kouř, se může uplatnit pozitivní působení antioxidantů obsažených v ovoci a zelenině.
- ▣ Nádory slinivky břišní jsou výrazně častější u diabetiků 2. i u diabetiků 1. typu.

- V současné době výsledky epidemiologických studií potvrzují význam nadměrného příjmu soli jako rizikového faktoru pro vznik karcinomu žaludku, a to nejen soli volné, ale např. i ve formě potravinového konzervačního prostředku.
- **MASO** - současné studie potvrzují pravděpodobné riziko konzumace červeného masa, ale ještě spíše masa uzeného, konzervovaného, a to včetně uzenin.
- Právě tepelná úprava masa hraje velmi podstatnou úlohu jak v prevenci nádorů žaludku, tak nádorů tlustého střeva a konečníku.
- V obou případech se za rizikovou úpravu považuje grilování, barbecue a výroba uzenin, resp. nakládání a konzervování masa.

- Je všeobecně známo, že v mase připravovaném za vysoké teploty (**smažení, grilování apod.**) vznikají **heterocyklické aminy a polycyklické aromatické uhlovodíky**.
- V obou těchto skupinách je řada látek s **karcinogenním či potenciálně karcinogenním účinkem**.
- Obecně platí, že čím je maso tmavší („spálenější“) a čím více šťávy/tuku z masa zkonzumujeme, tím je riziko vyšší, resp. tím vyšší je obsah nebezpečných látek.
- Konzervované maso pravděpodobně obsahuje nadměrné množství soli, případně některých dalších látek – uzeniny např. zplodiny vznikající při uzení apod.
- Z epidemiologických studií posledních let lze usoudit, že konzumace **červeného masa** představuje skutečné zvýšené riziko vzniku některých nádorů: **grilované maso** zvyšuje frekvenci adenomů tlustého střeva a rakoviny žaludku.

- Konzumace bílého masa se zdá pro vznik nádorových onemocnění méně rizikovým faktorem oproti masu červenému.
- Velké nádorové riziko představuje konzumace **akrylamidu**, látky vznikající **při tepelné úpravě brambor a obilí**.
- Vysoká je její koncentrace **v perníku, tmavých sušenkách, čokoládě, kakau a kávových výtažcích a rovněž v bramborových lupínkách**.
- Akrylamid dává pečeným potravinám **charakteristickou chuť propečených potravin** od pečiva až po maso.
- Vznikající látky mohou kromě kancerogenity působit i **aterogenně a nefrotoxicky**.
- Čím déle se potravina peče, tím více této látky vzniká.

- Otázka kvality a množství přijímaných tuků a jejich úloha v genezi tumorů střeva je velmi složitá.
- Příjem kolem 40 % energie v tucích má vysoký stupeň rizika (typická západní dieta) a příjem kolem 10–20 % relativně nízký stupeň rizika (např. tradiční japonská dieta).
- Větší riziko představují saturované tuky, jako tuk v hovězím mase a sádlo.
- Naopak nenasycené oleje, jako například olivový olej, mají riziko minimální (pro studenou kuchyni).
- Výskyt kolorektálního karcinomu snižují na zvířecích modelech ω -3-nenasycené mastné kyseliny obsažené v rybích tucích a olejích.
- Tento pozitivní efekt může souviset se zvýšenou produkcí prostaglandinů, které stimulační efekt na růst buněk snižují.