

MA0005 Algebra 2, 11. seminář

24. 11. 2022

1 Matice přechodu

- Matice přechodu od jedné báze k druhé bázi
- Změna matice lineárního zobrazení při změně báze
- Změna matice lineární transformace při změně báze

Literatura a zdroje

- Horák, P.: *Cvičení z algebry a teoretické aritmetiky I.* 2. vydání. Masarykova univerzita v Brně, 2002. ISBN 80-210-1853-4.
- Isibalo.com: *Matematika – Lineární algebra*. Dostupné z: <https://isibalo.com/matematika/linearni-algebra>.
- Fiala, J. a kol. Sbírka úloh z matematiky. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, 2008. Dostupné z: <https://kam.mff.cuni.cz/~sbirka>.

Matice přechodu – motivace

Motivace: Ve vektorovém prostoru V dimenze n jsou dány dvě různé báze

$$\alpha = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n), \quad \beta = (\vec{f}_1, \vec{f}_2, \dots, \vec{f}_n)$$

Matice přechodu – motivace

Motivace: Ve vektorovém prostoru V dimenze n jsou dány dvě různé báze

$$\alpha = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n), \quad \beta = (\vec{f}_1, \vec{f}_2, \dots, \vec{f}_n)$$

Chceme-li vektor $\vec{u}_\alpha = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ zadaný v souřadnicích báze α převést do souřadnic báze β , hledáme lineární kombinaci \vec{u}_α pomocí vektorů báze β ,

Matice přechodu – motivace

Motivace: Ve vektorovém prostoru V dimenze n jsou dány dvě různé báze

$$\alpha = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n), \quad \beta = (\vec{f}_1, \vec{f}_2, \dots, \vec{f}_n)$$

Chceme-li vektor $\vec{u}_\alpha = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ zadaný v souřadnicích báze α převést do souřadnic báze β , hledáme lineární kombinaci \vec{u}_α pomocí vektorů báze β , tedy hledáme $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ tak, aby

$$(u_1, u_2, \dots, u_n) = \vec{f}_1 \cdot x_1 + \vec{f}_2 \cdot x_2 + \dots + \vec{f}_n \cdot x_n,$$

Matice přechodu – motivace

Motivace: Ve vektorovém prostoru V dimenze n jsou dány dvě různé báze

$$\alpha = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n), \quad \beta = (\vec{f}_1, \vec{f}_2, \dots, \vec{f}_n)$$

Chceme-li vektor $\vec{u}_\alpha = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ zadaný v souřadnicích báze α převést do souřadnic báze β , hledáme lineární kombinaci \vec{u}_α pomocí vektorů báze β , tedy hledáme $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ tak, aby

$$(u_1, u_2, \dots, u_n) = \vec{f}_1 \cdot x_1 + \vec{f}_2 \cdot x_2 + \dots + \vec{f}_n \cdot x_n,$$

což vede na řešení systému $\vec{u} = \beta \cdot \vec{x}$, tedy řešení soustavy

$$\beta | \vec{u} = \left(\begin{array}{cccc|c} f_{11} & f_{12} & \dots & f_{1n} & u_1 \\ f_{21} & f_{22} & \dots & f_{2n} & u_2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ f_{n1} & f_{n2} & \dots & f_{nn} & u_n \end{array} \right)$$

Matice přechodu – motivace

Motivace: Ve vektorovém prostoru V dimenze n jsou dány dvě různé báze

$$\alpha = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n), \quad \beta = (\vec{f}_1, \vec{f}_2, \dots, \vec{f}_n)$$

Chceme-li vektor $\vec{u}_\alpha = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ zadaný v souřadnicích báze α převést do souřadnic báze β , hledáme lineární kombinaci \vec{u}_α pomocí vektorů báze β , tedy hledáme $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ tak, aby

$$(u_1, u_2, \dots, u_n) = \vec{f}_1 \cdot x_1 + \vec{f}_2 \cdot x_2 + \cdots + \vec{f}_n \cdot x_n,$$

což vede na řešení systému $\vec{u} = \beta \cdot \vec{x}$, tedy řešení soustavy

$$\beta | \vec{u} = \left(\begin{array}{cccc|c} f_{11} & f_{12} & \dots & f_{1n} & u_1 \\ f_{21} & f_{22} & \dots & f_{2n} & u_2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ f_{n1} & f_{n2} & \dots & f_{nn} & u_n \end{array} \right)$$

Budeme takovou soustavu řešit pro každý vektor zvlášť?

Matice přechodu od jedné báze k druhé bázi

Libovolný vektor \vec{e}_i báze α lze vyjádřit v bázi β takto:

$$\vec{e}_i = \vec{f}_1 \cdot p_{1i} + \vec{f}_2 \cdot p_{2i} + \cdots + \vec{f}_n \cdot p_{ni} = \sum_{k=1}^n \vec{f}_k \cdot p_{ki},$$

kde $(p_{1i}, p_{2i}, \dots, p_{ni})$ je vektor \vec{e}_i vyjádřený v bázi β .

Matice přechodu od jedné báze k druhé bázi

Libovolný vektor \vec{e}_i báze α lze vyjádřit v bázi β takto:

$$\vec{e}_i = \vec{f}_1 \cdot p_{1i} + \vec{f}_2 \cdot p_{2i} + \cdots + \vec{f}_n \cdot p_{ni} = \sum_{k=1}^n \vec{f}_k \cdot p_{ki},$$

kde $(p_{1i}, p_{2i}, \dots, p_{ni})$ je vektor \vec{e}_i vyjádřený v bázi β .

Matice přechodu

Maticí přechodu $P_{\alpha \rightarrow \beta}$ od báze α k bázi β rozumíme matici, pro níž platí

$$\beta = \alpha \cdot P_{\alpha \rightarrow \beta} \tag{1}$$

Matice přechodu od jedné báze k druhé bázi

Libovolný vektor \vec{e}_i báze α lze vyjádřit v bázi β takto:

$$\vec{e}_i = \vec{f}_1 \cdot p_{1i} + \vec{f}_2 \cdot p_{2i} + \cdots + \vec{f}_n \cdot p_{ni} = \sum_{k=1}^n \vec{f}_k \cdot p_{ki},$$

kde $(p_{1i}, p_{2i}, \dots, p_{ni})$ je vektor \vec{e}_i vyjádřený v bázi β .

Matice přechodu

Maticí přechodu $P_{\alpha \rightarrow \beta}$ od báze α k bázi β rozumíme matici, pro níž platí

$$\beta = \alpha \cdot P_{\alpha \rightarrow \beta} \tag{1}$$

Poznámka:

- Vektory obou bází se ve vztahu (1) zapisují sloupcově.
- Matice přechodu $P_{\alpha \rightarrow \beta}$ je regulární.
- Matice $(P_{\alpha \rightarrow \beta})^{-1} = P_{\beta \rightarrow \alpha}$ je maticí přechodu od báze β k bázi α a platí tento vztah:

$$\alpha = \beta \cdot P_{\beta \rightarrow \alpha} \tag{2}$$

Matice přechodu – příklady

Převádění souřadnic vektorů při změně báze: Při vyjádření souřadnic vektoru v jiné bázi potřebujeme matici přechodu **v opačném směru**:

- $\vec{u}_\beta = P_{\beta \rightarrow \alpha} \cdot \vec{u}_\alpha$
- $\vec{v}_\alpha = P_{\alpha \rightarrow \beta} \cdot \vec{v}_\beta$

Příklad 1

Jsou dány dvě různé báze α, β vektorového prostoru \mathbb{R}^3 . Najděte matice přechodu $P_{\beta \rightarrow \alpha}, P_{\alpha \rightarrow \beta}$ a určete souřadnice vektoru $\vec{u}_\alpha = (1, 2, 1)$ v bázi β a souřadnice vektoru $\vec{v}_\beta = (-1, 0, 3)$ v bázi α .

- 1 $\alpha = ((1, 0, 1); (2, 1, 1); (0, 0, 2)),$
 $\beta = ((0, 1, 1); (1, 0, 2); (2, 0, 2)).$
- 2 $\alpha = ((1, 0, 2); (2, 1, 1); (3, 2, 4)),$
 $\beta = ((1, 2, 0); (2, 2, 4); (0, 1, -3)).$
- 3 $\alpha = ((1, 2, 0); (2, 1, 1); (1, 0, 1)),$
 $\beta = ((2, 2, 1); (1, 2, 1); (0, 0, 2)).$

Výsledky: na dalším slajdu.

Výsledky Příkladu 1

$$1. P_{\beta \rightarrow \alpha} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ \frac{1}{2} & 2 & -1 \end{pmatrix}, A_{\alpha \rightarrow \beta} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix},$$

$$(1, 2, 1)_{\alpha} = (2, -2, \frac{7}{2})_{\beta}, (-1, 0, 3)_{\beta} = (8, -1, -1)_{\alpha}$$

$$2. P_{\beta \rightarrow \alpha} = \begin{pmatrix} -3 & -6 & -5 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}, P_{\alpha \rightarrow \beta} = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{1}{2} & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & \frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix},$$

$$(1, 2, 1)_{\alpha} = (-20, 14, 16)_{\beta}, (-1, 0, 3)_{\beta} = (-4, 3, -1)_{\alpha}$$

$$3. P_{\beta \rightarrow \alpha} = \frac{1}{4} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 6 & 4 \\ 4 & -4 & 4 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, P_{\alpha \rightarrow \beta} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -4 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix},$$

$$(1, 2, 1)_{\alpha} = (4, -2, \frac{1}{2})_{\beta}, (-1, 0, 3)_{\beta} = (5, -12, 17)_{\alpha}$$

Změna matice lineárního zobrazení při změně báze – příklady

Příklad 2

Lineární zobrazení $\varphi : U \rightarrow V$ je zadáno maticí A_S ve standardních bázích U, V . Pro zadané báze α prostoru U a β prostoru V určete matice $A_{S \rightarrow \alpha}, A_{\beta \rightarrow S}, A_{\beta \rightarrow \alpha}$.

$$1. \varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, A_S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\alpha = ((1, 2); (-2, 1)), \beta = ((1, 1, 1); (1, 1, 0); (1, 2, 0)).$$

$$2. \varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4, A_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \alpha = ((1, 0, 1); (1, 1, 1); (1, 2, 0)),$$

$$\beta = ((1, 2, -1, 0); (0, 1, -1, -2); (-1, 0, 0, -2); (2, 1, 0, -3)).$$

Změna matice lineárního zobrazení při změně báze – příklady

Příklad 2

Lineární zobrazení $\varphi : U \rightarrow V$ je zadáno maticí A_S ve standardních bázích U, V . Pro zadané báze α prostoru U a β prostoru V určete matice $A_{S \rightarrow \alpha}$, $A_{\beta \rightarrow S}$, $A_{\beta \rightarrow \alpha}$.

3. $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $A_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha = ((1, 1, 1); (1, 0, 4); (1, 4, 0))$,
 $\beta = ((1, 0); (4, 1))$.

Výsledky: na dalším slajdu.

Výsledky Příkladu 2

$$1. A_{S \rightarrow \alpha} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, A_{\beta \rightarrow S} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 5 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, A_{\beta \rightarrow \alpha} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & -10 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$2. A_{S \rightarrow \alpha} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, A_{\beta \rightarrow S} = \frac{1}{7} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 5 & 12 \\ -11 & -5 & -19 \\ 3 & 2 & 16 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A_{\beta \rightarrow \alpha} = \begin{pmatrix} \frac{16}{7} & 3 & 2 \\ -\frac{30}{7} & -5 & -3 \\ \frac{19}{7} & 3 & 1 \\ \frac{5}{7} & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$3. A_{S \rightarrow \alpha} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}, A_{\beta \rightarrow S} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A_{\beta \rightarrow \alpha} = \begin{pmatrix} -6 & -15 & -11 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

Změna matice lineární transformace při změně báze – příklady

Příklad 3

Lineární transformace $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ je zadána maticí A_S ve standardní bázi prostoru \mathbb{R}^3 . Pro bázi

$$\alpha = ((1, 1, 1); (1, 1, 0); (1, 2, 0))$$

prostoru \mathbb{R}^3 určete matice $A_{S \rightarrow \alpha}$, $A_{\alpha \rightarrow S}$, $A_{\alpha \rightarrow \alpha}$.

$$1. A_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad 2. A_S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 7 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$3. A_S = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Výsledky Příkladu 3

$$1. A_{S \rightarrow \alpha} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \\ 9 & 5 & 6 \end{pmatrix}, A_{\alpha \rightarrow S} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 4 \\ -4 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_{\alpha \rightarrow \alpha} = \begin{pmatrix} 9 & 5 & 6 \\ -4 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$2. A_{S \rightarrow \alpha} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 6 & 5 & 8 \\ 7 & 6 & 5 \end{pmatrix}, A_{\alpha \rightarrow S} = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 1 \\ -7 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_{\alpha \rightarrow \alpha} = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 5 \\ -5 & -5 & -3 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Výsledky Příkladu 3

$$3. A_{S \rightarrow \alpha} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 7 & 6 & 8 \end{pmatrix}, A_{\alpha \rightarrow S} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -4 & -5 & 6 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix},$$
$$A_{\alpha \rightarrow \alpha} = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 8 \\ -3 & -9 & -14 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$