

STŘEDNĚ TĚŽKÉ, TĚŽKÉ A HLUBOKÉ MP



Středně těžké MP

- IQ 35- 49
- Často organická etiologie
- Rozvoj myšlení a řeči výrazně opožděn, opoždění přetrvává do dospělosti
- Možný výskyt epilepsie, PAS a dalších neurologických a tělesných obtíží
- Somatické vady méně časté



- **Řeč** : jednoduchá, slovník obsahově chudý, vyskytují se dysgramatismy, jen jednoduché věty nebo slovní spojení. Někdy pouze nonverbální komunikace.
- Slabá schopnost kombinace a usuzování, třídění, srovnávání, analýzy, syntézy
- **Vývoj motoriky** zpomalen, trvale zůstává celková neobratnost, nekoordinovanost pohybů a omezení jemných úkonů
- **Samostatnost v sebeobsluze** pouze částečná




- Emocionální labilita, nepřiměřené afektivní reakce, infantilní projevy, zvýšená emocionální dráždivost a závislost
- **Vzdělávání:** v ZŠ speciální (1. díl RVP ZŠS), možnost inkluze do běžné ZŠ (s podpůrnými opatřeními nejčastěji 4.st)
- Další vzdělávání nejčastěji v **praktické škole.**
- Jednoduché pracovní zařazení, nejčastěji pod dohledem nebo v **chráněném prostředí**
- **Výskyt v celkovém počtu jedinců s MP 12%, v populaci 0,4%**





Těžké MP

- IQ 20- 34
- Psychomotorický **vývoj výrazně opožděn** již v předškolním věku
- Značná **pohybová neobratnost**, dlouhodobé osvojování koordinace pohybů
- **Časté somatické vady** a příznaky celkového poškození CNS
- Možnost **osvojení jen základních hygienických návyků** a prvků sebeobsluhy
- **Značné omezení psychických procesů, poruchy pozornosti**




- **Minimální rozvoj komunikačních dovedností, řeč jednoduchá, omezena na jednoduchá slova. Nemusí se vytvořit.**
- **Výrazné narušení afektivní sféry**
- **Poznává blízké osoby, komunikuje, potřeba celoživotní péče**
- **Vzdělávání v ZŠ speciální (2. díl RVP ZŠS), inkluze do běžné ZŠ značně náročná**
- **Výskyt v celkovém počtu jedinců s MP 7%, v populaci 0,3%**





Hluboké MP

- IQ 19 a méně
- **Těžké postižení celé osobnosti**
- Stereotypní pohyby, výrazná afektivní instabilita
- **Kombinace s postižením** sluchu, zraku, těžkými neurologickými poruchami, PAS, MO (hypersalivace)
- Častý atypický autismus
- **Naprostá závislost na pomoci okolí**
- **Nonverbální komunikace** bez smyslu. Výkřiky, grimasy, **echolálie**



- **Max porozumění jednoduchým požadavkům**
- **Totální porušení afektivní sféry**
- **Sebepoškozování (autostimulace)**
- **Dožívají se nižšího věku (výrazné poškození CNS)**
- **Výskyt v celkovém počtu jedinců s MP 1%,
v populaci 0,2%**



