

KAZUISTIKA – KVS II. – vztah hormonální antikoncepce k trombofilnímu riziku

Osobní anamnéza:

16letá dívka přichází na ambulanci lékaře pro bolest a otok levého lýtka. Klinické, ultrazvukové i laboratorní vyšetření ukazuje na rozsáhlou trombózu hlubokého žilního systému levé dolní končetiny.

Anamnesticky pacientka nemá zvýšenou rodinou zátěž trombofilních rizik (mutace faktoru V Leiden, MTHFR, mutace protrombinu).

Léková anamnéza:

Před 10 měsíci nasazena hormonální antikoncepce pro dysmenorheu. Navíc zjištěna porucha životosprávy – pacientka kouří, je zvyklá nesprávně sedět se zkříženýma nohama při učení. Pacientka hospitalizována, za krátkodobé hospitalizace nasazena léčba LMWH, již 2. den zjištěny známky rekanalizace, proto pacientka propuštěna a po dobu 5 dní plánováno podávání LMWH a warfarinu, následně převedena jen na sekundární profylaktické podávání warfarinu.

Úkoly:

1. Je užívání hormonální antikoncepce zvýšeným rizikem pro výskyt trombembolické nemoci?
2. Jaká je absolutní kontraindikace nasazení hormonální antikoncepce?

(mazankovad@vfu.cz)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ