

Psychologické vyšetření u jednotlivých diagnostických okruhů

Hana Přikrylová Kučerová
kucerovahanka@gmail.com

Psychologické vyšetření

- je systematický a klinickým psychologem řízený proces, jehož cílem je poznání psychiky pacienta, případně i toho, co ji v konkrétním případě ovlivňuje, utváří a modifikuje
- diagnostika poruch vývoje
- diagnostika poruch zdraví
- indikace preventivních, léčebných a rehabilitačních opatření
- kontrola výsledků léčby
- posudková a znalecká činnost

Psychologické vyšetření

- studium dostupných materiálů
- výběr psychologických metod
- vlastní vyšetření
 - > navázání kontaktu
 - > aplikace psychologických metod
- vyhodnocení a interpretace výsledků
- formulace klinického nálezu a sepsání závěrečné zprávy

Základní součásti psychologického vyšetření

- základní údaje o pacientovi
- důvod, účel a cíl (kdo jej zadává)
- kdy a v kolika sezeních
- aktuální zdravotní stav pacienta
- chování pacienta během vyšetření
- použité psychologické metody a jejich stručné výsledky
- klinický nález a interpretace souvislostí
- závěr – souhrn vyšetření
- doporučení

Neuropsychologie

- ◉ zkoumá vztah mezi mozkem a chováním
- ◉ klinická neuropsychologie
 - > vztah mezi poškozeným mozkem a chováním
- ◉ hledání vztahů
 - > mezi chováním a neurofyziologií
 - > chováním a centrální nervovou soustavou

Neuropsychologické vyšetření

- chování
 - > kognice – jak zacházíme s informacemi
 - > emoce – city a motivace
 - > exekutivní funkce – způsob projevu chování
- smyslem je zevrubný popis chování, ověření subjektivně podávaných obtíží, zjišťování poklesu kognitivní výkonnosti a odhad potencionálních možností zlepšení

Neuropsychologické vyšetření

- speciální testy, lépe postihující poškození mozku
- neuropsychologické testy jsou citlivější ke narušení kognitivních funkcí než běžná měřítka inteligence
- vztahuje současnou úroveň fungování ke známé nebo předpokládané premorbidní úrovni (ne k širší normě)


Psychopatologické projevy poškození mozku

- převažují poruchy kognitivních funkcí
 - paměť, pozornost, učení
- poruchy v oblasti vnímání (halucinace), obsahu myšlení (bludy), nálady a emocí (deprese, elace, úzkost) nebo změny v osobnosti a chování při absenci nebo minimálním poškození kognitivních a senzorických funkcí


Screeningové/orientační vyšetření

- klinická praxe – nejprve screeningové vyšetření
 - kognitivní fce bývají často poškozeny jako celek (generalizovaný deficit)
 - Test hodin, MMSE, MoCa, Addenbrook ACE-R, Paměťový test učení, ...
 - při absenci obtíží těžší zkoušky
 - Bourdonův škrtací test, D2
 - při neporušení se dále nepokračuje
 - retest – jiná sada slov, jiné pootočení ručiček, ...
- základní orientace
 - počítání (odečítání sedmičky od sta)
 - psaní (napište větu)
 - všeobecné informace
 - interpretace přísloví – zkouška abstraktního a symbolického myšlení


Rey-Osterriethova komplexní figura




Rey-Osterriethova komplexní figura - kopie




Rey-Osterriethova komplexní figura - kopie




Rey-Osterriethova komplexní figura - reprodukce




Test kresby hodin



Test kresby hodin




Kresba lidské postavy a písmo



Postava


Postava je delšíha
černavý středníha
stohle. Pro výjezd
bez druhu pro výměny

Kresba lidské postavy a písmo



Mám rád všechny žádce
(mám rád všechny žádce)

Kresba stromu



Podrobné vyšetření

- komplexní baterie neuropsychologických testů
 - > Halstead-Reitan Neuropsychological Battery (J. Preiss)
 - > Luria-Nebraska Neuropsychological Battery (P. Kulíšťák)
- baterie sestavované dle potřeby neuropsychologa, výzkumu, jeho pracoviště,...

Neuropsychologický nález

- základní údaje o pacientovi
- cíl vyšetření
- pozorování chování
- seznam administrovaných testů
- kvantitativní interpretace
 - > hrubé skóry nebo percentily
- kvalitativní interpretace
 - > vztah k praktickému životu
- závěr – souhrn vyšetření
- doporučení

Wechslerovy
vážené skóry

IQ skóry

T skóry

SD

Percentily

Z-skóry

13	115	60	1	84,13%	79,77– 87,83	0,83–1,16
12	110	57	2/3	74,75%	69,15– 79,77	0,50–0,83
11	105	53	1/3	63,06%	56,62– 69,15	0,16–0,50
10	100	50	0	50%	43,38– 56,62	-0,32
9	95	47	-1/3	36,94%	30,85– 43,38	-0,66
8	90	43	-2/3	25,25%	20,23– 30,85	-1,33
7	85	40	-1	15,87%	12,17– 20,23	-1,99

Aplikace v psychiatrii

- časté otázky pro neuropsychologa a neuropsychologické vyšetření
 - > Jde u pacienta o kognitivní deficit?
 - > Mohlo by jít o počínající demenci?
 - > Jaký je vývoj kognitivních funkcí při opakovaných kontrolách?

Aplikace v psychiatrii

○ komplikace

- floridní psychotická symptomatika,
deprese,.....
- vliv psychiatrické medikace
- vliv osobnosti
- přítomnost kognitivního deficitu, změny
osobnosti v důsledku chronického
duševního onemocnění
 - např. u 85% nemocných se schizofrenií
nacházíme narušení kognitivních funkcí

- Organicita
- Defekt
- Deteriorace
- Kognitivní deficit

Kognitivní deficit(y)

- termín **kognitivní** – poznávací označuje řadu mentálních a intelektuálních schopností, které závisejí na funkci mozkové kůry, jako je vnímání, paměť, řeč, usuzování, učení se,.....
- doporučení – používat termín **kognitivní deficit**, starší termín **organicita** raději neužívat
 - › vyhnout se tak nejasnostem vyplývající ze spojení jako „organický deficit u osob se závislostí na alkoholu“, protože není často vůbec jasné, zda v praxi jde o reverzibilní či trvalý úbytek intelektových funkcí a tímto označením může dojít k mylnému dojmu, že deficit je „trvalý“

Kognitivní deficit u schizofrenie:

současný stav znalostí

- ◉ jádrové/základní postižení, které zásadně ovlivňuje
 - průběh a zejména funkční výsledné stavy onemocnění
 - zařazení do komunity, schopnosti řešení sociálních problémů a získávání psychosociálních dovedností
- ◉ deficit není specifický pro schizofrenii
 - deprese
 - obsedantně - kompulzivní poruchy
 - schizotypální poruchy, schizoafektivní poruchy
 - BAP; PPP

Kognitivní deficit u schizofrenie:

současný stav znalostí

- kognitivní dysfunkce se projevuje především v paměti, ve stavech pozornosti a v narušení vyšších integrujících exekutivních funkcích
- poruchy v expresivních složkách kognice, jako je řeč a motorika

Jednotlivé složky kognitivního deficitu

- paměť - u schizofrenie je široká škála postižení paměťových funkcí
 - > narušení paměti je spíše v oblasti vštěpování informací než jejich udržení
- exekutivní funkce –
 - > schopnost správného zpracování informací
 - > jádro problémů v běžném fungování
 - > obtíže v sestavování plánu a jeho uskutečňování
 - > obtíže v řešení problémů, zvláště při nutnosti využít nové kombinace dosavadních znalostí

Jednotlivé složky kognitivního deficitu

- pozornost –
 - komplexní psychologická funkce
 - negativně ovlivňuje další kognitivní funkce, zejména paměť
- motorické dovednosti - motorické úkoly vykonávány neefektivně, pomaleji, pohyb je přerušován, nižší schopnost učit se z chyb a korigovat je
- řeč – „schizofrenie je cena, kterou lidstvo platí za vývoj řeči“
 - novotvary, rozvolnění logických vazeb v procesu myšlení

Kognitivní deficit u schizofrenie:

současný stav znalostí

- stabilní v čase
- nezávislý na věku, začátku onemocnění, na progresi symptomatologie
- nesouvisí s intelektem

- má svůj odraz ve strukturálních a funkčních abnormitách CNS
 - DLPFC, limbický systém, hipokampus, thalamus, bazální ganglia
- souvisí s nepříznivou prognózou onemocnění

Kognitivní deficit u schizofrenie:

současný stav znalostí

- souvisí se zhoršeným náhledem nemocnosti
- snižuje schopnost sociální adaptace a kvalitu života
- zvyšuje náklady na léčbu nemoci
- ne každý nemocný schizofrenií vykazuje kognitivní deficit
- izolované narušení až generalizovaný deficit
- rozdílná závažnost kognitivního narušení

Kognitivní deficit podle stupně závažnosti

● mírný

- › poruchy pozornosti, poruchy paměti
- › 0,5 – 1,0 SD

● středně těžký

- › poruchy pozornosti, opožděná výbavnost paměti, porucha vizuálně motorických dovedností, porucha paměti
- › 1,0 – 2,0 SD

● těžký

- › porucha učení, porucha exekutivních funkcí, snížené PM tempo, porucha plynulosti řeči, poruchy paměti
- › 2,0 – 5,0 SD


Vývoj kognitivního deficitu

- změny již v rámci premorbidního vývoje u dětí
 - např. poruchy verbální paměti, zhoršení školního prospěchu
- dříve měřitelný než jiný aspekt nemoci – významnější primární cíl pro léčbu
- z přítomnosti kognitivního narušení nelze predikovat následné propuknutí schizofrenie
- premorbidní KD není dostatečně specifický pro schizofrenii
 - podobný KD u dětí, které později onemocní afektivní poruchou nebo i u dětí, kde se v budoucnosti žádná porucha neobjeví

Vývoj kognitivního deficitu


- adolescence - výkon budoucích pacientů se schizofrenií významně horší než u zdravých vrstevníků
- prodromální fáze – prohlubování kognitivního narušení
- manifestace první epizody schizofrenie – kognitivní deficit zjevný a snadno zjistitelný

85 % pacientů se schizofrenií má postižené kognitivní funkce !!!




Kognitivní deficit u pacientů s první epizodou schizofrenie

(n=94)



Kognitivní funkce u první epizody a chronické schizofrenie



Proč naši pacienti potřebují vyšetření kognitivních funkcí?

- ◉ kognitivní funkce jsou poměrně stálá charakteristika (stálý deficit)
- ◉ souvisí s pracovními schopnostmi
- ◉ souvisí s běžným každodenním životem
- ◉ znalost kognitivních funkcí zvyšuje znalost o budoucí adaptaci a fungování pacienta

Měření kognitivního deficitu

- iniciativa pro výzkum měření a léčby ke zlepšení kognitivních funkcí u schizofrenie
 - › (MATRICS, Green et al., 2004; www.matrics.ucla.edu)
- deficit celkový (generalizovaný) i specifický
 - › specifický – disproporčně větší ve třech oblastech:
 - pozornost (udržovaná pozornost, vigilita)
 - paměť
 - exekutivní funkce

Měření kognitivního deficitu

- většina odborníků iniciativy MATRICS se nedomnívá, že jsou zapotřebí testy specifické pro kognitivní deficit u schizofrenie
 - což neznamená, že není zapotřebí nové testy vyvíjet či staré upravovat a používat nově
 - jeden z odborníků uvádí, že „mozek není organizován podle nemocí. Podobné kognitivní deficity je možné nalézt u mnoha různých neurologických poruch“
- minimální délka baterie byla doporučena 60 minut
 - nejdelší 120 minut, optimum 60 minut

Jaké parametry?

- reliabilita test-retest
- využitelnost při opakovém měření Vliv nácviku
- vztah ke zvládání problémů v běžném životě
- potencionální citlivost v důsledku odpovědi na farmaka Např.Slovník, Informace nejsou vhodné
- tolerance pacientem a praktičnost

Vyšetření musí být snesitelné, dostatečně dlouhé a přinášet užitečné informace, ale ne příliš nudné, ne obtížně vyhodnotitelné atp.

Jaké oblasti kognitivních funkcí?

- pracovní paměť
- pozornost/vigilita
- verbální učení a paměť
- vizuální učení a paměť
- usuzování a řešení problémů
- rychlosť zpracování informací
- sociální kognice

Neuropsychologická baterie

- 1. Reliabilita test-retest
- 2. Využitelnost při opakovaném měření
- 3. Vztah ke zvládání v běžném životě
- 4. Potencionální citlivost v důsledku odpovědi na farmaka
- 5. Tolerance pacientem a praktičnost

rychlosť zpracování informací – **Symboly**

pracovní paměť – **Řazení písmen a čísel**

pozornost – **TMT A + B**

verbální učení a paměť – **Paměťový test učení**

vizuální učení a paměť – **Reyova figura - kopie**

řeč - **VFT**

vizuální učení a paměť – **Reyova figura – reprodukce**
(retest figura Taylorové)

premorbidní schopnosti – **Informace**

verbální učení a paměť – **Paměťový test učení – oddálení
(30 min.)**

usuzování a řešení problémů – **WCST, Tower of London**

lateralita – **Edinburgh**

Kognitivní funkce u schizofrenie

Kognitivní funkce/test	Logická paměť	Verbální asociace	Verbální fluenze	R-O figura	TMT-A	Číselný čtverec	Hanoiská věž	Stroopův test	WCST
Paměť'									
Psychomotorické tempo									
Řeč-slovní plynulost									
Konstrukční praxe									
Vizuomotorická koordinace									
Exekutivní funkce									
Pozornost									
Odolnost vůči zátěži									

44 míst setkání

kognitivní funkce/test	Logická paměť	Verbální asociace	Verbální fluence	R-O figura	TMT-A	Číselný čtverec	Hanoiská věž	Stroopův test	WCST
Paměť	++ 1)	++ 2)	++ 3)	++ 4)		++ 5)	++ 3)	+ 3)	++
Psychomotorické tempo			++	+	++	++	++	++	
Řeč-slovní plynulost	+	+	++					+	
Konstrukční praxe				++					
Vizuomotorická koordinace					++	++	++		
Exekutivní funkce				+				++	++
Pozornost	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Odolnost vůči zátěži	+	+	+	+	+	+	+	+	+

1-učení,krátkodobá paměť pro auditivní podněty, 2-asociativní učení, 3-pracovní paměť, 4-paměť pro vizuální podněty, 5-učení, paměť pro vizuální podněty, prostorové uspořádání a pohyb,
 ++ hlavní oblast testování, + vedlejší oblast testování


Kognice a vztah k léčbě

- nemocní s lepším vztahem k léčbě mají lepší prognózu
- nemocní s větší motivací mají lepší vztah k léčbě
- kognitivní deficit u schizofrenie
 - > snižuje motivaci
 - > snižuje osobní zaangažovanost do léčby
 - > snižuje spolupráci při léčbě

Důsledky kognitivního deficitu u schizofrenie

- signifikantně omezuje sociální a pracovní výkonnost
 - KD je hlavní příčinou pracovní neschopnosti a problémů v každodenním fungování
- ovlivňuje výsledné stavy onemocnění
- prolíná se s účinností psychoedukace, tréninkem sociálních dovedností a ostatními terapeutickými přístupy
- těžký kognitivní deficit vede k delším a častějším hospitalizacím v souvislosti s nízkým náhledem a nespoluprací pacienta

Možnosti ovlivnění kognitivního deficitu



- vzájemné vztahy mezi reálným (funkčním) výsledným stavem onemocnění a jednotlivými léčebnými možnostmi
- výsledné stavy nejsou často závislé na psychotických symptomech, ale spíše na úrovni kognitivních funkcí a jsou tak jen nepřímo ovlivněny farmakoterapií

Možnosti ovlivnění kognitivního deficitu

- pozitivní účinky - opakováně prokázány při terapii antipsychotiky druhé generace
- nicméně vlastní klinický efekt zůstává málo robustní
 - léčba klasickými antidopaminergními antipsychotiky se až na výjimky obecně nepovažuje za přínosnou pro kognitivní postižení
 - navíc potřeba přídatné anticholinergní medikace ke zmírnění nežádoucích účinků dále zhoršuje kognitivní výkon

Neurokognitivní rehabilitace

Neurokognitivní rehabilitace

- prakticky aplikovatelnou alternativou terapie kognitivních poruch je neurokognitivní rehabilitace
- podle přístupu
 - „**kognitivní remediací**“ - pokouší se pomocí opakovaného nácviku a osvojování si kompenzačních strategií posilovat specifické funkce
 - „**kognitivní adaptace**“ - pomáhá nemocným překonat jejich deficit modifikací prostředí

Efektivita rehabilitace u schizofrenie

- účinnost rehabilitace kognitivního deficitu u schizofrenie byla sledována v četných studiích
- navzdory metodologickým problémům - většina autorů se shoduje, že KD u schizofrenie lze rehabilitovat !!!
- zajímavým nálezem, jsou i kazuistiky, podle kterých rehabilitace kognitivních funkcí přinesla i zlepšení mozkové perfuze na SPECTu

Kognitivní remediacie


- od pouhého tréninku (opakování stejného úkolu) k učení se nových strategií jak uspořádat informace (nové dovednosti jak řešit stejný úkol)
- založena na dvou základních premisách
 - kognitivní funkce jsou u schizofrenie narušeny a tyto funkce je možné **zlepšit*** pomocí psychologických metod – training
 - kognitivní zlepšení má přímý dopad na každodenní fungování
- *cílem remediacie je funkce **napravit**, nikoliv je **vrátit** do premorbidního stavu !!!

Cíle a východiska remediacie kognitivního deficitu

Cílem je zvýšit rychlosť, flexibilitu a následně efektivitu zpracování informácií.



Od základního nácviku pozornosti a exekutivních dovedností k řešení problémů (od jednoduchých ke komplexnějším úlohám).



Od nácviku základních kognitivních dovedností → komplexní rehabilitaci sociální kognice.

Možnosti KR u pacientů se schizofrenií

trendy:

- zařazovat KR do stávajících programů léčby
- již na počátku onemocnění (1. epizoda) !!!
- nejen hospitalizovaní, ale i ambulantní pacienti

možnosti:

- > komplexní postupy
- > počítačové programy
- > nespecifické intervence



Integrovaný psychologický program pro schizofreniky (IPT)

- Brenner a spol. (1992)

● 5 dílčích programů o vzrůstající náročnosti:

- > kognitivní diferenciace
- > sociální vnímání
- > verbální komunikace
- > sociální dovednosti
- > řešení problémů
 - skupina 4-8 pacientů se 2 terapeuty
 - 2 až 5krát týdně
 - sezení trvá 30 až 90 minut
 - celková délka programu je několik měsíců
- > podle míry postižení jsou pacienti zařazováni do různě náročných podprogramů
- > program je vysoce strukturován, využívá názorných pomůcek, hraní rolí, nácviku podle vzoru, zpětné vazby atd.

IPT

Brenner et al.(1992)

○ **kognitivní diferenciace**

- › třídění kartiček podle znaků
- › nadřazené verbální pojmy (synonyma, antonyma, definice slov apod.)
- › hledání myšleného předmětu pomocí dotazů skupině (ano-ne)

○ **sociální vnímání**

- › popis sociálních situací na obrázcích, hledání smyslu, titulek apod.

○ **verbální komunikace**

- › opakování věty, opakování smyslu věty vlastními slovy, otázky a odpovědi na určité téma, připravené sdělení a diskuze k němu ve skupině, volná komunikace


○ **sociální dovednosti**

- › kognitivní zpracování a hrani základních sociálních dovedností (děkování, odmítnutí, omluva, pochvala až po pohovor při hledání práce)

○ **řešení problémů**

- › definice, brainstorming, výhody a nevýhody řešení, nejvhodnější řešení, plán konkrétních kroků, realizace

PSS – CogRehab



Bracy, 1983

NEUROP-2

The screenshot shows the main interface of NEUROP-2. At the top, it says "NEUROP-2 (www.neurop.de)". Below that is a menu bar with buttons for "P Proband", "SE Script erstellen", "SA Script abspielen", "DA Daten anzeigen", "SQL SOL EDITOR", "? Hilfe", and "E Ende".



The main area is a grid of words under the heading "NEUROP-2". The columns are labeled ABT, ADAM, ALEX, AUDIO, BILAT, E16, FIGUR, FLASH, and FRAG. The rows contain various words like GONGO, HANOI, HRP, IGATA, JUMPS, KATEGO, KOMM, KIQ, etc.

ABT	ADAM	ALEX	AUDIO	BILAT	E16	FIGUR	FLASH	FRAG
GARAGE	GONGO	HANOI	HRP	IGATA	JUMPS	KATEGO	KOMM	KIQ
LAMPEN	LABYR	LAGER	LISEQ	LONDON	MEMORY	MIXER	MOS	NATE
NUQ	OPKIS	ORION	PAARE	PUMEM	PYRA	QUICK	RAUM	R4
R5	REFIND	SAETZE	SAT66	SEMDI	SCHACH	SNOW	SPEED	SPUR
STOP	SUDOKU	TELEG	VEWO	VIGIL	WOTAB	ZICK		



At the bottom left is a red "THNP" button, and at the bottom right is a green "NEUROP Editor" button.



Gaál, 1993





Bracyho program PSS CogReHab



- multimediální software
- 8 modulů s modifikovatelnými parametry; 64 úloh
- od nácviku pozornosti přes vizuálně prostorové a paměťové úlohy až po komplexní řešení
- srozumitelný, snadné použití, individuálně nastaviteľný







Počítačové programy

○ výhody

- › komplexnost administrovaných úloh, okamžitá zpětná vazba, schopnost zvýšené motivace, flexibilita v reakci na výkony a chyby, schopnost uchovávat a zpracovávat data, přesné zpracování, usnadnění práce terapeuta, různé formy posilování, možnost systematicky měnit obtížnost

○ nevýhody

- › spojené s volbou nevhodných programů anebo nevhodným použitím správných programů, problémy při zacházení s počítačem, generalizace výsledků do každodenního života


Počítačové programy

- stále častěji počítačové programy, a to jak v kombinaci s ostatními přístupy, tak i samostatně
- studie potvrzující pozitivní efekt strukturované počítačové rehabilitace nejen na kognitivní funkce, ale i na negativní symptomy, celkovou kvalitu života
- účinnost počítačové rehabilitace je srovnatelná s ostatními strategiemi
- novější práce také naznačují, že efekt počítačové rehabilitace přetrvává v čase, po ukončení tréninku

Nespecifická intervence

Podpůrné úkoly

- materiály určené původně pro KR demencí, vycházející z pedagogické práce, hlavolamy, křížovky, sudoku...



Kognitivní deficit u deprese

- základní příznak deprese
- kognitivní příznaky – narušená koncentrace pozornosti a nerozhodnost – diagnostická kritéria dle MKN-10 a DSM-5
- dříve - pokles kognitivní výkonnosti způsobuje pouze snížená motivace a vysoká unavitelnost pacientů
 - kognitivní deficit je způsoben patologickými procesy v mozku
 - ale subjektivní faktory, jako je právě snížená motivace, únava, insomnie, osobnostní struktura či aktuální emocionální prožívání, mají výrazný vliv na kognitivní výkon

Kognitivní deficit u deprese

- mírné postižení více kognitivních domén
- globálně difúzní postižení jdoucí napříč kognitivními doménami
- větší narušení tam, kde je potřeba úsilí, pozornost a využití kognitivní kapacity (pokyny řízené procesy), zatímco v automaticky prováděných úkonech, podmíněných příslušnými stimuly, fungují normálně

Kognitivní deficit u deprese

- porucha mnestických funkcí, pozornosti a také exekutivních funkcí
- deficit v sociální kognici (hodnocení pomocí poznávání a vnímání výrazů obličeje)
 - › atribučním zkreslením, v kontextu teorie myslí hodnocením dovedností jako schopnost detektovat faux pas, porozumění subtilním sociálním narážkám, schopnost ocenit humor
 - › narušeno již v časné fázi nemoci
- negativní afektivní zkreslení – přečeňování negativních informací, důraz na negativní stimuly vzhledem k pozitivním

Kognitivní deficit u deprese

- výskyt v akutní fázi deprese (až 50% nemocných), relativně rychlá tendence k úpravě, může přetrvávat i v remisi
 - pozornost a exekutivní funkce se upravují nejpomaleji
- redukce symptomů deprese není následována zlepšením kognice odpovídajícího stupně
- KD se horší s každou další epizodou a porucha v nesymptomatické fázi souvisí s řadou předchozích epizod
- má progresivní charakter

Kognitivní deficit u deprese

- › míra poškození ovlivňována řadou klinických faktorů - hloubka a subtypy deprese, vliv medikace, vliv hospitalizace a věk pacienta
 - › mezi hloubkou deprese a mírou kognitivního postižení se zdá být přímá úměra
 - těžká deprese bude mít na kognitivní fungování silnější dopad
 - › při léčbě depresivních pacientů ve vysokém věku je třeba počítat s možným komorbidním onemocněním, které může KF zhoršovat (Alzheimerova choroba, CMP atd.)
-
- některé aspekty mohou souviset se závažností symptomů deprese – PM, poruchy paměti
 - ostatní – pozornost, exekutivní funkce – méně souvisí s náladou a mohou být „trait-like“

Význam kognitivního deficitu u deprese

- důsledky pro běžné každodenní fungování
- u pacienta v remisi se očekává fungování na premorbidní úrovni, pro přetrvávající kognitivní deficit, může být výsledkem nenaplněného očekávání frustrace, snížené sebehodnocení, pocity zbytečnosti, bezcennosti a zvýšené riziko relapsu
- negativní vliv na - kvalitu života, návrat do práce a práce schopnost – porucha pozornosti, paměti, exekutivních funkcí a zpomalená psychomotorika

Význam kognitivního deficitu u deprese

- přetrvávající KD snižuje schopnost zvládat situaci, ovlivňuje komplianci a spolupráci
- v průběhu deprese KD ovlivňuje terapeutickou odpověď, riziko relapsu, fungování a kvalitu života
- KD u deprese – se stává klíčovým cílem v léčbě deprese
- časná diagnostika a následná úspěšná léčba může snížit riziko nedostatečného fungování a relapsu

Léčba kognitivního deficitu u deprese

- z farmakologických přístupů - nová antidepresiva se specifickým farmakologickým profilem (např. s afinitou k různým typům serotoninových receptorů)
- z nefarmakologických možností – psychoterapie - nejvíce KBT; neuropsychologická rehabilitace
- nadějně se jeví sofistikované modifikace stimulačních metod (např. repetitivní transkraniální magnetická stimulace)

Kognitivní deficit u deprese

- při vyšetřování kognitivního deficitu je třeba dodržovat následující zásady
 - › vyšetření by mělo být relativně krátké a nepříliš zatěžující
 - › testy by měly pokrýt alespoň hlavní domény – pozornost, paměť a exekutivní funkce
 - › i kvalitativní hodnocení testů a velice opatrná interpretace získaných výsledků
- cílené rehabilitační postupy léčby kognitivního deficitu u deprese zatím nemáme, takže se musíme spokojit s metodami používanými u jiných diagnóz

Spolupráce psycholog X psychiatr ?!

○ psychiatrist

- › zadává psychologické vyšetření – obecně – proč, z jakého důvodu, co chce zjistit

○ psycholog

- › dle zadání vyšetření volí metody, délku vyšetření, jeho rozložení v čase,.....
- › psychologická zpráva - kvantitativní zhodnocení a slovní shrnutí všech výsledků – aby lékař pochopil - +návrh, co dále – rehabilitace, ID, znovuopakování, atd...

Děkuji za pozornost.