

Svoboda (1972) provedl srovnání československých výzkumů používajících Harvardské a Stanfordské škály a konfrontoval je s původními výsledky autorů škál:

Škála	Experimentátor	Soubor	Počet PO	Hypnabilita (v %)		
				nízká	stř.	vysoká
HGSHS:A	Schauerová 1967	středošk. 16—19 r.	100	38	41	21
HGSHS:A	Svoboda 1968	středošk. 16—20 r.	249	38	40	22
HGSHS:A	Grulich 1969	alkoholici neurotici dálk. stud. $\bar{x} = 35$ r.	90	71	21	8
SHSS:A	Weitzenhoffer Hilgard	stanford. stud.	124	44	31	25

Hypnabilita zjišťovaná Stanfordskou škálou formy C:

Experimentátor	Soubor	N	Hypnabilita v %			
			N	S	V	VV
Weitzenhoffer Hilgard	stanford. studenti	203	46	30	18	6
Hájek aj. 1971	středošk. 16—18 r.	101	33	27	33	7

Vysvětlivky k tab.:

hypnabilita N — nízká (0—4 body)

S — střední (5—7)

V — vysoká:

pro HGSHS:A (8 a více)

SHSS:A (8—10)

VV — velmi vysoká (11—12)

Označení úrovně hypnability jako nízká, střední, vysoká, případně velmi vysoká je pouze arbitrárním grupováním, které je použito jen pro účely interpretační.

Výzkum distribuce hypnability v populaci má za cíl jednak zmapovat akční rádius možností použití hypnoterapie, jednak může pomoci při hledání případných osobnostních a jiných vlastností, které mohou s hypnózou a hypnabilitou souviset.