


KREV

Funkce krve:

- ✓ **transportní** - *přenos dýchacích plynů, živin odpadových látek*
- ✓ **homeostatická** - *udržení stálosti vnitřního prostředí (teploty, pH, koncentrace iontů, objemu; hemostáza)*
- ✓ **obranná** - *obrana proti infekci, odstranění vlastních nefunkčních buněk, nebo nádorových buněk*
- ✓ **přenos informací** - *transport hormonů od endokrinních k cílovým buňkám*



KREV

krevní plazma

- Anorganické látky
- Organické látky

formované krevní elementy

KREVNÍ PLAZMA

Anorganické látky

- Na⁺** ($137-147 \text{ mmol/l}$) - udržení osmotického tlaku, objemu, pH
- Cl⁻** ($98-106 \text{ mmol/l}$) - udržení osmotického tlaku, objemu, pH
- K⁺** ($3,8-5,1 \text{ mmol/l}$) - činnost svalů (hl. myokardu)
- Ca²⁺** ($0,75-1,25 \text{ mmol/l}$) - nervová dráždivost, stažlivost svalu, srážení krve, propustnost membrán, mineralizace kostí
- P** ($0,65-1,62 \text{ mmol/l}$) - regulace pH, mineralizace kostí
- Mg²⁺** ($0,75-1,25 \text{ mmol/l}$) - aktivita enzymů, nervová dráždivost
- HCO₃⁻** ($25-34 \text{ mmol/l}$) - transport CO₂, součást nárazníkové soustavy pro udržení pH
- Fe** ($16-25 \mu\text{mol/l}$) - součást hemoglobinu - transport plynů
- I** ($275-630 \text{ nmol/l}$) - tvorba hormonů štítné žlázy

KREVNÍ PLAZMA

Organické látky

Plazmatické proteiny 60-80 g/l

•**Albuminy 40-48 g/l** - onkotický tlak, transport iontů, mastných kyselin, pigmentů, látek tělu cizích, hormonů

•**Globuliny 18-30 g/l**

• α -globuliny - transport hormonů, kovů, vitamínů

• β -globuliny - vazba hemu, vit. B12, železa, transport cholesterolu

• γ -globuliny - protilátky, specifická imunita

•**Fibrinogen 3 g/l** - srážení krve

Tuky 4-10 g/l

Glukosa 4-5,5 mmol/l

Dusíkaté látky (mimo bílkoviny) 0,2-0,4 g/l - močovina, bilirubin, aminokyseliny

Hormony, vitamíny, enzymy, léky

FORMOVANÉ KREVNÍ ELEMENTY

Červené krvinky

erytrocyty

$5 \cdot 10^{12}/l$

Bílé krvinky


leukocyty

$4-10 \cdot 10^9/l$

Destičky

trombocyty

$150-400 \cdot 10^9/l$




ČERVENÉ KRVINKY

erytrocyty

Jediná bezjaderná buňka

Bikonkávní tvar



Funkce:

- Přenos O_2 a CO_2 mezi plícemi a tkáněmi
- Spolupodílejí se na udržení stálého pH krve

Vznik: krvetvorné tkáně - dřeň velkých kostí
(*erythropoetin; vitamín B₁₂, kyselina listová, Fe²⁺*)

Zánik: slezina

HEMOGLOBIN = $4 \times (\text{hem} + \text{bílkovina})$


$\alpha \ \beta \ \gamma \ \delta \ \varepsilon$

Embryo: ε_4 nebo $\alpha_2\varepsilon_2$

Plod: HbF $\alpha_2\gamma_2$

Dospělý: HbA $\alpha_2\beta_2$

HbA₂ $\alpha_2\delta_2$



Oxyhemoglobin: vazba O_2 na Fe^{2+} v hemu

Karbaminohemoglobin: vazba CO_2 na NH_2 konce bílkoviny

Karboxyhemoglobin: vazba CO na Fe^{2+} v hemu

Methemoglobin: hem s Fe^{3+} - nemůže vázat O_2

RBC (ERY)

počet červených krvinek

$4,5-6,3 \cdot 10^{12}/l$

↑ POLYCYTEMIE
↓ OLIGOCYTEMIE

HCT

hematokrit

$0,38-0,49 \text{ l/l}$

HGB

konzentrace hemoglobinu

$140-180 \text{ g/l}$

↑ POLYGLOBULIE
↓ ANÉMIE

MCV

střední objem Ery

$82-97 \text{ fl}$

↑ MAKROCYT
↓ MIKROCYT

MCH

průměrný obsah hemoglobinu v Ery

$27-33 \text{ pg}$

- NORMOCHROMNÍ
↓ HYPOCHROMNÍ

MCHC

průměrná koncentrace hemoglobinu v Ery

$320-360 \text{ g/l}$

- NORMOCHROMNÍ
↓ HYPOCHROMNÍ

SEDIMENTACE

- rychlosť sedáni krvinek v nesrážlivé krvi

↑ SEDIMENTACE

velké erytrocyty, malé množství

↑ pH

↑ tuky, cholesterol

↑ bílkoviny (fibrinogen, globuliny)

Muži 2-8 mm/hod

Ženy 7-12 mm/hod

ERYTROPOEZA

- tvorba červených krvinek

Ontogeneze

3. týden - žloutkový vak

6. týden - játra (tvorba v žloutkovém vaku zaniká)

12. týden - slezina

20. týden - kostní dřeň

32. týden - přesmyk z embryonálního hemoglobinu
na HbF

novorozeneček - krvetvorba pouze v kostech přesmyk
HbF na dospělý hemoglobin HbA

dospělý člověk - krvetvorba v hrudní kosti, obratlech,
žebrech, v klíční kosti, v pánevních kostech,
v plochých lebečních kostech, v proximálních
epifýzách některých dlouhých kostí

ERYTROPOEZA

- látky potřebné pro tvorbu

aminokyseliny - bílkovinná část hemoglobinu

železo - vazba kyslíku na hemoglobin a myoglobin

vitamín B₁₂ - důležitý pro syntézu DNA

kyselina listová - důležitý pro syntézu DNA

ERYTROPOEZA

- regulace

Erythropoetin - tvorba v ledvinách

- působí na erythropoetin-citlivé determinované progenitorové buňky v kostní dřeni
- stimuluje syntézu nukleových kyselin
- aktivuje geny potřebné k syntéze hemoglobinu
- zvyšuje příjem Fe

↓ **pO₂ ve tkáních**

výšková hypoxie
ztráta krve
otrava CO
stagnační hypoxie

ERYTROPOEZA

- regulace

androgeny - ↑ erytropoezu stimulací tvorby erytropoetinu

estrogeny - ↓ erytropoezu utlumením tvorby erytropoetinu

hormony štítné žlázy - ↑ erytropoezu

růstový hormon - ↑ erytropoezu




hormony kůry nadledvin - ↑ erytropoezu

prostaglandin E - ↑ produkci eryttropoetinu v ledvinách

stimulace hypotalamu

Zánik červených krvinek

Slezina - fagocytóza starých a poškozených erytrocytů



Fe - syntéza dalšího hemoglobinu

HEMOLÝZA

- rozpad červených krvinek

Osmotická hemolýza

hypotonické prostředí - krvinka přijímá vodu až dojde k poškození membrány, kudy uniká hemoglobin

hypertonické prostředí - voda opouští krvinky, může rovněž dojít k poškození membrány a úniku hemoglobinu

Fyzikální hemolýza - poškození při třepání šlehání, působení ultrazvuku, nízké či vysoké teploty, záření

Chemická hemolýza - látky rozpouštějící nebo reagující s lipidami v membráně krvinek (např. saponáty)

Toxická hemolýza - bakteriální, hadí nebo rostlinné jedy

Imunologická hemolýza - působení protilátek s komplementem

KREVNÍ SKUPINY

- Aglutinogen* - glykoprotein v membráně červených krvinek
Aglutinin - protilátka proti aglutinogenu
Aglutinace - shlukování červených krvinek








Systém ABO:

0 žádný aglutinogen *v membráně*
v plazmě protilátky anti-A a anti-B

A *v membráně* aglutinogen A
v plazmě protilátka anti-B

B *v membráně* aglutinogen B
v plazmě protilátka anti-A

AB *v membráně* aglutinogen A i B
v plazmě žádná protilátka



KREVNÍ SKUPINY

Rh – systém:

Rh+ - v membráně **přítomen**
aglutinogen D

Rh- - v membráně **není**
aglutinogen D

! Za normálních okolností
! nejsou přítomny v plazmě
protilátky proti aglutinogenu D !

Hemolytická
anémie
novorozenců

<https://www.youtube.com/watch?v=ksC7JxLOrv4>

↑ počet mladých Erc - erytroblastóza

Žloutenka - ↑ bilirubinu díky hemolýze

Jádrový ikterus

Mentální retardace

↑ objemu tekutin - otoky

Ztráta sluchu

Hydrops hlavy

Srdeční selhání

Otok jater, sleziny

SRÁŽENÍ


koagulační
faktory

cévy

destičky

HEMOSTÁZA

1. vazokonstrikce
2. bílý trombus
3. červený trombus



fibrinolytický
systém

DESTIČKY

- vznikají ve dřeni fragmentací ***MEGAKARYOCYTŮ***
- bezjaderné malé disky
- aktivovány „*von Wilebrandovým*“ faktorem, který je produkovaný endoteliálními buňkami
→ přilnutí destiček na obnažený kolagen
- produkce vazokonstričních látek (**serotonin**,
thromboxanA)
- thromboxan A zesiluje aktivaci destiček (**blokuje**
ASPIRIN)


ZÁSTAVA KRVÁCENÍ - HEMOSTÁZA

Bílkoviny: faktor I-III, V, VII-XIII

Ca^{2+} : F IV

VNITŘNÍ SYSTÉM
poranění cévy
F XII, FXI, F IX,
F VIII, F X, F IV

VNĚJŠÍ SYSTÉM
poranění tkáně
F VII, F III, F IV



SRÁŽENÍ KRVE - HEMOKOAGULACE

Sérum - plazma bez hemokoagulačních faktorů

Látky důležité pro koagulaci:

Vitamín K

Ca^{2+}

Důležité látky bránicí koagulaci:

Tělu vlastní – plazmin, heparin

Tělu cizí - látky blokující funkci vitamínu K (Warfarin)
- látky vyvazující Ca^{2+} (pouze ve zkumavce)