

## Obsah přednášky

# Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory

I

Pavel Rychlý Vojtěch Kovář

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita  
Botanická 68a, 602 00 Brno, Czech Republic  
[{pary, xkovar3}@fi.muni.cz](mailto:{pary, xkovar3}@fi.muni.cz)

část 4

## Čísla – znalosti ze SŠ

### ► Číselné množiny

- ▶ přirozená čísla  $N = \{0, 1, \dots\}$
- ▶ celá čísla  $Z = N \cup \{-1, -2, \dots\}$
- ▶ racionalní čísla  $Q = \{r/s \mid r, s \in Z \wedge s \neq 0\}$
- ▶ reálná čísla – „celá číselná osa“
- ▶ komplexní čísla – „pokrývají rovinu“

### ► Náš cíl

- ▶ všechny objekty v matematice jsou množiny
- ▶ → definice čísel s pomocí množin
- ▶ definice číselných operací

## Přirozená čísla

### ► Přirozená čísla

- ▶ formálně definována jako objekt splňující nějaké axiomy
- ▶ tzv. Peanova aritmetika

### ► Axiomy přirozených čísel

- ▶ existuje nula
- ▶ každé číslo  $x$  má následníka  $S(x)$
- ▶ nula není následníkem žádného čísla
- ▶ různá čísla mají různé následníky:  $a \neq b \Rightarrow S(a) \neq S(b)$
- ▶ všechna čísla jsou "potomky" nuly

## Axiomy přirozených čísel

### ► Ve formální logice

- ▶  $\exists x(x = 0)$
- ▶  $\forall x(\exists y(y = S(x)))$
- ▶  $\forall x(0 \neq S(x))$
- ▶  $\forall a, b(a \neq b \Rightarrow S(a) \neq S(b))$
- ▶  $\forall K(0 \in K \wedge \forall x(x \in K \Rightarrow S(x) \in K) \Rightarrow \forall y(y \in K))$

## Konstrukce přirozených čísel

### ► Definujeme množinový systém, který splňuje Peanovy axiomy

- ▶  $0 \equiv \emptyset$
- ▶  $S(x) \equiv x \cup \{x\}$

### ► Jak tedy čísla vypadají?

- ▶  $0 \equiv \emptyset$
- ▶  $1 = \{\emptyset\}$
- ▶  $2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- ▶  $3 = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$
- ▶ atd. – vždy  $n = \{0, \dots, n - 1\}$

## Číselné operace

### ► Definovány induktivně

### ► Sčítání

- ▶  $a + 0 = a$
- ▶  $a + S(b) = S(a + b)$

### ► Násobení

- ▶  $a * 0 = 0$
- ▶  $a * S(b) = (a * b) + a$

## Příklad – sčítání podle definice

### ► Definice sčítání

- ▶  $a + 0 = a$
- ▶  $a + S(b) = S(a + b)$

### ► $1 + 2$

- ▶  $1 = S(0), 2 = S(1) = S(S(0))$

### ► $1 + 2$

- ▶  $1 + S(1)$
- ▶  $S(1 + 1)$
- ▶  $S(1 + S(0))$
- ▶  $S(S(1 + 0))$
- ▶  $S(S(1))$
- ▶  $S(S(S(0))))$
- ▶  $= 3$

## Další číselné množiny

- ▶ Jsou konstruovány s využitím dvojic a ekvivalencí
  - ▶ pojmy, které „neznáme“
  - ▶ → v následujících přednáškách