

# Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I

Vojtěch Kovář

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita  
Botanická 68a, 602 00 Brno, Czech Republic  
xkovar3@fi.muni.cz

část 2



# Obsah přednášky

- 1 Matematická logika
- 2 Výroková logika
- 3 Něco z predikátové logiky
- 4 Matematická indukce

# Matematická logika – motivace

## ■ Jazyk matematiky

- přirozený jazyk je víceznačný
- „k jednání X na úřadě YZ potřebujete pas a řidičský průkaz nebo občanský průkaz“
- matematická fakta potřebujeme zapisovat přesně

## ■ Formalizace pojmu důkaz

- důkaz = posloupnost elementárních kroků
- to, co je „elementární“ je individuální
- logika zavádí přesnou definici elementárního kroku

# Typy logik

- Výroková logika
  - výroky, logické funkce, pravidlo modus ponens
- Predikátová logika
  - predikáty, kvantifikátory
- Další typy logik
  - modální, temporální, fuzzy, intenzionální, ...
  - nebudeme se jimi zabývat
- Naším cílem je naučit se logiku prakticky používat
  - $\rightarrow$  číst a psát
  - nikoli zkoumat její temná zákoutí (viz předmět „Matematická logika“ na FI)

# Výroková logika

## ■ Výrok

- základní jednotka
- tvrzení, jemuž lze přiřadit pravdivostní hodnotu
- např. „ $a = 1$ “, „4 je prvočíslo“

## ■ Pravdivost

- přiřazení hodnoty 0 nebo 1 každému výroku
- zapisujeme  $v(A) = 1$  („výrok A platí“)
- $v(A) = 0$  („výrok A neplatí“)

## ■ Logické funkce

- konstrukce složitějších výroků z výroků jednodušších

# Logické funkce (1)

## ■ Základní logické funkce

- nechť  $A, B$  jsou výroky
- **negace**  $\neg A$
- $v(\neg A) = 0$ , je-li  $v(A) = 1$
- $v(\neg A) = 1$ , je-li  $v(A) = 0$
- **implikace**  $A \Rightarrow B$
- $v(A \Rightarrow B) = 0$ , je-li  $v(A) = 1$  a  $v(B) = 0$
- $v(A \Rightarrow B) = 1$  v ostatních případech
- kombinací těchto funkcí lze vyjádřit všechny ostatní logické funkce

# Logické funkce (2)

## ■ Odvozené logické funkce

- **konjunkce**  $A \wedge B$  (logické „a“)
- $v(A \wedge B) = 1$ , je-li  $v(A) = 1$  a  $v(B) = 1$
- $v(A \wedge B) = 0$  v ostatních případech
- **disjunkce**  $A \vee B$  (logické „nebo“)
- $v(A \vee B) = 0$ , je-li  $v(A) = 0$  a  $v(B) = 0$
- $v(A \vee B) = 1$  v ostatních případech
- **ekvivalence**  $A \Leftrightarrow B$
- $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$

# Odvozování

## ■ Schémata axiomů

- pro libovolné výroky  $A$ ,  $B$ ,  $C$  platí
- $A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$
- $(A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C))$
- $(\neg B \Rightarrow \neg A) \Rightarrow (A \Rightarrow B)$
- dosazením konkrétních výroků vzniknou **axiomy**

## ■ Odvozovací pravidlo modus ponens

- pokud platí  $A$  a platí  $A \Rightarrow B$ , pak platí  $B$

## ■ Formální definice důkazu

- posloupnost výroků, z nichž každý je buď axiom nebo výsledek aplikace odvozovacího pravidla na předchozí výroky



# Příklad důkazu: $X \Rightarrow X$

## ■ Schémata axiomů

- $A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$
- $(A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C))$
- $(\neg B \Rightarrow \neg A) \Rightarrow (A \Rightarrow B)$

## ■ Dokazujeme, že pro libovolný výrok $X$ platí $X \Rightarrow X$

- 1  $(X \Rightarrow ((X \Rightarrow X) \Rightarrow X)) \Rightarrow ((X \Rightarrow (X \Rightarrow X)) \Rightarrow (X \Rightarrow X))$  / axiom 2
- 2  $X \Rightarrow ((X \Rightarrow X) \Rightarrow X)$  / axiom 1
- 3  $(X \Rightarrow (X \Rightarrow X)) \Rightarrow (X \Rightarrow X)$  / aplikace modus ponens na 2. a 1.
- 4  $X \Rightarrow (X \Rightarrow X)$  / axiom 1
- 5  $X \Rightarrow X$  / aplikace modus ponens na 4. a 3.

# Něco z predikátové logiky

## ■ Ohodnocení proměnných

- formule („výroky“) mohou obsahovat proměnné ( $x = 1$ )
- pravdivost pak závisí na ohodnocení, tj. přiřazení hodnot proměnným

## ■ Kvantifikátory

- $\exists$  – existuje alespoň jedno ohodnocení, při kterém formule platí
- $\forall$  – výrok platí pro všechna možná ohodnocení
- např.:  $\exists x(x = 0 \wedge x = 1)$

## Něco z predikátové logiky (2)

### ■ Funkční symboly

- kombinují objekty, se kterými zacházíme (množiny, čísla)
- výsledkem je další objekt
- např. plus, množinové sjednocení
- např.  $+(x, y)$ , resp.  $x + y$

### ■ Predikáty

- vyjadřují fakta o konstantách a proměnných
- výstupem je pravdivostní hodnota
- např.  $\text{Prime}(x)$  – „ $x$  je prvočíslo“
- např.  $\in(x, Y)$ , resp.  $x \in Y$  – „prvek  $x$  patří do množiny  $Y$ “

## Něco z predikátové logiky (3)

### ■ Příklady složitějších formulí

- $\exists x(\exists k(x = 2k + 1) \wedge \exists m(x = 2m))$
- $\forall x(\text{Prime}(x) \Rightarrow \exists k(x = 2k))$
- $\exists x(\text{Prime}(x) \wedge \exists k(x = 2k))$
- dokážete je přečíst?

# Matematická indukce

- Obecný matematický princip
  - použitelný pro definice, důkazy
  - napřed vyrobíme/dokážeme něco jednoduchého
  - → **báze indukce**
  - pak vyrobíme z obecného jednoduchého objektu o krok složitější objekt
  - případně dokážeme, že z platnosti pro jednoduchý objekt vyplývá platnost pro složitější objekt
  - → **indukční krok**
  - tím dostaneme nekonečnou řadu definic/důkazů

# Induktivní definice

- **Báze indukce**
  - definujeme nejjednodušší prvky
- **Indukční krok**
  - popíšeme, jak se z jednodušších prvků vyrobí složitější
- **Příklad: induktivně definované posloupnosti**
  - definujeme nekonečnou posloupnost 3, 5, 7, 9, ...
  - báze indukce:  $a_1 = 3$
  - indukční krok:  $a_{n+1} = a_n + 2$

## Induktivní definice (2)

### ■ Bází může být víc

- Fibonacciho posloupnost: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...
- báze indukce:  $a_1 = 0$
- báze indukce:  $a_2 = 1$
- indukční krok:  $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

### ■ Indukčních kroků může být víc

- definice toho, jak vypadá správná výroková formule
- báze indukce: libovolný jednoduchý výrok  $A$  je výroková formule
- indukční krok: pokud  $A$  je výroková formule, pak  $\neg(A)$  je výroková formule
- indukční krok: pokud  $A$  a  $B$  jsou výrokové formule, pak  $(A \Rightarrow B)$  je výroková formule

# Důkaz matematickou indukcí

## ■ Princip

- potřebujeme dokázat, že pro všechny prvky nějaké posloupnosti  $x_0, \dots, x_n, \dots$  platí nějaký výrok  $A$
- $\forall n(A(x_n))$
- dokážeme výrok pro  $x_0$
- $\rightarrow$  **báze indukce**
- dokážeme, že pokud výrok platí pro  $x_{i-1}$ , pak platí i pro  $x_i$  pro libovolné  $i$
- $A(x_{i-1}) \Rightarrow A(x_i)$
- $\rightarrow$  **indukční krok**
- levá strana implikace výše se nazývá **indukční předpoklad**



# Příklad indukce

- Dokážeme, že pro všechna přirozená  $n \geq 1$  platí:
  - $1 + 2 + \dots + n = n/2 * (1 + n)$
- Báze
  - $1 = 1/2 * (1 + 1)$
- Indukční krok
  - předpokládáme:  $1 + 2 + \dots + k = k/2 * (1 + k)$
  - dokážeme:  
 $1 + 2 + \dots + k + (k + 1) = (k + 1)/2 * (1 + (k + 1))$

## Příklad indukce (2)

### ■ Indukční krok

- předpokládáme:  $1 + 2 + \dots + k = k/2 * (1 + k)$

- dokážeme:

$$1 + 2 + \dots + k + (k + 1) = (k + 1)/2 * (1 + (k + 1))$$

- $1 + 2 + \dots + k + (k + 1)$

- $k/2 * (1 + k) + (k + 1)$

- $(k + k^2)/2 + (k + 1)$

- $(k + k^2 + 2k + 2)/2$

- $(k^2 + 3k + 2)/2$

- $(k + 2) * (k + 1)/2$

- $(k + 1)/2 * (k + 2)$

- $(k + 1)/2 * (1 + (k + 1))$

# Proč to funguje?

## ■ Intuitivní ověření korektnosti

- báze  $\rightarrow$  platí  $A(x_0)$
- indukční krok  $\rightarrow$  platí  $(A(x_0) \Rightarrow A(x_1))$
- modus ponens  $\rightarrow$  platí i  $A(x_1)$
- indukční krok  $\rightarrow$  platí  $(A(x_1) \Rightarrow A(x_2))$
- modus ponens  $\rightarrow$  platí i  $A(x_2)$
- atd. ad infinitum

## ■ Formální důkaz korektnosti matematické indukce

- existuje, ale nad rámec předmětu

# Složitější typy indukce (1)

- Složitější indukční předpoklad
  - např. platí  $A(x_{i-1})$  i  $A(x_{i-2})$
  - musíme dokázat odpovídající bázi
  - tj.  $A(x_0)$  i  $A(x_1)$

# Složitější typy indukce (2)

## ■ Strukturální indukce

- aplikujeme na induktivně definované objekty (např. výrokové formule)
  - báze indukce: věta platí pro jednoduché výroky
  - indukční krok 1: věta platí pro formuli  $A$   
 $\Rightarrow$  platí i pro  $\neg(A)$
  - indukční krok 2: věta platí pro formule  $A$  a  $B$   
 $\Rightarrow$  platí i pro  $(A \Rightarrow B)$
- Princip zůstává stejný, pouze vedení důkazu je komplikovanější
- Důkaz, že každá formule podle definice výše má sudý počet závorek?

# Všichni koně mají stejnou barvu

- **Věta:** V každém stádě mají všichni koně stejnou barvu.
- **Důkaz:** indukcí vzhledem k velikosti stáda
  - **báze:** Ve stádě o 1 koni mají všichni stejnou barvu.
  - **indukční krok:** Předp., že věta platí pro dvě stáda o  $n$  koních; dokážeme, že platí pro stádo o velikosti  $n + 1$
  - $S_1 = \{K_1, \dots, K_n\}$ ,  $S_2 = \{K_2, \dots, K_{n+1}\}$
  - podle předpokladu mají v  $S_1$  i v  $S_2$  všichni koně stejnou barvu
  - koně  $K_2, \dots, K_{n+1}$  jsou v obou stádech  $\Rightarrow$  i barva obou stád je stejná
  - tedy i ve stádě  $S = \{K_1, \dots, K_{n+1}\}$  mají všichni koně stejnou barvu
- Kde je problém? (zřejmě existují různí koně :))