

# **GENETICKÁ A FENOTYPOVÁ PROMĚNLIVOST**

**Evoluce jako dvoustupňový proces:**

- 1. proměnlivost mezi jedinci v populaci**
- 2. změny v zastoupení jednotlivých variant z generace na generaci**

**Vztah rychlosti evoluce a genetické proměnlivosti →  
základní teorém přírodního výběru (Fisher, 1930):**

**Míra zvýšení reprodukční zdatnosti libovolného organismu v libovolném čase  
je rovna jeho genetické proměnlivosti v tomto čase**

**Francis Galton, biometrikové**



**kontinuální proměnlivost**

**Gregor Mendel, mendelisté**



**diskrétní proměnlivost**


## Zdroje fenotypové proměnlivosti:

- rozdíly v genotypu
- rozdíly v podmírkách prostředí
- maternální vlivy (paternální vlivy)


## POPULACE

- společný genofond (gene pool)
- společný areál
- lokální populace (subpopulace, démy, mendelovské populace)
- globální populace, metapopulace

populace experimentální, zemědělské, modelové



## Genotypové a alelové (genové) frekvence



genotypové:  $P, Q, R$

alelové:  $p, q$

$$P + Q + R = 1$$

$$p + q = 1$$

Genotyp	$A_1A_1$	$A_1A_2$	$A_2A_2$	Celkem
Počet	$n_1$	$n_2$	$n_3$	$N$
Frekvence	$P=n_1/N$	$Q=n_2/N$	$R=n_3/N$	
	$p = (2n_1 + n_2)/2N$		$q = (n_2 + 2n_3)/2N$	


- E. B. Ford, 1939-1970: přástevník hluchavkový (*Panaxia dominula*)

genotyp	$A_1A_1$	$A_1A_2$	$A_2A_2$	$\Sigma$
počet	17062	1295	28	18385
genotypová frekvence	0,928	0,070	0,002	1
alelová frekvence	$A_1 = 0,963$		$A_2 = 0,037$	1



## GENETICKÁ PROMĚNLIVOST V PŘÍRODNÍCH POPULACÍCH

Metody studia genetické proměnlivosti:

- elektroforéza proteinů
- analýza restrikčních fragmentů  
(Southern blotting, RFLP, DNA fingerprinting)
- PCR, sekvencování, mikrosateliity ...



**Polymorfismus a polytypie**



## Hardyho-Weinbergův zákon

Vlastnosti modelové („panmiktické“) populace:

- diploidní organismy
- pohlavní rozmnožování
- diskrétní generace
- dvě alely, segregující 1:1
- četnosti alel stejné u samců i samic
- náhodné oplození
- velmi velká velikost
- absence migrace
- absence mutací
- absence přírodního výběru

$$\text{vztah četností: } p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

1908: G. H. Hardy (1877-1947)  
Wilhelm Weinberg (1862-1937)

Samičí gamety Alela Četnost	Samčí gamety	
	A <sub>i</sub> p	A <sub>i</sub> q
A <sub>i</sub> p	 $AA$ $p^2$	 $Aa$ $2pq$
		 $aa$ $q^2$
A <sub>i</sub> q	 $Aa$ $qp$	 $AA$ $q^2$

Četnosti v zygotách:  
 $AA : P' = p^2$   
 $Aa : Q' = pq + qp = 2pq$   
 $aa : R' = q^2$

## Hardyho-Weinbergův zákon


1. Četnosti alel z generace na generaci stálé

= Hardyho-Weinbergova rovnováha

2. HW rovnováhy dosaženo již po 1 generaci náhodného křížení

- geny vázané na pohlaví: u samců genotypové = fenotypové četnosti
- pro 3 geny:  $(p + q)^2 \rightarrow p^2 + q^2 + r^2 + 2pq + 2pr + 2qr$



Četnosti heterozygotů a homozygotů pro vzácnou alelu



- heterozygoti nejfrekventovanější při  $p=q=0,5$
- $Q$  se snižuje rychlostí  $2pq$
- $R$  rychlostí  $q^2$   
 $\Rightarrow$  zvyšování  $Q/R \rightarrow$  vzácná alela většinou v heterozygotním stavu

## GENETICKÁ PROMĚNLIVOST V PŘÍRODNÍCH POPULACÍCH

Otázka rozsahu proměnlivosti v přírodních populacích:



H. Muller: „klasický“ model  
proměnlivost omezená

T. Dobzhansky: „rovnovážný“ model  
proměnlivost normou

Alozymový polymorfismus a heterozygotnost:

- průměrný počet alel na lokus,  $A$
- podíl polymorfních lokusů,  $P$
- průměrná skutečná heterozygotnost,  $H_o$
- průměrná očekávaná heterozygotnost = genová diverzita,  $H_e$


Sekvence DNA:

- nukleotidový polymorfismus,  $\theta$
- nukleotidová diverzita,  $\pi$

# Genetická a fenotypová proměnlivost


## GENETICKÁ PROMĚNLIVOST V PŘÍRODNÍCH POPULACÍCH

Taxon	Počet zkoumaných druhů	Podíl lokusů polymorfních	Průměrná heterozygotnost
<b>Bezobratlí</b>			
mořští plži	5	0.175	0.083
suchozemští plži	5	0.437	0.150
ostatní mořští bezobratlí	9	0.587	0.147
haplodiploidní blanokřídí	6	0.243	0.062
<i>Drosophila</i>	43	0.431	0.140
ostatní hmyz	23	0.329	0.074
bezobratlí celkem	93	0.397	0.112
<b>Obratlovci</b>			
ryby	51	0.152	0.051
obojživelníci	13	0.269	0.079
plazi	17	0.219	0.047
ptáci	7	0.150	0.047
hlodavci	26	0.202	0.054
savci	46	0.147	0.036
obratlovci celkem	135	0.173	0.049
<b>Rostliny celkem</b>	473	0.505	--



## Proměnlivost na více lokusech - vazbová nerovnováha

- koeficient vazbové nerovnováhy,  $D$
- vztah vazbové nerovnováhy a rekombinace:



### Příčiny vazbové nerovnováhy:

1. nenáhodnost oplození
2. přírodní výběr
3. dva druhy s různými četnostmi
4. recentní mutace
5. recentní splynutí 2 populací
6. absence rekombinace
7. náhodný genetický posun