

Experimentální modely ekotoxicity pro bezobratlé živočichy

Využití standardních testů


- Hodnocení vlastností nebezpečných pro životní prostředí
 - u chemických látek a přípravků
 - u přípravků na ochranu rostlin (pesticidy)
 - u biocidních přípravků a účinných látek
- Stanovení ekotoxicity odpadů
- Hodnocení léčiv určených do vodního prostředí (pro ryby) za účelem jejich registrace
- Biologické testování přítokových a odpadních vod
- Biologická zkouška toxicity při haváriích
- Testování látek s potenciálním dopadem na vodní ekosystémy

Bezobratlí živočichové

- Přítomnost a aktivita bezobratlích je naprosto rozhodující pro stav ekosystému.
- Bezobratlé najdeme ve všech ekosystémech.
- Vodní bezobratlí tvoří významnou část celkové biomasy, mají nepoměrně vyšší druhovou bohatost oproti obratlovcům.
- Hrají významnou roli v potravním řetězci jako destruenti, ale i konzumenti prvního a druhého rádu, s čímž je spojená možná bioakumulace.
- Díky změnám habitatu při metamorfóze mohou zasahovat do více ekosystémů i během jednoho životního cyklu, díky čemuž mohou přijímat široké spektrum polutantů a přenášet je mezi jednotlivými ekosystémy.

Testy ekotoxicity v půdě

hlístice



roupice



žížaly



chvostoskoci



TERESTRICKÉ PROSTŘEDÍ


Půdní testy s bezobratlými

Uspořádání : umělý substrát, vlhčená petriho miska, standardní nebo přírodní půda – různé nádoby...
- zpravidla 14 dní (letalita),
56 dní – reprodukce ...

Organismy

Červi (kroužkovci – žížaly, háďátka, roupice)

Chvostoskoci (Collembola)



TERESTRICKÉ PROSTŘEDÍ – konzumenti - bezobratlí


Zejména pro testování biocidů

VČELY


- testování insekticidů
- dávkování v potravě



Moucha domácí



Drosophila
(hodnocení genotoxicity)



Testy toxicity na vodních bezobratlích

Normy testů na bezobratlích:

ČSN EN ISO, OECD, ASTM, US EPA, TNV, EEC, AFNOR

Testy na korýších (Crustacea) - planktonní - nejčastější

*Daphnia magna, D. pulex, Ceriodaphnia dubia, Artemia salina (mořská),
Thamnocephalus platyurus*

Testy na vířnících (Rotifera) - *Brachionus calyciflorus*

Testy na kroužkovcích (Annelida) - *Tubifex tubifex*

Testy na hmyzu (Insecta) - *Chironomus tentans*

Testy na měkkýších (Mollusca)

Potamopyrgus antipodarum

Testy na bentických korýších (Crustacea)

Gammarus, Hyallela azteca



Daphnia magna



Artemia salina



Ceriodaphnia dubia



Gammarus



Chironomus riparius




Hrotnatka velká (*Daphnia magna*)

Řád: Cladocera (perloočky):

Daphnia pulex (hrotnatka obecná), D. magna (h. velká)

- **zástupce zooplanktonu**
- **akutní i chronické testy**
- **běžně používaný modelový organismus**
 - (OECD 1984)
 - citlivost k toxikantům
 - rychlá reprodukce
 - determinované toxikologické parametry
 - rychlý životní cyklus
 - snadná kultivace
 - biochemické markery




Normy testů s *Daphnia magna*

- ČSN ISO 6341 (75 7751) Jakost vod – Zkouška inhibice pohyblivosti *Daphnia magna* Straus (Cladocera, Crustacea) – Zkouška akutní toxicity
- ČSN ISO 10706 (75 7752) Jakost vod – Stanovení chronické toxicity látek pro *daphnia magna* Straus (Cladocera, Crustacea)
- ISO 6341/1996 Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of *Daphnia magna* Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test
- ISO 1070/2000 Water quality - Determination of long term toxicity of substances to *Daphnia magna* Straus (Cladocera, Crustacea)
- OECD 202 *Daphnia* sp. Acute Immobilisation Test (Updated Guideline, adopted 4th April 1984)
- OECD 211 *Daphnia magna* Reproduction Test (Original Guideline, adopted 21st September 1998)

Permanentní laboratorní chov

Daphnia magna



- kultivační místo
- stálá teplota $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- stálá fotoperioda
16h světla / 8h tmy
- stálé pH
- kultivační médium M4
- pravidelné krmení
směsí řas



Akutní test na *Daphnia magna*


Podmínky akutního testu:

- 20 ± 2 °C, expozice 24/48 h, bez aerace, bez osvětlení (max 12h 1000Lux), bez krmení
- nádobka 1-5ml/ks (30 jamková destička (10 ml))
- 20 ks/ 1koncentrace - (4x5ml/5ks), 5 organismů na jamku
- standardní médium (CaCO₃, MgSO₄, NaHCO₃, KCl)
- organismy mladší 24h
- během testu měříme pH, teplotu, O₂
- sledovaný parametr: imobilizace po 24, 48 hodinách - počítáme mobilní jedince
 - kriterium imobilizace: jedince, kteří nejsou schopni se rozplavat ani po 15s mírném zamíchání považujeme za imobilizované, i kdyby ještě pohybovaly tykadly



ALTERNATIVNÍ MIKROBIOTESTY ("toxkity") s bezobratlími

www.microbiotests.be



ROTOXKIT F *chronic*


Contains all the materials to perform three 48h reproduction assays



*Test organisms are included in the kits as "dormant eggs (cysts)" which can be hatched "on demand"


THAMNOTOXKIT F™ MICROBIOTESTS

With the crustacean *Thamnocephalus platyurus*



PROTOXKIT F™ MICROBIOTESTS

With the ciliate protozoan *Tetrahymena thermophila*



MIKROBIOTESTY

<http://www.microbiotests.be/>

- Výhody: miniaturizace, zkrácení doby inkubace a tím i zjednodušení
- Možnost dlouhodobého uchovávání testovacích organizmů ve formě kryptobiotických klidových stádií, v lyofilizovaném nebo imobilizovaném stavu.
- Organizmy se před použitím v testech uvedou do aktivního stavu.
- Synchronně vylíhlí jedinci jsou uniformní a pocházejí z geneticky přesně definovaných zásobních kultur.
- V současnosti jsou mikrobiotesty komerčně dostupné v podobě tzv. toxkitů

MIKROBIOTESTY

DAPHTOXKIT FTM magna, DAPHTOXKIT FTM pulex: 24-48h test akutní toxicity pro korýše *Daphnia magna* a *Daphnia pulex* (odpovídá OECD a ISO normám)

CERIODAPHTOXKIT FTM: 24 h test akutní toxicity pro korýše *Ceriodaphnia dubia* (odpovídá USEPA normě)

THAMNOTOXKIT FTM: 24 h test akutní toxicity pro korýše *Thamnocephalus platyurus* (Test s Thamnocephalem u nás normován TNO)

OSTRACODTOXKIT FTM: 6 denní chronický test toxicity (mortalita/inhibice růstu) s korýšem *Heterocypris incongruens*. První kontaktní mikrobiotest pro kontaminované sedimenty nebo půdy

ROTOXKIT FTM: 24 h test akutní toxicity pro vířníka *Brachionus calyciflorus* (odpovídá standardní normě ASTM E1440-91).

ROTOXKIT FTMshort –chronic: 48h krátký-chronický (reprodukční) test s vířníkem *Brachionus calyciflorus* (odpovídá francouzské normě AFNOR)

PROTOXKIT FTM: 24h chronický (inhibice růstu) test toxicity pro prvoka *Tetrahymena thermophila*. Metodika pro odpovídající test je vyvíjena v OECD.

RAPIDTOXKIT (tm): Hodinový test toxicity s larvami korýše *Thamnocephalus platyurus* pro rychlou detekci kontaminace vody.

Mikrobiotesty

Thamnotoxkit



- Testovací organismus *Thamnocephalus platyurus*
- Uchovávání: klidová stádia
- Doba líhnutí: 20 hod., 4000 lx, 20°C
- Inkubace: 24 hod., 4000 lx, 20°C
- Vyhodnocení: mortalita, 24 LC₅₀

Výhody: 20 h líhnutí, větší, citlivý organismus, expozice 24-48 h, srovnatelné výsledky s dafnií (+ citlivější) i zakalené/zabarvené vzorky, je v TNV



Obdobně CERIODAPHTOX

Ceriodaphnia dubia



ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MZe ČR

MIKROMETODA STANOVENÍ AKUTNÍ TOXICITY NA KORÝŠI *THAMNOCEPHALUS PLATYURUS*

TNV 75 7754

Obsah	Strana
1. Předmluva.....	1
2. Předmět normy.....	2
3. Termíny, definice a zkratky.....	2
4. Podstata zkoušky.....	3
5. Materiály a chemikálie.....	3
6. Přístroje a pomůcky.....	4
7. Příprava vzorků zkoušené vody.....	4
8. Postup zkoušky.....	5
9. Vyjadřování výsledků.....	7
10. Protokol o zkoušce.....	7
11. Příloha A (informativní) - Korýš <i>Thamnocephalus platyurus</i>	8
12. Přílohy B (informativní) - Limitní hodnoty pro <i>Thamnocephalus platyurus</i>	9
13. Příloha C (informativní) - Literatura.....	10

Rotoxkit F

- Testovací organismus:
Brachionus calycifloris (vodní vířník)
- Uchování: klidová stádia, cysty
- Doba líhnutí: 18 hod., 20°C, 4000lx
- Design: 6 opakování, 6 koncentrací v jedné destičce, jamka á 0,3 ml
- Inkubace: 24 hod., 20°C, 4000lx
- Vyhodnocení: mortalita, 24 LC₅₀




Výhody: Domácí běžný druh, přídavná informace

Nevýhody: Malý, většinou méně citlivý


Závěr: zajímavý doplněk testů toxicity, není nutný, je-li v baterii korýš

Obdobně Protoxkit s prvkem *Tetrahymena thermophila*


Líhnutí cyst vířníků



Plnění testovací destičky



Přenos vířníků do testovacích jamek



Daphtoxkit pulex

Výhody

- Jako ISO, OECD
- Z klidových stádií


Nevýhody

- 3 dny líhnutí
- Nevyrovnané líhnutí
- Problémy se skladováním
- Povrchové tenze - neplavou

Závěr: zatím není zcela vyladěný

RAPIDTOXKIT

- Test s nejrychlejší odpověďí
- „jídelní test“ – sledováno ovlivnění příjmu potravy stresem (toxickou látkou)
- Testovací organismus: *Thamnocephalus platyurus*
- Uchování: klidová stádia, cysty
- Doba líhnutí: 30-45 hod., 25°C, 4000lx
- Inkubace: 15-60min, 25°C, 4000lx
- Pak přidány červeně obarvené mikrospory (potrava), inkubace 15-30 min
- Vyhodnocení: pod mikroskopem zhodnocen příjem potravy v jednotlivých expozičních variantách – hodnocena inhibice příjmu mikrospor v porovnání s kontrolou



Testy toxicity na korýších/vířnících

VALIDITA:

Výsledky testu jsou považovány za platné, když

- Koncentrace rozp. kyslíku neklesla pod 60% nasycení
- Koncentrace testované látky neklesla pod 80%
- Mortalita kontrolního vzorku nepřesáhla 10%
- Zjištěná koncentrace $LC_{\underline{50}}$ je v souladu se standardy

PŮDA + SEDIMENTY

Mikrobiotest - **OSTRACODTOXKIT FTM:**

6 denní chronický test toxicity (mortalita/inhibice růstu)
s korýšem *Heterocypris incongruens*.

Kontaktní test v mikrodeskách 3x2 jamky (objem 1 ml).

10 jedinců na jamku,

Uchování: klidová stádia, cysty

Doba líhnutí: 52 hod., 25°C, 4000lx

Inkubace: 6 dní, 25°C, 4000lx

Vyhodnocení: mortalita, 24 LC50, růst

OSTRACODTOXKIT FTM
MICROBIOTESTS
FOR SEDIMENT TOXICITY TESTING

With the
benthic crustacean
Heterocypris
incongruens



Testy toxicity s bezobratlými

Ekonomické hodnocení

(orientační ceny bez cla a dopravy)

- Rotoxkit, Thamnoto 1000Kč
- Daphtoxkit 1300Kč
- Algaltoxkit 4300Kč
- ECHA Biocide monitor 200Kč
- MetPad 500Kč
- Toxicromotest (SedimentChromoPad),
Toxicromotest 1000Kč

Chronické testy s vodními bezobratlými živočichy

Akvatické testy

- Reprodukční test s hrotnatkou *Daphnia* spp. (ISO 1070/2000)
- Test přežívání a reprodukce s břichatkou *Ceriodaphnia dubia* (USEPA, 1989)

Sedimentové testy

10-denní test přežívání a růstu s různonožcem *Hyalella azteca* (USEPA, 2000)

42-denní test přežívání, růstu a reprodukce s různonožcem *Hyalella azteca* (USEPA, 2000)

10-denní test přežívání a růstu s pakomárem *Chironomus tentans* (USEPA, 2000)

Celoživotní (Life-cycle) test pro hodnocení účiků kontaminace sedimentů s pakomárem *Chironomus tentans* (USEPA, 2000)

Test bioakumulace s máloštětinatcem *Lumbriculus variegatus*

ASTM E 1706 (2005) Standard Test Method for Measuring the Toxicity of Sediment-Associated Contaminants with Freshwater Invertebrates

- korýš *Hyalella azteca* (*H. azteca*)
- pakomár *Chironomus tentans*
- 10 denní test, 300-mL kádinky, 100 mL sedimentu, 175 mL vody organismy krmeny
- Parametry: přežívání, růst

Další testy sedimentů:

Chironomus riparius, *Daphnia magna* and *Ceriodaphnia dubia*, *Hexagenia* spp.,

Chronický test s *Tubifex tubifex* (28 dní) – přežívání, růst, reprodukce

Chronický test s *H. azteca*

Diporeia spp.

Chironomus dilutus - přežívání, růst, vylétávání, reprodukce

Chronický test na *Daphnia magna*



ČSN ISO 10706 Jakost vod - Stanovení chronické toxicity látek pro *Daphnia magna Straus* (Cladocera, Crustacea)

- organismy mladší 24h
- 10 organismů na koncentraci
- individuálně v 50ml media M4/kádinku
- médium výměna 3x týdně
- expozice 21 dní
- teplota $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- pH 6-9 ($\pm 1,5$)
- fotoperioda 16 h světla / 8 h tmy
- krmení směs řas



Příprava média Elendt M4

Zásobní roztoky



Roztok I
(stopové prvky)

$\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ H_3BO_3
 $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ LiCl
 ZnCl_2 RbCl
 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ NaBr
 Na_2SeO_3 KI
 $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ NH_4VO_3



Thiamin
hydrochlorid,
Biotin,
Cyanocobalamin

Roztok II.
(makroživiny
vitamíny)

$\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, NaHCO_3 , NaNO_3
 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, KH_2PO_4 ,
 KCl , K_2HPO_4 , $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$

Sledované parametry

- Mortalita, přežívání
- Reprodukce
- Počet narozených juvenilů
- Den první reprodukce
- Chování - způsob pohybu



další efekty (zbarvení, tukové kapénky, velikost gonád)

Testy toxicity s bezobratlými

Závěr

- pro konkrétní případ, vzorek a problém může zkušený ekotoxikolog vybrat vhodnou kompozici detekčního systému
- akutní testy toxicity jsou jednou z několika součástí systému hodnocení
 - chemické analýzy
 - struktura zoocenoz a fytocenoz
 - biokumulace a biokoncentrace
 - QSAR
 - biomarkery
 - atd...