



Ekotoxikologické testy s obojživelníky

Klára Hilscherová a Blahoslav
Maršálek

RECETOX- Přírodovědecká fakulta MU Brno, Kamenice 3
Botanický ústav AVČR, Květná 8. 603 65 Brno

Obojživelníci unikátní pro (eko)toxikologické procesy:

- Jsou významnou součástí ekosystémů - reprezentují většinou **konzumenty druhého řádu** (většina druhů je insektivorných).
- Většina zástupců (zejm. ze skupiny bezocasích, *Anura*) prodělává unikátní **proces metamorfozy (embryo, larva, dospělec)**
- životní strategie **reprezentuje řadu rozličných expozičních cest** a míst pro působení polutantů
- **transdermální přenos** vody a polutantů: u obojživelníků 70-90% celkové kapacity.
- **u jiných obratlovců** jsou procesy výměny vody, iontů (a také plynů) realizovány hlavně přes **plíce/žábra, gastroinestinální trakt**




Dramatický úbytek populací obojživelníků (označovaný Global Amphibian Decline)

sledován od 60. let 20. století


výsledky dlouhodobého pozorování

- z více než 20 zemí světa

- množství možných příčin



DISTRIBUTION OF GLOBAL AMPHIBIAN DECLINES



#= Extinct, Missing or Critically Endangered

#= Additional Threatened (Endangered or Vulnerable)


Source: IUCN 2000, AmphibiaWeb, Hero J.-M. & L. Shoo, 2003. Chapter 7 in Amphibian Conservation, Smithsonian Press.
Background biodiversity hotspots map from Myers et. al., 2000. Nature 403:853-858 c/o Conservation International.
Prepared by J.-M. Hero, April 2002.

Předpokládané příčiny poklesu počtu obojživelníků v přírodě:

- vyšší citlivost k znečištění prostředí (transdermální přenos)
- změny klimatu a změny mikroprostředí (reprodukce)
- introdukce predátorů
- imise a kyselé srážky
- UV záření – výkyvy, klimatické změny
- infekce, onemocnění, paraziti
- poškození, úbytek habitatů
- kombinace vlivu nových polutantů a změn přirozeného prostředí
- působení pesticidů – aplikovány v době rozmnožování a vývoje obojživelníků
- kombinace více faktorů – např. negativní působení introdukovaných druhů je dále umocňováno působením cizorodých látek, infekčních onemocnění nebo zvýšenou mírou UV-B záření

Možný důvod: Kontaminanty

“Obojživelníci jsou zvláště citliví vůči xenobiotikům v prostředí díky své fyziologii a chování” (Bidwell and Gorrie, 1995)



Embryotoxicita x teratogenita

Embryotoxicita – vlastnost látek, která se projevuje nepříznivými účinky na zárodek (embryo)

Embryotoxicické látky působí smrt zárodků či narušení vývoje nebo růstu

Teratogenita – vlastnost látek, která způsobuje trvalé funkční nebo strukturní abnormality (malformace) během období embryonálního vývoje

Teratogeny působí neúčinněji ve stadiu organogeneze

Malformace u obojživelníků

- celosvětový problém, souvisí se snižováním populací obojživelníků (Worldwide Amphibian Decline)
- 44 států USA, Kanada – malformovaní jedinci nalézání přímo v prostředí (*Rana pipiens*, *Rana clamitans*, *Bufo americanus*, ...)
- hlavní příčiny – UV-B záření
 - invaze parazity (Trematoda – *Ribeiroia ondatrae*)
 - kontaminanty životního prostředí
 - pesticidy, herbicidy
 - těžké kovy





Kontaminace obojživelníků v prostředí: organické látky


- **O koncentracích a efektech polutantů na obojživelníky existuje velmi málo údajů.** Nedostupné jsou experimentální studie určující biokoncentraci (biokoncentrační faktory, BCFs) a/nebo bioakumulaci.
- **PAHs** vykazují řadu subletálních efektů (např. endokrinní disruptce a následná feminizace nebo genotoxicita)
- **PCDDs - dioxiny:** akutně letální ve velmi nízkých koncentracích (ppb, tj. mg/L)
- **Organochlorované pesticidy (OCPs)** více informací - experimenty s ropuchou (*Bufo bufo*) pro p,p'-DDT stanovily 48 hod hodnoty BCF ~ 640
- Toxicita klesala v pořadí toxafen > heptachlor > dieldrin > aldrin > DDT > lindan.
- **Organofosfátové a karbamátové pesticidy** - narušení nervového systému inhibicí aktivity cholinesterázy
- **Pyrethroidy** (insekticidy) opožděný vývoj a abnormální chování
- **Triaziny** (herbicidy) endokrinní disruptce - pokles hladiny testosteronu u samců a následnou demaskulinizaci a vznik hermafroditů

Kontaminace obojživelníků v prostředí: kovy

- **Cd** se biokoncentruje v játrech, ale také ve vajíčcích po ovulaci samic.
Imunosuprese.
- **Pb** BCFs ~ 1000 skokanů *Rana clamitans*
- **Zn** biokoncentrace - vajíčko < embryo < larva
- **Hg** může se projevovat neurotoxicita
- **Chronické efekty** však nejsou dostatečně prostudovány.



Ekotoxikologie obojživelníků: málo známá oblast



Testy toxicity a využití v ekotoxikologii

- sporé informace - omezené použití
- **ochrana obojživelníků**
- limitace na rody Rana (skokan), Bufo (ropucha), Xenopus (drápatka)



- **údaje o kontaminaci, bioakumulaci apod. máme pouze z uhynulých jedinců (? stáří..)**
- **Biochemické ukazatele z krve** (plánované odběry v přírodních populacích – **výjimečně**)

Testy s obojživelníky

Obojživelníci nacházejí uplatnění v testech **teratogenity, genotoxicity** a v testech pro odhalení **narušení endokrinního systému**

Typy studií: taxonomická diverzita, rozmnožovací aktivita, embryolarvální vývoj, biochemie orgánů. Etické překážky.

- **ISO, OECD, ASTM - FETAX** (Frog Embryo Teratogenesis Assay: *Xenopus*) *Xenopus laevis* - testování chemických láttek a přípravků, sedimentů apod.
Evropa - skokan

Modelové druhy

- Nejčastěji používaný modelový organizmus - drápatka vodní (*Xenopus laevis*) (**ASTM E1439-98**)
- Další používané druhy - skokani *Rana pipiens* (**ASTM E1439-98, 1998**) a *Rana temporaria*
- rosničky *Litoria adelaidaensis* a *Crinia insignifera*
- drápatka *Silurana tropicalis*
- ropuchy *Bufo americanus* (**ASTM E1439-98, 1998**) a *Bufo arenarum*
- ocasatí obojživelníci žebrovník *Pleurodeles waltl* (AFNOR T90-325, 1992), axolotl *Ambystoma mexicanum* (Federal Register, 1998), čolci *Notophthalmus viridescens*, *Triturus vulgaris*



Většina informací – FETAX- Frog Embryo Teratogenesis Assay -Xenopus

- dobře **standardizovaná metoda**
- **reprezentativnost pro další obojživelníky????**
- postup využívající **testování letální toxicity a neletálních efektů (morfologické malformace)** během embryolarválního vývoje
- US-EPA č. 1001.0 - Fathead minnow, Embryo-larval Survival and Teratogenicity) lze dobře modifikovat pro účely testování efektů s obojživelníky
- skokan hnědý (*Rana temporaria*).
- ropucha obecná (*Bufo bufo*)
- ekotoxikologické biotesty s obojživelníky by neměl být pouze (ale v 90% je) FETAX

Test FETAX

- **FETAX = Frog Embryo Teratogenesis Assay - Xenopus**
- **Hodnocení embryotoxicity s žábami - FETAX**
 - expozice vajíček během embryonálního vývoje
 - ve standardní podobě ukončen po 96 hod
 - varianty – kompletní životní cyklus
- Existuje řada embryolarválních testů:
 - FETAX – validace: Dawson, Bantle
 - standard ASTM (*American Society for Testing and Materials*), E 1439-98 (1999)



Frog Embryo Teratogenesis Assay: Xenopus (FETAX)

- Původně designován pro testování teratogenity chemických látek (farmak) na drápatce jako modelu pro obratlovce (pro lidi)
- Dobrá korelace mezi známými lidskými teratogeny a výsledky z FETAXu
- Používán pro testy jednotlivých látek, směsí, i odpadních vod




Modelový organismus - drápatka vodní (*Xenopus laevis*)

Studium vývojové, buněčné, molekulární biologie, využití v embryologii, fyziologii, toxikologii

- dobrá znalost normálního vývoje, biologie a biochemie
- po celý život možnost odchovu v laboratoři
- schopné přijímat usmracenou potravu
- akvatický způsob života larev i dospělců
- dospělci resistentní vůči chorobám
- možnost indukovaného získání embryí nezávisle na ročním období
- průhlednost larev - sledování malformací vnitřních orgánů






Princip testu

- 96 hodinový standardizovaný test toxicity pro embrya žab
- oplozená vajíčka jsou exponována různým koncentracím testované látky během vývoje embrya (96 hod)
- po expozici standardně hodnocení embryotoxicity a teratogenity zkoumané látky:
 - letalita po 96h (LC_{50})
 - % morfologických změn - malformací po 96 hod (EC_{50})
 - inhibice růstu (MCIG) – minimální koncentrace způsobující inhibici růstu



- vyhodnocení:
- Index teratogenity
 $TI = LC_{50} / EC_{50}$

$TI > 1,5$ indikace teratogenního potenciálu




Pracovní postup I

- výběr vhodného páru žab
- injektování lidského gonadotropinu (HCG) do hřebetního lymfatického vaku
- amplexus -> tvorba vajíček a oplození
- výběr oplozených vajíček



Pracovní postup II




- do Petriho misek po 20 oplozených vajíčkách (10 mL)
- expozice různým koncentracím testovaných látek v standardním FETAX médiu
- pozitivní kontrola: **6-aminonicotinamid**
all-trans retinová kyselina (ATRA)
- teplota: **24±2 °C**, uložení do inkubátoru
- výměna expozičních roztoků a uhynulých embryí každých 24 hodin
- po 96 hodinách ukončení - fixace v 3% formaldehydu
- sledování délky přežívajících jedinců a výskyt malformací



Hormonální stimulace dospělého páru

DESIGN TESTU

→ amplexus → oplozená vajíčka – nasazení do Petriho misek



24 h



96 h



72 h





48 h



fixace v 3 % formaldehydu → hodnocení malformací, měření délky embryí



zamražení na -80°C → tkáňový homogenát pulců použit pro
biochemická stanovení



ASTM Int'l Amphibian Toxicity Test - ASTM E2591-07 - Guide for Conducting Whole Sediment Toxicity Tests with Amphibians

- hodnocení sedimentů a podmáčených půd (mokřady) z potenciálně kontaminovaných lokalit, kde jsou obojživelníci důležitými druhy
- měří účinky biodostupné frakce
- Nasazení čerstvě nalíhnutí pulci skokanů *Rana pipiens*, *R.sylvatica* (stadium 23-25), možno i drápatka
- larvy krmeny
- 10 d kontaktní test se sedimentem
- 300 ml kádinky – 100 ml sedimentu, 175 ml vody
- Sledované parametry: přežívání, růst - subletální parametry (délka, šířka těla)

AMPHITOX

soubor toxikologických testů k odhadu rizik letálních a subletálních účinků testované látky pro obojživelníky (Herkovits et Pérez-Coll, 2003).

Modelový organizmus - vývojová stádia ropuchy *Bufo arenarum*.

AMPHITOX zahrnuje:

akutní test toxicity (AMPHIACU)

chronický test toxicity (AMPHICRON)

test na časných vývojových stádiích (AMPHIEMB)

Výsledné hodnoty : LC50, NOEC (nejvyšší koncentrace testované látky, která nezpůsobila žádné pozorovatelné účinky) a TI (teratogenní index).

Výhoda testu AMPHITOX : umožňuje přesně stanovit období, ve kterém vykazuje testovaná látka nejsilnější účinky na modelový organizmus.

Testy genotoxicity

MN – test a Jayletův test

- Metody pro zjišťování genotoxicity xenobiotik pomocí obojživelníků : Xenopus Mikronucleus Assay (MN–test) a Jayletův test
(Békaert et al., 1999; Zoll-Moreux et Ferrier, 1999).
- Princip: sledování zvýšeného počtu mikrojader v erytrocytech u larev po expozici látkám s potencionálním genotoxickým účinkem.
- Testy se liší použitým druhem modelového organizmu. MN–test pracuje s larvami drápatky vodní (*Xenopus laevis*), Jayletův test je upraven pro použití larev ocasatých obojživelníků – žebrovníka (*Pleurodeles waltl*) nebo axolotla (*Ambystoma mexicanum*).
- Jayletův test na ocasatých obojživelnících se ve Francii využívá jako standardní metoda pro určování genotoxicity látek a je zpracován do podoby metodiky French Standard NF (AFNOR T90-325, 1992).
- MN–test s drápatkami má stejnou senzitivitu jako Jayletův test na ocasatých obojživelnících a tudíž jsou oba testy vhodné pro posuzování genotoxicity.



Testy odhalující narušení endokrinního systému obojživelníků

Endokrinní disruptory (ED's) jsou xenobiotika narušující endokrinní systém živočichů.

U obojživelníků působí ED's na několika úrovních:

- v embryonálním a larválním období,
- při metamorfóze
- v období diferenciace gonád,
- v období sekundární pohlavní diferenciace a
- v dospělosti (narušením fyziologického chování)

Následkem předčasné metamorfózy vznikají extrémně malí jedinci, neschopní reagovat na změny přírodních podmínek, s omezenou možností živit se větší potravou a s nízkými energetickými rezervami. Některé ED's ovlivňují regulační systém pohlavních steroidů. Pokud takové ED's působí na populaci larev v období vývoje gonád, dochází ke změně poměru pohlaví.

Testy endokrinní disrupce obojživelníků

Testy metamorfózy a vývoje

Cíl: prokázat, zda zkoumaná látka ovlivňuje rychlosť metamorfózy.

Čtrnáctidenní test metamorfózy

- dle metodiky U. S. EPA Endocrine Disruptor Screening and Testing Committee (EDSTAC) T I. – *Frog metamorphosis assay* (Federal Register, 1998).

- obdobný test **Metamorphosis Climax Assay** (OECD 46, 2004).

Do testu jsou nasazeny larvy drápatky vodní (*Xenopus laevis*) ve vývojovém stadiu 60, tzn. těsně před dosažením metamorfózy.

Larvy jsou po celou dobu testu (14 dnů) vystaveny expozici zkoumané látky.

Sledované parametry: stádium vývoje a průběh metamorfózy.

Doplňkové údaje: výška ocasního lemu, délka ocásku, těla a pánevních končetin.

Výsledek testu: hodnota IC_{50} , což je koncentrace testované látky, která způsobí u 50 % larev inhibici metamorfózy.

Testy endokrinní disrupce obojživelníků

Testy metamorfózy a vývoje

Sedmdesátidenní test metamorfózy

- Výhoda: prodloužená expozice larev zkoumané látce, lépe simulující přírodní podmínky
- embrya nasazena do testu ve stádiu střední blastuly až časné gastruly, medium FETAX
- embrya nejprve umístěna v objemu 100 ml media, pátý den přemístěna do skleněných akvárií do objemu 8 litrů testované látky
- každých 72 hodin výměna 50% expozičního média
- od pátého dne larvy denně krmeny
- 12ti hodinová fotoperioda a teplota vody $24\pm2^{\circ}\text{C}$.
- Sledovány teplota, kyslík a pH, množství amoniaku.
- Po 70ti dnech ukončení - stanovenou vývojové stádium
- **Sledované parametry:** stádium vývoje a průběh metamorfózy.
- **Doplňkové údaje:** výška ocasního lemu, délka ocásku, těla a pánevních končetin.
- **Výsledek testu:** 5 d LC50, 70 d LC50, IC50 (koncentrace testované látky, která způsobí u 50 % larev inhibici metamorfózy).

Testy endokrinní disruptce obojživelníků

Xenopus metamorphosis Assay (XEMA)

- nově navrhován OECD pro testování endokrinní disruptce
- do testu se nasazují pulci drápatek ve vývojovém stádiu 48-50.
- Pozitivní kontrola hormon tyroxin (T4).
- Po 28 dnech vyhodnocena celková tělesná délka larev, délka ocásků a dosažená vývojová stádia.

Xenopus Limb Bud Assay (OECD 46, 2004)

- screeningový test pro látky, které mohou vyvolat abnormální vývoj končetin zkoumané látce jsou vystavena embrya drápatky od stádia blastuly.
- délka testu se řídí rychlostí vývoje pánevních končetin (v rozmezí 45 až 60 dní).
- Posuzuje se výskyt malformací pánevních končetin a přežití larev.
- Doplňujícím vyšetřením může být ještě histologické vyšetření štítné žlázy

Kontaminovaná lokalita



Referenční Lokalita

***Rana catesbeiana*, American bullfrog**

Photo courtesy of Dr. James Carr

Testy endokrinní disruptce obojživelníků

Sledování sexuálního vývoje

- Vlivem ED's dochází k poruchám vývoje gonád – mění se poměr počtu samců a samic a také se objevuje intersex – tzn. současná přítomnost ovarií i testes u jednoho jedince
- Larvy drápatky *Xenopus laevis* jsou od stáří pěti dnů vystaveny působení testované látce.
- Pozitivní kontrola 17β -estradiol a dihydrotestosteron.
- Po ukončení metamorfózy (po 78 dnech) se u každého jedince provádí histologické vyšetření gonád a svalu *m. dilatator laryngis* - jeho velikost patří mezi druhotné pohlavní znaky u drápatky vodní. U samců je tento sval vyvinut mohutněji. Při působení xenobiotik s androgenními účinky se *m. dilatator laryngis* zvětšuje.

Většina obojživelníků je chráněna = omezené využití pro výzkum a EB... registrace nových látek.. FETAX, QSAR

Kromě skokana hnědého všichni obojživelníci žijící v České republice chráněni zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zařazeni na seznam kriticky ohrožených, silně ohrožených nebo ohrožených druhů v příloze III. vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb.





Budoucí směřování?

- **hledání nových modelů nezávislých na přírodě**
- **způsob příjmu a osud toxikantů:** - místa degradace, místa kumulace
- **studium subletálních efektů:** endokrinní disruptce, malformace, imunosuprese
- jaké jsou důsledky (a interpretace) **rozdílnosti indukce CYPs** u obojživelníků a savců???
 - je nižší indukce obecná, nebo selektivní pro určité látky???
 - je to obecný princip vyšší citlivosti na znečištění???