

Modelování prostorového uspořádání bodů s využitím prostorové autokorelace (SPATIAL AUTOCORRELATION)

Koncept prostorové autokorelace

Jak analýza kvadrátů tak analýza vzdálenosti nejbližšího souseda pracuje pouze s polohou bodů. Nerozlišuje body podle hodnot jejich atributů.


Oba parametry (polohu i atributy) hodnotí **prostorová autokorelace** (SA) – je tedy metodou vhodnější.

Východiska prostorové autokorelace: Většina jevů se v prostoru mění spojitě. Blízké body budou mít i podobné hodnoty studovaného jevu a naopak.


(First law of geography - Tobler, 1970)

Prostorová autokorelace

- Prostorová autokorelace udává, do jaké míry hodnoty atributu v určitém bodě souvisí či nesouvisí s hodnotami v bodech okolních
- **Pravidelné uspořádání** hodnot proměnné indikuje **vysokou** prostorovou autokorelaci
- **Náhodné uspořádání** bodů vykazuje **nízkou** prostorovou autokorelaci
- **Pozitivní prostorová autokorelace** – atributy sousedních či blízkých bodů mají podobné hodnoty
- **Negativní prostorová autokorelace** – atributy sousedních či blízkých bodů mají odlišné hodnoty



Moranův index I - příklad



Průměrný příjem
Moran's I: 0,66

Náhodná proměnná
Moran's I: 0,012

Koeficienty prostorové autokorelace

Míry prostorové autokorelace kombinují v jednom výrazu **míry podobnosti atributů** i **míry podobnosti polohy**.

Mezi nejpoužívanější koeficienty prostorové autokorelace náleží:

- **Gearyho poměr C (Geary's Ratio)**
- **Moranův index I (Moran's I)**

Lze jich využít pro intervalová a poměrová data.

Míry prostorové autokorelace

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} w_{ij}$$

c_{ij} – podobnost atributu v bodě i a j

w_{ij} – vzdálenost bodu i a j . $w_{ii} = 0$ pro všechny body

x_i – hodnota studovaného atributu v bodě i

n – počet bodů ve vyšetřovaném vzorku

Koeficient prostorové autokorelace

Koeficient prostorové autokorelace - SAC (spatial autocorrelation coefficient) je úměrný vážené míře podobnosti atributů bodů – obecně:

$$SAC \approx \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot w_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}}$$

Gearyho poměr C:

V případě Gearyho poměru se podobnost hodnot atributu mezi dvěma body vypočte podle následujícího vztahu:

$$c_{ij} = (x_i - x_j)^2$$

$$C = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot w_{ij}}{2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} \cdot \sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} \cdot (x_i - x_j)^2}{2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} \cdot \sigma^2}$$

kde σ^2 je rozptyl hodnot atributu x s průměrem \bar{x}

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{(n-1)}$$

Moranův index I

V případě **Moranova indexu** se podobnost hodnot atributu v bodech i a j vyjádří následovně: $c_{ij} = (x_i - \bar{x}) \cdot (x_j - \bar{x})$

$$I = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot w_{ij}}{s^2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} \cdot (x_i - \bar{x}) \cdot (x_j - \bar{x})}{s^2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}}$$

kde s^2 je v tomto případě výběrový rozptyl:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Definování míry podobnosti polohy bodů

Podobnost polohy bodů i a j, - hodnota w_{ij} , se určí jako inverzní hodnota vzdálenosti těchto bodů.

Tedy podle výše uvedených předpokladů dáváme malou váhu hodně vzdáleným bodům a velkou váhu bodům blízkým tedy:

$$w_{ij} = \frac{1}{d_{ij}}$$

Obor hodnot koeficientů prostorové autokorelace

Rozdíly mezi oběma indexy jsou dány způsobem výpočtu rozdílů mezi hodnotami atributu. Obor hodnot, kterých mohou oba indexy nabývat se tedy také liší, jak uvádí následující tabulka:

Prostorové uspořádání	Gearyho poměr C	Moranův index I
Shlukové uspořádání, sousední body vykazují podobné hodnoty	$0 < C < 1$	$I > E(I)$
Náhodné uspořádání, body nevykazují znaky podobnosti	$C \sim 1$	$I \sim E(I)$
Pravidelné uspořádání, sousední body vykazují rozdílné charakteristiky	$1 < C < 2$	$I < E(I)$

kde $E(I) = (-1)/(n-1)$ je očekávaná hodnota indexu

Předpoklad náhodnosti a předpoklad normality

Při studiu prostorového uspořádání, můžeme předpokládat dva základní způsoby, kterými jsou atributy přiřazeny jednotlivým bodům.

1. Předpoklad náhodnosti (randomization, nonfree sampling) – předpokládáme, že hodnoty atributů v bodech představují pouze jednu z možných variant uspořádání při použití stejné množiny hodnot.

2. Alternativně můžeme předpokládat, že hodnoty atributů v množině studovaných bodů jsou pouze jednou z nekonečného množství možností. Každá hodnota je nezávislá na hodnotách jiných v množině bodů – **předpoklad normality (normality, free sampling)**.

Příklad: Studovaná plocha obsahuje sedm bodů:

Předpoklad náhodnosti – může existovat pouze různá konfigurace 4 „černých“ a 3 „bílých“ bodů.

Předpoklad normality – může existovat různá konfigurace jakéhokoliv (0 až 7) počtu „černých“ a „bílých“ bodů.

Určení odhadů očekávaných hodnot

- Výše uvedené předpoklady náhodnosti (R) a normality (N) ovlivňují způsob výpočtu očekávaných (E – expected) hodnot i hodnot rozptylu.
- Očekávané hodnoty indexů a hodnoty rozptylu potřebujeme pro testování, zda se vypočtené hodnoty indexů C a I statisticky významně liší od náhodného uspořádání.

Odhad očekávaných hodnot pro náhodné uspořádání (random pattern) a rozptyly pro Gearyho poměr C

$$E_N(C) = 1 \quad E_R(C) = 1$$

$$VAR_N(C) = \frac{[(2S_1 + S_2)(n-1) - 4W^2]}{2(n+1)W^2}$$

$$VAR_R(C) = \frac{(n-1)S_1[n^2 - 3n + 3 - (n-1)k]}{n(n-2)(n-3)W^2} - \frac{(n-1)S_2[n^2 + 3n - 6 - (n^2 - n + 2)k]}{4n(n-2)(n-3)W^2} + \frac{W^2[n^2 - 3 - (n-1)^2 k]}{n(n-2)(n-3)W^2}$$

kde

$$S_1 = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (w_{ij} + w_{ji})^2}{2} \quad k = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{\left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right)^2}$$

$$W = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}$$

$$S_2 = \sum_{i=1}^n (w_i + w_j)^2$$

Odhad očekávaných hodnot Moranova indexu I a hodnot rozptylu pro náhodné uspořádání

$$E_N(I) = E_R(I) = \frac{-1}{n-1}$$

$$VAR_N(I) = \frac{(n^2 S_1 - n S_2 + 3W^2)}{W^2(n^2 - 1)} - [E_N(I)]^2$$

$$VAR_R(I) = \frac{n[(n^2 - 3n + 3)S_1 - nS_2 + 3W^2]}{(n-1)(n-2)(n-3)W^2} - \frac{k[(n^2 - n)S_1 - nS_2 + 3W^2]}{(n-1)(n-2)(n-3)W^2} - [E_R(I)]^2$$

Určení standardizovaných hodnot

Máme-li vypočteny očekávané hodnoty indexů a jejich rozptyly, můžeme vyjádřit standardizované hodnoty (Z-skore)


$$Z = \frac{I - E(I)}{VAR(I)}$$

nebo

$$Z = \frac{C - E(C)}{VAR(C)}$$

Pro hodnoty Z pak mohou být použity stejné kritické hodnoty, tedy na hladině významnosti $\alpha=0,05$:

$$-1,96 < Z < +1,96$$



Příklad výpočtu měr prostorové autokorelace

Interpretace hodnot koeficientů prostorové autokorelace:

Pokud zjištěné hodnoty z-skóre padnou vně intervalu (-1,96 ; +1,96), potom se prostorové uspořádání bodů statisticky významně liší (na hladině 5 %) od uspořádání náhodného.

Alternativy výpočtu

U uvedených vztazích lze modifikovat výrazy pro vyjádření podobnosti polohy. Hodnoty w_{ij} mohou nabývat binárních hodnot 0, 1 podle toho, zda jde o body sousední či nikoliv. Jako sousední body považujeme centroidy regionů, které obklopují daný region.

Modifikovat lze také váhy vzdálenosti bodů výrazem:


$$w_{ij} = \frac{1}{d_{ij}^b}$$

Kde koeficient b může nabývat různých hodnot v závislosti na povaze studovaného problému (vzdálenost měřená dosažitelností autem a letadlem jejiná). Hodnota b je často rovna 2.

Uvedených koeficientů prostorové autokorelace lze využít pro výpočet podobnosti mezi polygony.

Příklady použití měr prostorové autokorelace

1. Hledání příčin určitého prostorového rozložení jevů



10 Highest Crash Frequency Intersections in Honolulu
(analýza lokálních a globálních vlivů)

Crime analysis (prostorová analýza kriminality)

<http://www.ncjrs.gov/html/nij/mapping/index.html>

<http://www.icpsr.umich.edu/CRIMESTAT/>






Figure 4.17

A map showing domestic burglary hot spots and police perception in the Meadows area of Nottingham, United Kingdom.
Source: Ratcliffe and McCaffery, 1996
Figure 1, p. 68
Reproduced by permission




The Two Extremes

Site F4 Site Camp 23




Využití měr prostorové autokorelace pro charakterizování struktury v krajinné ekologii

2. testování předpokladu prostorové nezávislosti reziduálních hodnot v regresních modelech










2. testování předpokladu prostorové nezávislosti reziduálních hodnot v regresních modelech



Prostorová regrese


2. testování předpokladu prostorové nezávislosti reziduálních hodnot





Jak interpretovat výsledek v případě prostorové závislosti reziduálních hodnot?

$I >> 0$ nebo $I << 0$



Možná řešení?

- sampling (výběr vzorků) viz. dále
- další nezávisle proměnná


$$Y = X_1 * a + X_2 * b + c$$

Využití měr prostorové autokorelace bodů

3. SAMPLING (vzorkování) testování předpokladu prostorové nezávislosti výběru bodů pro následnou interpolaci

- řada interpolačních algoritmů vyžaduje nezávislost vstupních hodnot (náhodnost)

• tuto lze měřit měrami prostorové autokorelace




Další míry prostorové závislosti


K - funkce (Ripley's K function)

Zjišťuje celkový počet všech bodů, které se kolem bodu vyšetřovaného vyskytují do určité zvolené vzdálenosti

Je-li tento počet bodů větší než počet bodů, který by odpovídala náhodnému rozdělení, potom body jeví tendenci se shlukovat.



K - funkce



$$K(d) = \frac{A}{n^2} \sum_{i \neq j} I_{ij} d_{ij}$$

- A – plocha území
n – počet bodů
d – vzdálenost (zvolený poloměr)
I – váha:
 I = 1 pokud $d_{ij} < d$
 I = 0 pokud $d_{ij} > d$


Transformace K - funkce

$$L(d) = \sqrt{\frac{A \sum_{i \neq j} I_{ij} d_{ij}}{\pi n(n-1)}}$$



Interpretace:

- při zcela náhodném rozdělení bude přímka v grafu svírat s osou x úhel 45°
- Bude-li průběh přímky hodnot L vyšetřovaných bodů nad touto přímkou – tendenze ke shlukování
- Bude-li průběh přímky hodnot L vyšetřovaných bodů pod touto přímkou – tendenze k rovnoměrnému rozložení bodů



Možnosti využití prostorové autokorelace

- popis a identifikace struktury, uspořádání, hledání příčin
- identifikace shluků, odlehlych hodnot (viz. lokální míry)
- odhalení trendu v datech
- testování vhodnosti použitých regresních modelů
- princip vybraných metod interpolace