

Užitkové rostliny IIc

Vít Grulich

Passifloraceae

■ *Passiflora* - mučenka


- Liány
- Původ: Jižní Amerika
- *P. edulis*
- *P. quadrangularis*
- *P. alata*
- *P. caerulea*
- *P. mollissima*
- Pěstování: subtropy
- Užití: bobule




P. caerulea



Passiflora




P. edulis



Passiflora




P. quadrangularis



Passiflora



P. mollissima



Punicaceae

■ *Punica granatum* granátové jablko


- Opadavý keř nebo nízký strom
- Původ: Blízký východ
- Pěstování: subtropy
- Užití: bobule - přímý konzum, džusy



Rhamnaceae

■ *Ziziphus jujuba* cicimek

- Opadavý keř nebo nízký strom
- Původ: Čína
- Pěstování: subtropy
- Užití: peckovice



Rosaceae

■ *Amygdalus communis* mandloň

- Opadavý strom
- Původ: Střední východ
- Pěstování: subtropy
- Užití: semena



Rosaceae

■ *Armeniaca vulgaris* *meruňka*

- Opadavý keř nebo stromek
- Původ: Střední východ
- Pěstování: mírný pás
- Užití: peckovice



Rosaceae

■ *Aronia melanocarpa*

- Opadavý strom
- Původ: S. Amerika
- Pěstování: mírný pás
- Užití: malvice



Rosaceae

■ *Cerasus*

- Opadavý strom
- Původ: Evropa-z. Asie
- Pěstování: mírný pás
- Užití: peckovice



C. vulgaris



C. avium

Rosaceae

■ *Cydonia oblonga* kdoule

- Opadavý keř nebo stromek
- Původ: Střední východ
- Pěstování: subtropy
- Užití: malvice



Rosaceae

■ *Eriobotrya japonica* lokvát

- Stálezelený keř nebo stromek
- Původ: jv. Asie
- Pěstování: subtropy
- Užití: malvice



Rosaceae

Fragaria - jahoda

- Vytrvalá bylina
- Původ: Evropa, Amerika
- Pěstování: mírný pás
- Užití: nepravý plod



Fragaria chiloensis



F. virginiana

Rosaceae

■ *Malus domestica* – jabloň

- Opadavý keř nebo stromek
- Původ: Blízký východ
- Pěstování: mírný pás
- Užití: malvice



Rosaceae

■ *Mespilus germanica* mišpule

- Opadavý keř nebo stromek
- Původ: Blízký východ
- Pěstování: mírný pás
- Užití: malvice



Rosaceae

■ *Persica vulgaris*

- Opadavý keř nebo stromek
- Původ: snad Čína
- Pěstování: mírný pás
- Užití: peckovice



Rosaceae

■ *Pyrus* - hrušeň

- Opadavý keř nebo stromek
- Původ: Blízký východ
- Pěstování: mírný pás
- Užití: malvice



P. pyriformis



P. communis



Rosaceae

■ *Prunus* - slivoň

- Opadavý keř nebo stromek
- Původ: Blízký východ
- Pěstování: mírný pás
- Užití: peckovice



P. insititia



P. domestica

Rosaceae

■ *Rubus* - ostružiník

- Opadavý keř nebo stromek
- Původ: Blízký východ
- Pěstování: mírný pás
- Užití: souplodí peckovic



R. laciniatus



R. chamaemorus

Rosaceae

■ *Sorbus* - jeřáb

- Opadavý keř nebo strom
- *S. aucuparia* (stř. Evropa)
- *S. domestica* (Středozeemí)
- Pěstování: mírný pás
- Užití: malvice



S. domestica



S. aucuparia



Rutaceae

■ Citrus - citrus

- Stálezelené keře nebo stromky
- Významné ovocné druhy
- Původ některých nejasný



Citrus bergamia © CJBN

C. medica

Původ: Čína

Pěstování: subtropy

Užití: flavedo

C. bergamia

Původ: Čína

Pěstování: subtropy

Užití: silice

Rutaceae

■ *Citrus* - citrus

- Stálezelené keře nebo stromky
- Pěstování: subtropy
- Užití: hesperidia



C. limetta
Původ: Čína



C. limon
Původ: Čína

Rutaceae


■ *Citrus* - citrus

- Stálezelené keře nebo stromky
- Pěstování: subtropy
- Užití: hesperidia

C. grandis
Původ: Čína



C. paradisi
Původ: Karibik



Rutaceae

■ *Citrus* - citrus

- Stálezelené keře nebo stromky
- Pěstování: subtropy
- Užití: hesperidia



C. sinensis
Původ: Čína



C. aurantium
Původ: Čína



Rutaceae

■ *Citrus* - citrus

- Stálezelené keře nebo stromky
- Pěstování: subtropy
- Užití: hesperidia



C. reticulata
Původ: Čína

C. deliciosa
Původ: Čína



Rutaceae

■ Citrus - citrus

- Stálezelené keře nebo stromky
- Pěstování: subtropy
- Užití: hesperidia



C. unshiu
Původ: Čína

C. clementina
Původ: Čína

Rutaceae

□ *Fortunella* - kumkvát

- Opadavý keř nebo nízký strom
- *F. margarita*, *F. japonica* atd.
- Původ: v. Asie
- Pěstování: subtropy
- Užití: hesperidia




F. margarita

F. japonica



Sapindaceae

- *Litchi chinensis* - liči
 - Opadavý keř nebo nízký strom
 - Původ: Čína
 - Pěstování: subtropy
 - Užití: peckovice




Sapindaceae



■ *Euphoria longan* - longan

- Opadavý keř nebo nízký strom
- Původ: Čína
- Pěstování: subtropy
- Užití: peckovice




Euphoria longan
Sapindaceae
J.J.Darley



Sapindaceae

■ *Nephelium lappaceum* rambutan

- Opadavý keř nebo nízký strom
- Původ: Čína
- Pěstování: subtropy
- Užití: peckovice



Sapotaceae

■ *Chrysophyllum cainito* - caimito

- Stálezelený strom
- Původ: Střední Amerika
- Pěstování: tropy Ameriky, Vietnam, Čína
- Užití: bobule



© TopTropicals.com



Sapotaceae

■ *Manilkara zapota* - sapodilla

- Stálezelený strom
- Původ: Střední Amerika
- Pěstování: tropy Ameriky a Asie
- Užití: bobule



Solanaceae

■ *Cyphomandra betacea*

rajčenka

- Stálezelený keř nebo stromek
- Původ: Jižní Amerika
- Pěstování: subtropy
- Užití: bobule



Solanaceae

■ *Physalis peruviana* - mochyně

- Jednoletá bylina
- Původ: Jižní Amerika
- Pěstování: subtropy
- Užití: bobule



Foto: Arne Anderberg



Foto: Anna-Lena Anderberg



Vitaceae

■ *Vitis* - réva vinná

- Dřevnatá liána
- Původ: Středozeemí
- Pěstování: subtropy
- Užití: bobule, víno

