

Systém a evoluce obratlovců

XI

Tetrapoda



- charakteristika
- systém





Vznik

- svrchní devon (oteplení)
- předpoklady:
 - zvyšování obsahu kyslíku v atmosféře, zvedání pevniny a ústup moře, zvyšování potravní nabídky na souši (rozvoj vegetace)
 - schopnost pohybu po souši a dýchání vzdušného kyslíku, adaptace k méně stabilnímu prostředí, ochrana před ztrátou vody


- předkové: „Rhipidistia“ - Osteolepiformes (*Eusthenopteron*, 365 Myr), Panderichthyida (Elpistostegalia) (*Panderichthys*, 380 Myr, *Elpistostege*)
- přechod k tetrapodům: svrchní devon - *Tiktaalik*? (375 Myr, S Kanada, 2006), *Sauripterus* (370 Myr, Pennsylvania, 1998, paprsky - 8 prstů), *Elginerpeton* (368 Myr, Skotsko), *Obruchevichthys* (368 Myr, Litva, Rusko - jen část mandibuly), *Metaxygnathus* (365 Myr, J Aus)
- nejstarší Tetrapoda: *Densignathus* (365 Myr, jen čelist, USA), *Hynerpeton* (360-365 Myr, USA, predace) *Acanthostega* (8+7, 360 Myr, Grónsko, 1987), *Ichthyostega* (7, 363 Myr, Grónsko), *Tulerpeton* (6, Tula, Rusko, značné rozšíření, již Reptiliomorpha - Anthracosauria, marinní sedimenty), jinak sladkovodní sedimenty









Ichthyostega had a “fishy” skull and a lateral line (!), but the number of bones was reduced.



Eusthenopteron



Ichthyostega



New *Ichthyostega* reconstruction from Ahlberg et al. 2005



Plesiomorfie


- choany
- sekundární autostylie
- labyrinthodontní zuby
- plicní vaky - plíce
- přestavba srdce a oblouků aorty

Apomorfie

- párová chiropterygia, vymizení nepárových ploutví a paprsků
- monospondylní obratle, artikulace obratlů, kloubní spojení lebky s páteří (**krční obratel**)
- kompaktní kostěné endokranium
- vymizení skřelí, uzavření žaberních štěrbin, hyomandibulare - **collumela**
- vznik lacrimale, slzný kanálek
- těžiště těla v oblasti pánve a zadních končetin, srůst křížových obratlů a pánve, **ztráta spojení mezi lebkou a předními končetinami**
- plíce - trachea, larynx
- 2 mozkové pleny
- jazyk se žláznatým polem

Systém

Tetrapoda




Devon - rané formy (*Acanthostega*, *Ichthyostega*, *Tulerpeton*) - polydaktylie

Hranice devon-karbon - Romerova mezera - (25 mil. let)

Karbon - pokročilé formy (Temnospondyli) včetně forem blízkých plazům
(*Reptiliomorpha*: Anthracosauria) - pentadaktylie



Acanthostegidae (†) Ichthyostegidae (†)




dříve 2 vymřelé podtř.

A. Apsidospondyli (Labyrinthodontia - vráskozubí) se 2 řády:

- 1) **Ichthyostegalia** - Acanthostega (370 mil. let), Ichthyostega, Tulerpeton (6 prstů)
- 2) Anthracosauria - patří k Reptiliomorpha, dom. párové pleurocentra



2 m



labyrinthodontní zub

Ichthyostega

diplospondylní obratle, silné krycí kosti na lebce, silná žebra a pletence končetin, kožní pancíře, labyrinthodontní zuby, nestabilizovaný počet prstů - 4-8, chybí karpální a tarsální elementy - končetiny jen k posunu po břiše

B. Lepospondyli (srostloobratlí)


Acanthostega
8 prstů



Ichthyostega
7 prstů



Ichthyostega (Dev)



Nejstarší tetrapod
Obruchevichthyes (Litva) - svrchní devon

labyrinthodontní zuby

intercentrum

pleurocentra

tělo obratle:

intercentrum + párová pleurocentra

Kombinace aquatičkých a terestrických znaků

- pozůstatky žaberního aparátu
- zachovány kanálky proudového orgánu na hlavě
- zbytky šupin, paprsky v ocasní ploutvi,

Systém




Amphibia

- zápěstí a zanártí vytvořeno
- redukce prstů na ruce (4)
- vývoj přes larvu

Amphibia

Batrachomorpha



Lissamphibia

Nectridea (†) - voda

Microsauria (†) - souš

Colosteidae (†)

Eryopoidea (†)

Dissorophoidea (†)

Albanerpetodontidae (†)

Gymnophiona

Caudata

Anura

„Lepospondyli“

Amphibia

Lissamphibia

Frost et al. (2006) - Lissamphibia = monophylum (2)

Benton (2005), Anderson (2008) - Temnospondyli + Lissamphibia = sesterské taxony

Osifikace těl obratlů: intercentrum a pleurocentra

Raní tetrapodi:

intercentrum + pleurocentra

Lepospondyli:


nerozlišeno

Temnospondyli:


intercentrum (ic)

Reptiliomorpha (Amniota):

pleurocentra (p)



n = neural arch
p = pleura centra
ic = intercentrum
c = centra




Benton (2005)

„Lepospondyli“

(„srostloobratlí“)


- rozpad na několik řádů vymřelých obojživelníků
- od karbonu do permu
- hadovité tělo
- **osifikační centra obratlů nerozlišena**
- zuby bez zvrásnění

Nectridea



Diplocaulus (1,3m, perm, Nectridea)

Eoscopy - lebka




Microsauria





Microbrachis (15 cm, karbon, u Nýřan)

Temnospondyli

- segmentovaná páteř
- tělo obratle: **dom. intercentrum**
- gracilní collumela v kontaktu s bubínkem - přenos zvuku vzduchem
- od raného karbonu, permská radiace
- Mastodonsaurus* - spodní trias (6m)



Colosteidae (†)



Colosteus

Eryopoidea (†)


karbon-perm, specializovanější,
život jako dnešní krokodýlové



Eryops



Dissorophoidea - dvouhroté zuby,
korunka oddělena od báze zuba stopkou,
od karbonu do triasu





Zygosaurus

Dissorophoidea (†) - Allocaudata (†)


- od střední jury do pliocenu, S Am a Evropa (kmenový taxon
Lissamphibia)




Albanerpeton



Lissamphibia - obojživelníci



- nahé slizké tělo, tenká slabě rohovatějící kůže
- ztráta akvatických znaků při metamorfóze larvy: redukce ploutevního lemu, rozvoj párových končetin, larva - herbivorní, adult - carnivorní - přestavba úst
- 3 typy dýchacích orgánů: vnější a vnitřní žábry, plíce, integument
- sladkovodní původ, chybí mořské formy
- ektotermní, letargie: estivace, hibernace
- max.: *Andrias davidianus* (1,8 m, 10 kg), *Conraua goliath* (40 cm, 7 kg), červor *Caecilia thompsoni* (1,52 m)
- min.:
Psyllophryne didactyla
ropušenka dvouprstá
- 9,8 mm
(Brachycephalidae)
Sminthilus limbatus
bezblanka nejmenší
11,5 mm (Leptodactylidae)



Eleutherodactylus iberia
- 1996, 10 mm
(Leptodactylidae)




Morfologie (Lissamphibia)

- četné **mnohobuněčné slizové** (i jedové) **žlázy** - kožní dýchání
- osifikovaná kostra, obratle amphicélní, opistocélní i procélní obratle, 1. krční obratel - atlas, axis není vytvořen, **žebra zkrácená** - jen u ocasatých, sternum u žab
- **bikondylní lebka, redukce dermatocrania** (17 párů u ryb - 7 u obojživelníků), primární patro - báze neurocrania, sek. autostylie, collumela, bez skřelí
- lopatkové pásmo: krycí - clavicula u žab, náhradní - scapula, procoracoid + chrupavky, spojení se sternem, bez spojení s lebkou, **na přední končetině 4 prsty**
- pánevní pásmo: tenké kůstky - ilium, ischium (kost), pubis (chrupavka) - pánev spojena s páteří, na zadní končetině 5 prstů; u žab srůsty - os antebrachii, os cruris, urostyl
- svalstvo: myomery zřetelné u ocasatých, velké svaly - zádový a břišní, svalstvo končetin
- mozek: hemisféry koncového mozku s palliem, koordinační ústředí - tectum středního mozku, malý mozeček
- smysly: chemoreceptory - chut' v ústech, hltanu, na papilách jazyka - pohárky; čich - nosní chodby (nares - choany), vomeronasální (Jacobsonův) orgán; proudový orgán jen u larev, ucho - velký sacculus, v lageně papilla basiliaris + **papilla amphibiorum**, u žab tympanum s columellou, u ocasatých operculum - chvění z lopatky na oválné okénko, u červorů chybí střední ucho; oko - barevné vidění, posun čočky od sítnice (m. protractor lentis), 3 víčka (mžurka), u žab parietální oko, muskulatura oka - **mm. retractor et levator bulbi**

- TS: svalnatý pohyblivý jazyk, zuby homodontní, polyfiodontní, zuby často i na patře, larvy rohovité odontoidy, **polykání zatahováním očních bulev (mm. retractor et levator bulbi)**, kloaka, velká játra se žlučníkem
- DS: larva - vnější kožní žábry, 3 páry vnitřních žaber jen u pulců žab, u dospělých tenkostěnné plíce, pumpování vzduchu spodinou úst, u žab - rezonanční měchýřky samců, kožní dýchání, dýchání sliznicí ústní dutiny
- CS: larva - rybího typu, ale již 2 síně; dospělec - plicní oběh, krkavice - oblouky aorty (1-2 páry) - plícněkožní tepny (a. pulmocutaneae), někdy ductus caroticus, ductus arteriosus; žíly - kardinální žíly, Cuvierovy chdby; nepárová zadní a párové přední duté žíly, plícní a kožní žíly ústí do Cuvierových chodeb a ty do L síně, duté žíly do P síně
- VS: larva - holonefros (červoři), ostatní pronefros a opistonefros, dospělci jen opistonefros bez metamerie, primární močovody
- PS: gonády vedle ledvin, varlata + Wolfova chodba (vpředu jako chámovod, vzadu chámomočovod, vaječníky + Müllerova chodba, bobtnající obal vajíček, žlutá nebo oranžová **tuková tělesa**, metamorfóza larvy řízena tyroxinem, u ocasatých často neotenie (pedomorfie)
- Ekol: teplota, vysoká vlhkost, chemie substrátu; živočišná potrava, býložraví jen pulci, epigamní projevy, **spermatofony** u ocasatých, **amplexus** u žab, kopulace u červořů

Lissamphibia - obojživelníci



až 6 672 recentních druhů

Anura (frogs and toads) (5891)

- [Allophrynidiae](#) (1)
- [Alytidae](#) (5)
- [Arthroleptidae](#) (141)
- [Ascaphidae](#) (2)
- [Bombinatoridae](#) (10)
- [Brachycephalidae](#) (44)
- [Brevicipitidae](#) (27)
- [Bufo \(544\)](#)
- [Calyptocephalellidae](#) (4)
- [Centrolenidae](#) (151)
- [Ceratophryidae](#) (88)
- [Ceuthomantidae](#) (3)
- [Craugastoridae](#) (114)
- [Cycloramphidae](#) (104)
- [Dendrobatidae](#) (274)
- [Discoglossidae](#) (7)
- [Eleutherodactylidae](#) (202)
- [Heleophrynidae](#) (6)
- [Hemiphractidae](#) (94)
- [Hemisotidae](#) (9)
- [Hylidae](#) (889)
- [Hylodidae](#) (42)
- [Hyperoliidae](#) (213)
- [Leiopelmatidae](#) (4)
- [Leiuperidae](#) (79)
- [Leptodactylidae](#) (100)
- [Megophryidae](#) (148)
- [Microhylidae](#) (469)
- [Myobatrachidae](#) (128)
- [Nasikabatrachidae](#) (1)
- [Pelobatidae](#) (4)
- [Pelodytidae](#) (3)
- [Pipidae](#) (32)
- [Ranidae](#) (1377)
- [Rhinophrynidiae](#) (1)
- [Scaphiopodidae](#) (7)
- [Sooglossidae](#) (4)
- [Strabomantidae](#) (560)

Caudata (salamanders) (585)


- [Ambystomatidae](#) (32)
- [Amphiumidae](#) (3)
- [Cryptobranchidae](#) (3)
- [Dicamptodontidae](#) (4)
- [Hynobiidae](#) (53)
- [Plethodontidae](#) (394)
- [Proteidae](#) (6)
- [Rhyacotritonidae](#) (4)
- [Salamandridae](#) (82)
- [Sirenidae](#) (4)

Gymnophiona (caecilians) (186)


- [Caeciliidae](#) (104)
- [Ichthyophiidae](#) (46)
- [Rhinatrematidae](#) (10)
- [Scolecomorphidae](#) (6)
- [Typhlonectidae](#) (13)
- [Uraeotyphlidae](#) (7)

Gymnophiona - červoři

J a stř. Amerika, tropická Afrika, Indie, od spodní jury
6 čeledí, 34 rodů, 186 druhů



Bez končetin, červovitý trup, zevně kroužkovaný, osifikovaná kompaktní lebka, život ve vodě nebo půdě - redukované oči, silná dolní čelist (silný stisk), v kůži často osifikované šupinky, vnitřní oplození, kopulace - v kloace phallodaeum, oviparie i viviparie, mladí jedinci ozubení - vyhrabávání se, k ukousávání děložní sliznice matky




Gymnophiona - červoři

Caudata - ocasatí


Anura - žáby

Batrachia = Caudata + Anura: systém tympanum-columella + operculum (lopatkové svaly) - ovalné okénko, redukce krycích kostí lebky



CAUDATA - OCASATÍ (severní polokoule), 8-10 čeledí, 585 druhů

dlouhé tělo s ocasem, pedomorfóza (neotenie)



Sirenoidea = Sirenidae - surýnovití

Cryptobranchioidea = Cryptobrachidae - velemlokovití
Hynobiidae - pamlokovití

Salamandroidea = Amphiumidae - úhoříkovití
Plethodontidae - mločíkovití
Salamandridae - mlokovití
Ambystomatidae - axolotlovití
Proteidae - macarátovití

Sirenidae (2;3) - surýnovití

jv. USA, až 1m

larva



trvale neoteničtí (pedomorfie) s vnějšími žábrami, hadovité tělo, plochý ocas s lemem, jen přední končetiny, bez víček, bez čelistních zubů, vpředu rohovité lišty (zobák), patrové zuby v políčkách, mezikomorová přepážka v srdci, asi vnější oplození, v bahnitých vodách chudých na O₂

Sirenidae - surýnovití



© John White



© Greg Sievert



© John White

Cryptobranchidae (2;2) - velemlokovití

Jap, Čína, sv. S-Ameriky, až 1,8 m,
trvale vodní, larvy ztrácejí žábra,
dýchání ústní sliznicí a kůží, bez víček,
vnější oplození, zprohýbaná kůže a
boční kožní lem



velemlok - *Andrias*



velemlok - *Cryptobranchus*



Hynobiidae (5;31) - pamlokovití (Asie)

do 15 cm, 5-prsté zadní nohy, funkční plíce
patrové zuby v políčkách nebo příčných řadách

pamlok - *Batrachuperus*



pamlok - *Hynobius*



Amphiumidae (1;3) - úhoříkovití

jv. S-Ameriky, až 1 m, trvale pedomorfní, ale v dospělosti bez vnějších žaber a s plícemi, ale i 1 pár žaberních štěrbin, bez jazyka, víček, 2 páry drobných končetin s 1-3 prsty, zuby na čelistech, patrové zuby rovnoběžně s čelistními, nepravé vnitřní oplození

úhořík - *Amphiuma*



Plethodontidae (20;280) - mločíkovití

Amerika, Evropa, kožní dýchání, bez plic, patrové zuby v příčných řadách nebo v liniích protažených dozadu, larvy se 3-4 páry ž.s., nasolabiální rýha - hledání potravy, partnera, 3-30 cm



mločík (*Plethodon*)



mločík (*Bolitoglossa biseriata*)



mločík (*Hydromantes italicus*)



mločík (*Hydromantes*)



Salamandridae (14;55) - mlokovití

mlok (*Salamandra*)

Holarktis, ozubené čelisti, opistocoelní obratle, plíce, ovo-, ovoviviparní, řady patrových zubů protaženy dozadu, aposematické zbarvení, svatební zbarvení samců



Salamandridae - mlokovití

čolek (*Triturus*, *Ichthyosaura*, *Lissotriton*)



žebrovník (*Pleurodeles*)



larva



Ambystomatidae (4;60) - axolotlovití

S-Amerika, Mexiko, až 35 cm, robustní, pozemní, samice se rozmnožují i gynogenézí, patrové zuby v příčných řadách, larvy se širokou hlavou a 4 páry žaberních štěrbin, častá pedomorfóza



axolotl - *Ambystoma*



larva axolotla -
Ambystoma




© John White



Proteidae (2;6) - macarátovití

Sv. S-Ameriky, Slovinsko, do 50 cm, trvale pedomorfní, s vnějšími žábrami, chybí maxila, drobné končetiny, žábronoši: 4+4 prsty, pigmentovaní, s očima, červené žábry; macarát: bez očí, víček a pigmentu, 3+2 prsty, troglobiont s nepravým vnitřním opl., i pigmentace a oči
- *P. anginus parkelj* (1994)- JV Slovinsko (Jelsevnik)

macarát jeskynní - *Proteus anginus*




žábronoš - *Necturus*



Stet, B., and Arntzen, J. W. (1994). "A black, non-troglobomorphic amphibian from the karst of Slovenia: *Proteus anginus parkelj* n. ssp. (Urodela: Proteidae)." *Bijdragen tot de Dierkunde*, 64(1), 33-53.

ANURA - ŽÁBY

od triasu, 9 volných obratlů + urostyl, prodloužená pánev, ztráta ocasu, dlouhé nohy, skákání, vokalizace, nad 5891 rec. druhů, 22-38 čeledí



Ascaphidae - ocasatkovití (2)

Palaeobatrachia

Neobatrachia

Palaeobatrachia:

Leiopelmatidae - leiopelmovití (4)

Pipidae - pipovití (35)

Discoglossidae - kuňkovití (22)

Neobatrachia:

Bufonidae - ropuchovití (544)

Hylidae - rosničkovití (889)

Leptodactylidae - hvízdalkovití (900)

Dendrobatidae - pralesničkovití (274)

Ranidae - skokanovití (1377)

(i Rhacophoridae - létavkovití - 220)

Pelobatidae - blatnicovití (159)

Pelodytidae - blatničkovití (2)

Rhinophrynidiae - bachratkovití (1)

Phrynomeridae - (6)

Microhylidae - parosničkovití (469)

Pseudidae - žabicovití (5)


Rhinodermatidae - nosatkovití (2)

Centrolenidae - rosněnkovití (55)

...

Ascaphidae (1;2) - ocasatkovití

Ascaphus truei




zap. S-Ameriky, sesterský taxon k ostatním žábám, ocas bez kostry, ke kopulaci, krátká žebra, amficélní obratle



Leiopelmatidae (1;4) - leiopelmovití, starobylá čeleď, Nový Zéland

Pipidae (5;35) - pipovití (Afrika, J-Amerika)
bez jazyka, opistocélní obratle, zuby na horní
čelisti nebo chybí, rudimentární žebra

Pipa



3 vnitřní prsty na zadních nohách s rohovitými drápky

Discoglossidae (4;22) - kuňkovití (Eurasie)
terčovitý přirostlý jazyk, opistocélní obr., rud.
volná žebra, (i **Bombinatoridae 10+Alytidae 7**)



Alytes



Discoglossus



Bombina



Pelobatidae (14;159) - blatnicovití
Procélní a amficélní obr., zuby jen v
horní čelisti, vychlípitelný jazyk
Pelobates (1;4)



Megophrys nasuta - pablatnice
Megophryidae (11; 148) JV Asie



Scaphiopodidae (2;7)
Scaphiopus - blatnice
USA, vývoj - 14 dnů
Pelodytidae (1;3) - blatničkovití
Evropa, Kavkaz

Bufonidae (19;380) - ropuchovití (Evropa, Afrika, Asie, stř. a J-Am, *Bufo*)

Bufo americanus



Epidalea calamita



© Martin Šandera

Bufo bufo



Pseudepidalea viridis



Zavalití, parotidy, procoelní obr.,
bezzubá ústa, vychlípitelný jazyk, Bidderův orgán samců - larvální tkáň vaječníků

- larvální tkáň vaječníků

Bufonidae - Atelopidae (2;31) - stř. a J-Amerika

Atelopus



Atelopus spumarius



Nectophrynoides viviparous



Hylidae (600) - rosničkovití

Agalychnis - listovnice

Na konci prstů kruhové přísavky (arborikolní), štíhlé, pestře zbarvené, procélní obr., zuby na horní čelisti a patře



Phyllomedusa - listovnice



Dyscophus guineti (Microhylidae)



Kaloula pulchra

Hylidae:

Hyla - rosnička



Hyla arborea - r. zelená



Hyla - rosnička



© John White

Trachycephalus resinifictrix



Hyla picturata



Hylidae (Pelodryadidae) - Austrálie

Cyclorana - hrabalka



Ceratophrys - rohatka (Ceratoprydidae)




Leptodactylidae (900) -

hvízdalkovití - stř. a J-Amerika

Rheobatrachus silus - hvízdalka žaludková



vývoj pulců v žaludku



*Ceratophrys
ornata*

Leptodactylidae (900) - hvízdalkovití - stř. a J-Amerika

bezblanky (*Eleutherodactylus*)

vodnice (*Telmatobius*)

Eleutherodactylus myersi



Eleutherodactylus cf suetus



Eleutherodactylus petersoni



Pseudophryne corroboree



Leptodactylus fallax



Dendrobatidae (3;175) - pralesničkovití - dendrobatovití (stř. a J-Am)

Dendrobates

Dendrobates (Oophaga) lehmanni



Dendrobates auratus

myrmekovorní; „krmná“ vajíčka pulcům, šípoval jed



Dendrobates leucomelas

Dendrobates azureus



Phyllobates terribilis



Dendrobates histrionicus



Ranidae (44;650) - skokanovití (Afrika, Asie, Aus, Rana - všude)

Conraua goliath



Rana temporaria



Rana dalmatina



Lithobates catesbeiana



Lithobates pipiens



Pelophylax kl. esculenta



Dlouhé nohy, ozubená hor. čelist a patro, vymrštitelný jazyk, procélní obratle, poslední ale amficélní

Rhacophoridae (18;220) - létavkovití (Afrika, Asie, Madagaskar)

Rhacophorus



Mantidactylus pulcher



Polypedates leucomystax



prodloužené prsty s blanami

pěnová hnízda na listech
nad vodou

Centrolenidae (4;55) - rosněnkvití

J-Amerika

Centrolene



Centrolene ilex

Rhinodermatidae (1;2) - nosatkovití

J-Amerika

Vývoj pulců v rezonančním
měchýřku na hrdle samce

Rhinoderma darwini - nosatka vačnatá





Anura - žáby

Rhinophryidae (1;1) - bachratkovití (stř. Amerika)



Phrynomeridae (1;6) - stř. a J-Afrika ?



Microhylidae (58;469) - parosničkovití (Afrika, Madagaskar, stř. a J-Amerika, Asie, Nová Guinea), otylky



Pseudidae (2;12) - žabicovití (J. Amerika) do Hylidae

Class: [Amphibia](#) (6638 sp.)

Order: [Anura](#) (5858 sp.)

Family: [Allophrynidiae](#) (1 sp.)

Family: [Alytidae](#) (12 sp.)

Family: [Aromobatidae](#) (100 sp.)

Subfamily: [Allobatinae](#) (47 sp.)

Subfamily: [Anomaloglossinae](#) (24 sp.)

Subfamily: [Aromobatinae](#) (28 sp.)

Family: [Arthroleptidae](#) (139 sp.)

Subfamily: [Arthroleptinae](#) (88 sp.)

Subfamily: [Leptopelinae](#) (51 sp.)

Family: [Bombinatoridae](#) (8 sp.)

Family: [Brachycephalidae](#) (44 sp.)

Family: [Brevicipitidae](#) (26 sp.)

Family: [Bufonidae](#) (550 sp.)

Family: [Calyptocephalellidae](#) (4 sp.)

Family: [Centrolenidae](#) (145 sp.)

Subfamily: [Centroleninae](#) (115 sp.)

Subfamily: [Hyalinobatrachinae](#) (29 sp.)

Family: [Ceratobatrachidae](#) (84 sp.)

Family: [Ceratophryidae](#) (86 sp.)

Subfamily: [Batrachylinae](#) (14 sp.)

Subfamily: [Ceratophryinae](#) (12 sp.)

Subfamily: [Telmatobiinae](#) (60 sp.)

Family: [Ceuthomantidae](#) (3 sp.)

Family: [Craugastoridae](#) (114 sp.)

Family: [Cycloramphidae](#) (101 sp.)

Subfamily: [Alsodinae](#) (67 sp.)

Subfamily: [Cycloramphinae](#) (33 sp.)

Family: [Dendrobatidae](#) (174 sp.)

Subfamily: [Colostethinae](#) (59 sp.)

Subfamily: [Dendrobatinae](#) (56 sp.)

Subfamily: [Hyloxalinae](#) (57 sp.)

Family: [Dicroglossidae](#) (170 sp.)

Subfamily: [Dicroglossinae](#) (148 sp.)

Subfamily: [Occidozyginae](#) (22 sp.)

Family: [Eleutherodactylidae](#) (201 sp.)

Subfamily: [Eleutherodactylinae](#) (194 sp.)

Subfamily: [Phyzelaphryninae](#) (7 sp.)

Family: [Heleophrynidiae](#) (7 sp.)

Family: [Hemiphractidae](#) (93 sp.)

Family: [Hemisotidae](#) (9 sp.)

Family: [Hylidae](#) (891 sp.)

Subfamily: [Hylinae](#) (636 sp.)

Subfamily: [Pelodryadinae](#) (196 sp.)

Subfamily: [Phyllomedusinae](#) (59 sp.)

Family: [Hylodidae](#) (42 sp.)

Family: [Hyperoliidae](#) (208 sp.)

Family: [Leiopelmatidae](#) (6 sp.)

Family: [Leiuperidae](#) (79 sp.)

Family: [Leptodactylidae](#) (99 sp.)

Family: [Limnodynastidae](#) (44 sp.)

Family: [Mantellidae](#) (186 sp.)

Subfamily: [Boophinae](#) (70 sp.)

Subfamily: [Laliostominae](#) (4 sp.)

Subfamily: [Mantellinae](#) (112 sp.)

Family: [Megophryidae](#) (149 sp.)

Family: [Micrixalidae](#) (11 sp.)

Family: [Microhylidae](#) (466 sp.)

Subfamily: [Asterophryinae](#) (243 sp.)
Subfamily: [Cophylinae](#) (50 sp.)
Subfamily: [Dyscophinae](#) (3 sp.)
Subfamily: [Gastrophryninae](#) (45 sp.)
Subfamily: [Hoplophryinae](#) (3 sp.)
Subfamily: [Kalophryinae](#) (15 sp.)
Subfamily: [Melanobatrachinae](#) (1 sp.)
Subfamily: [Microhylinae](#) (69 sp.)
Subfamily: [Otophryinae](#) (3 sp.)
Subfamily: [Phrynomerinae](#) (5 sp.)
Subfamily: [Scaphiophryinae](#) (10 sp.)

Family: [Myobatrachidae](#) (85 sp.)

Family: [Nasikabatrachidae](#) (1 sp.)
Family: [Nyctibatrachidae](#) (17 sp.)

Family: [Pelobatidae](#) (4 sp.)
Family: [Pelodytidae](#) (3 sp.)

Family: [Petropedetidae](#) (18 sp.)
Family: [Phrynobatrachidae](#) (80 sp.)

Family: [Pipidae](#) (32 sp.)
Family: [Ptychadenidae](#) (53 sp.)

Family: [Pyxicephalidae](#) (68 sp.)
Subfamily: [Cacosterninae](#) (63 sp.)
Subfamily: [Pyxicephalinae](#) (5 sp.)

Family: [Ranidae](#) (342 sp.)

Family: [Ranixalidae](#) (10 sp.)

Family: [Rhacophoridae](#) (319 sp.)

Subfamily: [Buergeriinae](#) (4 sp.)
Subfamily: [Rhacophorinae](#) (315 sp.)
Family: [Rhinophrynidiae](#) (1 sp.)
Family: [Scaphiopodidae](#) (7 sp.)
Family: [Sooglossidae](#) (4 sp.)
Family: [Strabomantidae](#) (562 sp.)
Subfamily: [Holoadeninae](#) (45 sp.)
Subfamily: [Strabomantinae](#) (517 sp.)