





ADAPTACE A PŘÍRODNÍ VÝBĚR





Catasetum saccatum




Chiloglottis formicifera




Atta, *Acromyrmex*: větší dělníci - krájení listů,
vojáci - jejich ochrana,
malí dělníci - žvýkání listů, pěstování hub



Zacryptocerus varians



Oecophylla smaragdina



parazité × hostitelé


Co musí evoluční teorie vysvětlit:

- vznik složitých adaptací
- vznik znaků, jako rekombinace, pohlavní rozmnožování, programovaná délka života včetně senescence a smrti, posunutí segregacního poměru, které nositeli nepřinášejí (nebo zdánlivě nepřinášejí) užitek
- kooperace v rámci druhu a mezi druhy × antagonismus v rámci druhu (např. infanticida) a mezi druhy (např. kastrace hostitele parazitem)
- „škodlivé“ adaptace (např. včelí žihadlo)

ADAPTACE

proces adaptování se
vlastní znak organismu

- znak, který svému nositeli umožňuje lépe přežít a rozmnožit se
- podmínkou přírodní výběr, ohled na historii
(bezkřídlost blech × Collembola)



chvostoskok nemá křídla,
protože jeho předci je
nikdy neměli




Collembola

Protura

Insecta

blecha křídla ztratila
sekundárně





... podobně bezkřídlé druhy octomilek atd.

- adaptace známy již dříve - filozofové, přírodní teologové (sv. Augustin, sv. Tomáš Akvinský, William Paley)
- dnes „the argument from design“
- přirovnání k hodináři
- ✗ David Hume
- Richard Dawkins: „Slepý hodinář“ (Blind watchmaker)

Vysvětlení adaptací:

- nadpřirozená bytost
- lamarckismus, adaptivní mutace
zebra a lev: zesílení svalstva samo o sobě adaptivní
- ortogeneze
mechanismus?
- přírodní výběr




Závěr: Pluralismus při studiu evoluce (drift), nikoli při studiu adaptací

Koadaptace



= složité adaptace, vyžadující vzájemně koordinované změny více než 1 části

- **Herbert Spencer**: krk žirafy – současné změny kostí, svalů a cév
- × neovlivňují samostatné geny
- úroveň **genů** (→ genové komplexy, „supergeny“)
- úroveň **orgánů**
- úroveň **druhů** (→ mutualismus)




Koadaptace

- evoluce komorového oka:



Nautilus




hlavonožci,
obratlovci

obratlovci


chobotnice

Evoluce komorového oka – počítačová simulace:

- světločivné orgány → nezávislý vznik 40-60× u různých skupin bezobratlých
- Nilsson & Pelger (1994):
 - vrstva světločivných buněk mezi tmavou vrstvou buněk dole a průhlednou ochrannou vrstvou nahore
 - náhodné změny <1% → změny k horšímu zavrhnuty
 - kritérium = schopnost rozlišovat objekty v prostoru (optická fyzika → možnost kvantifikace)




Evoluce komorového oka – počítačová simulace:



Preadaptace

- Jak může být funkční poloviční oko nebo poloviční křídlo?
 - lepší než 1/4 oko a než žádné oko
 - klouzavý let apod.
- **preadaptace** = posun funkce, tj. použití znaku k jinému účelu
- Př.: peří ptáků (termoregulace → let)




Preadaptace


- Př.: lalokoploutvé ryby - pohyb po dně → šplhání na břeh



Panderichthys (Rhipidistia)



Tiktaalik




Acanthostega

- Př.: kutikula hmyzu (integument → kostra); mléčné žlázy savců (potní žl.)
- Stephen J. Gould, Elizabeth Vrba (1982):
pojem **exaptace** = širší smysl - včetně původně neutrálních znaků

Jsou adaptace dokonalé?


- časové zpoždění (time lag): „neotropické anachronismy“

Crescentia alata



- genetická omezení: superdominance
(letalní systém chromozomu 1 u *Triturus cristatus*)


- ontogenetická omezení:
vychýlení produkce různých fenotypů, nebo
omezení fenotypové variability způsobené strukturou,
charakterem, složením nebo dynamikou vývojového
systému



- David Raup (1966):


- morfoprostor popsaný 3 proměnnými

T = translation rate
rozsah pohybu
podél osy



D = tightness of the coil
vzdálenost od osy


W = expansion rate
růst velikosti




jen některé tvary skutečně realizovány

Jsou adaptace dokonalé?

- historická omezení



- Př.: hrtanový nerv
- jedna z větví bloudivého nervu
(*nervus vagus*)



Jsou adaptace dokonalé?

- konflikt na různých úrovních:
selekce na úrovni genu vs. selekce na úrovni organismu
- kompromis různých adaptivních potřeb:
 - současné dýchaní a příjem potravy při absenci sekundárního patra
 - kompromis life-history parametrů (počet mláďat × věk při první reprodukci)
 - rozdělení času mezi různé aktivity (příjem potravy, odpočinek, ...)

Metody studia adaptací:

- strukturní složitost:

čím složitější, tím pravděpodobnější,
že jde o adaptace



- účelnost, demonstrace funkce:


Bergmannovo a Allenovo pravidlo,
křídlo sokola × krahujce atd.

- komparativní metoda:

spojení s fylogenetickou analýzou

nefylogenetické statistické
metody předpokládají, že
srovnávané druhy jsou
všechny stejně příbuzné ...

- experiment



Někdy nelze ani experimentem jednoznačně určit, zda se daná vlastnost vyvinula k určitému cíli → **nebezpečí záměny funkce a účinku:** např. alkaloidy a terpeny u rostlin (odpuzování hmyzu × odpadní produkty metabolismu)

Je každý znak adaptivní?

- fyzikální a chemické zákony:
barva hemoglobinu, návrat létající ryby do vody




- kulturní dědičnost některých vzorců chování

- drift:
pseudogeny; přechod k partenogenezi u *D. mercatorum*; ztráta struktury v důsledku akumulace škodlivých mutací

skunk

- korelace se selektovaným znakem:
hitchhiking, pleiotropie



- v adaptivní krajině mnoho vrcholů:
ryptické nebo aposematické zbarvení;
lokomoce klokana × zebry

zorila

- fylogeneze:
bezkřídlost,
eusociální chování rypošů?

