

Biochemie trávení


Příjem vody, živin a dalších organických a anorganických látek, jejich zpracování pro potřeby organismu a vyměšování látek nezužitkovaných a nepotřebných, a to i ve vodě nerozpustných

- motilita (pohyb potravy)
 - sekrece
 - trávení
 - resorpce
- Vysoce regulovány**

Jen pár mechanismů regulováno


Gastrointestinální systém

- Sliznice (mukosa)
- Podslizniční vazivo (submukosa)
- Svalová vrstva
- Serosa



Dutina ústní:

- Rozmělnění potravy
- smísení se slinami
- slinné žlázy - přesní, podcelistní, podjazyková
- produkuje 0,75 až 1,5 l slin denně




Složení slin:

voda	98 - 99 %, pH 6.5
ionty	Na ⁺ (2-20 mM), K ⁺ (10-40 mM) Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻
mucus (hlen)	mucin (glykoprotein, silně hydrofilní, tvorí kluzký povrch) mukopolysacharidy
antisepické látky	thiokyanát H ₂ O ₂
enzymy	imunoglobulin A α-amylasa (štěpení škrobu; amylosa → maltosa) lysozym (bakteriolýza) lipasa (stezení TAG, pH opt. 4.0)


Žaludek

- zásobní orgán – skladování potravy
- mechanické rozmělňování

• Trávení



Žaludek



4 typy buněk:

parietální buňky (krycí)

- produkce HCl
- žaludeční faktor (glykoprotein, váže B12 pro vstřebávání v ileu)

hlavní buňky


- produkce pepsinogenu a lipasy
- pepsin: \downarrow Tyr, \downarrow Phe

- pohárkové buňky (hlenové)
 - produkce hlenu (mucus)
 - mechanická ochrana stěny
 - neutralizace HCl

- Endokrinní buňky
 - produkce gastrinu


Sekrece HCl žaludkem

- Parietální buňky (i žaludeční faktor)
- Stimul – gastrin, Ach




HCl: desinfekce potravy
denaturace bílkovin
v kyselém prostředí – štěpení pepsinogenu


„Zesílení signálu“



Duodenum (dvanáctník)




Pankreas (15 cm dlouhý, cca 2 l tekutiny denně)



Exokrinní funkce pankreatu


Trávicí enzymy ← cholecystokinin-pankreozymin
 HCO_3^- a voda ← sekretin (stimulace H^+)



Trávicí enzymy

Enzym	aktivace	substrát
Trypsin (Arg↓, Lys↓)	Střevní enteropeptidasa	Proteiny
Chymotrypsin (Tyr↓, Trp, Phe↓, Leu↓)	Trypsin	Proteiny
elastasa	Trypsin	Proteiny
Karboxypeptidasa A	Trypsin	Proteiny
Karboxypeptidasa B	Trypsin	Proteiny
Ribonukleasa		RNA
DNAza		DNA
Fosfolipasa A	Trypsin	Fosfolipidy
Lipasa	Žlučové kyseliny, kolipasa	TAG
Cholesterolesterasa		ChE

Vzájemné ovlivňování sekrece



Pankreatitida

Aktivace pankreatických enzymů



infekce, obstrukce, vaskulární poruchy, toxiny, ...

Zvýšená permeabilita membrán, autotrávení

Diagnostika


α -amylasa (45 kDa), pol. Života 9-17 hod v séru (2-7dní \uparrow), snadno filtrovatelná do moči, 50 % se resorbuje zpět

Lipasa, (8-14 dní ↑), filtrovatelná, plně se resorbuje zpět


Tenké střevo (intestinum tenue)

- sliznice – 300 m² (=plocha cca tenisového hřiště)
 - řasy
 - klky
 - mikroklky
 - peristaltika = rytmické vlny kontrakcí hladkého svalstva, které posunují potravu trávicí trubicí

Tenké střevo – vstřebávání




Trávení sacharidů



Trávení proteinů

- Proteiny → enzymatická hydrolyza → AK
- Enzymy:
 - endopeptidas
 - exopeptidas
 - aminopeptidas
 - karboxypeptidas
- Pinocytosa



Trávení tuků


- Emulzifikace žlučovými kyselinami
- enzymy: lipasy, kolipasy & fosfolipasy
- Triacylglyceroly → monoacylglyceroly & volné mastné kyseliny
- Volný cholesterol – přímo absorbovaný, estery cholesterolu, štěpení ChEasou

tlusté střevo (intestinum crassum)

- trubice 1,5 m, průměr 5 – 7 cm
 - dokončení trávení a vstřebávání
 - nemá klky, pouze výdutě
 - netvoří trávící štávy, pouze hlen
 - Primárně vstřebávání vody a elektrolytů ale i vit. K, B12...
 - Žluč. Kyseliny, žluč. Barviva,..

Tekutina v GIT:
(9 l celkově, ~7 l z tkání, ~2 l per orálně)

- Slinné žlázy
 - Pankreas
 - Epitelální buňky GIT
 - Játra
 - Voda
 - Enzymy
 - Mucus
 - Ionty: H^+ , K^+ , Na^+
 HCO_3^- , Cl^-
 - Žluč



Průchod potravy trávicí trubicí

- žaludek 1 – 4 hod
 - tenké střevo 2 – 5 hod
 - tlusté střevo 8 – 12 hod
 - do konečníku se dostává za 18 – 20 hod
i déle

Hormony ovlivňující pocity hladu

- **leptin** – je produkovaný tukovou tkání a snižuje chuť k jídlu. Když tělo vyčerpává tuky, snižuje se i hladina leptinu a chuť k jídlu se zvyšuje
 - **PYY** – je vylučován tenkým střevem po jídle, tlumí chuť k jídlu a působí proti ghrelinu
 - **insulin** – po jídle stoupá hladina cukru v krvi a do krve se vylučuje insulin. Insulin v krvi tlumí chuť k jídlu
 - **ghrelin** – je vylučován žaludkem očekávajícího příjem jídla a způsobuje pocit hladu.

Hormony ovlivňující pocit hladu

- většina těchto hormonů jsou proteiny a dnes jsou již identifikovány desítky genů, které je kódují
 - tyto geny dědíme; obezita je tedy do značné míry problémem dědičnosti
 - dědičnost také odpovídá za to, proč někdo celý život bojuje s nadváhou, zatímco jiný může jít cokoli a nemá s nadváhou problémy

Malabsorpce a její klinické projevy

Tuky	
Mastné kyseliny	Steatorhea
Žlučové kyseliny	průjem
Proteiny	
cukry	Svalová slabost, únava, úbytek hmotnosti
Lepek (gluten)	celiakální sprue
laktosa	Nesnášenlivost mléčných výrobků (intolerance laktosy)
vápník	frakturny
železo	anémie
Vitamin B12, foláty	Megaloblastická anémie
Vitamin D, Ca, Mg	Neurologické projevy, tetanie
Vitamin K	Zvýšená krvácivost