

Metazoa – bazální mnohobuněční „Porifera“


- 2 - 4 vývojové linie spojené do 1 skupiny
- většinou mořští, přisedlí
- ostie, kanálky, spongocel, osculum
- pinakocyty (pinakoderm), choanocyty (choanoderm), mezoglea (mezohyl)
- askon, sykon, leukon




askon



sykon




leukon





„Porifera“

- pohlavní rozmnožování - (larva: PARENCHYMULA, AMFIBLASTULA), gonochoristé – sladkovodní hermafrodité (mořští)
- amfiblastula
- nepohlavní - vnitřní pučení - gemulace (mikroskléry amfidisky), také vnější pučení



amfiblastula parenchymula

video




Hexactinellida - křemití

Mořské druhy, šestičetné jehlice z SiO_2 ,
stmelené sponginem

Euplectella aspergillum - houbovec pletený
„Venušin koš“, hlubinná, Tichý oceán



video



Demospongia - rohovití

- mořské i sladkovodní druhy,
- jen leucon, křemičité 1- nebo 4-osé megaskléry
- různé mikroskléry,
- většinou také sponginová kostra
- jen typ leukon

1. Monaxonida

2. Keratosa

Monaxonida - jednoosí

Sladkovodní, kostru tvoří sponginová vlákna a křemičité jednoosé jehlice

Ephydatia fluviatilis - houbovec říční - povlaky na kamenech a vodních rostlinách, amfidisky

Spongilla lacustris - houbovec rybniční - stojaté vody, mikroskléry

Poterion neptuni - houbovec pohárový



Keratosa

Mořští, jen sponginová kostra

Euspongia officinalis - houbovec mycí, Středozemní moře, síťovitý spongin

Calcispongia - vápenatí

Druhy mělkých moří, **jen zde** vápenité jehlice z CaCO_3 , někdy volné nebo masivní kostra,
všechny 3 typy stavby

Sycon raphanus - houbovec voštinatý


- trojosé jehlice,
- oblast Středozemního moře
- tělní stavba sykon
- věnec jehlic kolem oscula



Eumetazoa

Ctenophora - žebernatky

- mořští, asi 80 druhů
- solitérně, pelagicky, benticky
- bez žahavých buněk
- biradiální symetrie
- 8 podélných řad kmitajících lupínků



Tentaculifera - tykadlovky

Cestus veneris - pásovnice venušina


Nuda - žebrovky

Beroe cucumis - žebrovka vejčitá

video



Cnidaria – žahavci

- mořští, některá Hydrozoa
brackické a sladké vody
- žahavé buňky - cnidocyty
- schopnost regenerace,
symbioza s řasami
- ektoderm, entoderm,
mezoglea
- metageneze (kromě
Anthozoa)
- polyp - medúza
- larva planula
- polyp difúzní NS, medúza
složitější - na obvodu zvonu
- oči, statocysty, rhopalia



Anthozoa - korálnatci

- mořští
- přisedlí, kolonie i solitérní, vytváří korálové útesy
- pouze polyp, vytváří gamety
- bilaterálně symetrická vnitřní stavba
- v láčce žebrovité přepážky - septa
- exoskelet z CaCO_3
- theca - pohárkovitý útvar
- na bázi polypa sklerosepta (součást exoskeletu)
- endoskelet z rohovitého koralínu a vápenitých tělisek
- dlouhá blanitá sarkosepta
- pohlavní rozmnožování - planula →
- nepohlavní - pučení



Octocorallia - osmičetní

8 sarkosept, 8 (nebo násobek) zpeřených chapadel, endoskelet z koralínu a vápenitých destiček

Tubipora musica - varhanitka - kolonie kožovité laločnaté bez skeletu, červená kostra, zelený polyp



Corallium rubrum - větvičkovité či keřovité kolonie, osní skelet červený korál ze Středozemního moře



Pennatula rubra - pérovník - ploché, pružné kolonie, tvar ptačího pera osní polyp kotví v substrátu, dceřinní vyrůstají na postranních větvičkách

video

video

Hexacorallia - šestičetní

6 sarkosept, 6 (nebo násobek) sklerosept, chlapadel více, exoskelet z CaCO_3 ,

Actiniaria - sasanky

Solitérní bez exoskeletu, silná mezoglea využitá jehličkami z kolagenních fibril, nožní terč - posun po podkladu, akoncie - žahavá vlákna

video

Anemonia sulcata - sasanka hnědá
video

Scleractinia - větevníci

Vnější kostra ve tvaru pohárku se sklerosepty, velké kolonie, vápenitý skelet, tropické oblasti, tvorba útesů, *Zooxanthella* v entodermu

Diploria cerebriformis (větevník mozkový), symb. *Zooxantella*



Staurozoa - kalichovky


Přisedlá scyphomedúza
hřbetní stranou k podkladu

Lucernaria tethis

kalichovka

v chladných mořích
cirkumpolárně

Lucernaria quadricornis



Cubozoa - čtyřhranky

Tělo medúz vysoké, vyklenuté, na bázi 4 chapadel
pedália

Chironex fleckeri

(čtyřhranka Fleckerova)


Carybdea marsupialis

(čtyřhranka středomořská)



Scyphozoa - medúzovci

- životní cyklus: planula polyp ektoblastice phyra scyphomedúza
- větší, složitější stavba
- smyslové orgány v ropáliích



Nejčastější scyphomedúzy, chobotovité manubrium se 4 cípy (lov potravy)

Pelagia nocticula - talířovka svítivá

Aurelia aurita - talířovka ušatá


video



Rhizostoma pulmo - kořenoústka plicnatá, mikrofág, chlapadla redukována, funkčně nahrazena složitou stavbou manubria

Hydrozoa - polypovci

- převládá stádium polypa - hydropolyp
- láčka bez sept
- laterálně vznik polypoidních nebo medúzoidních zoidů
- 1/3 má stádium volné medúzy
- hydromedúza má na okraji zvoncovitého těla charakteristický blanitý lem - velum - plachetka



Mořští i sladkovodní, stádium pelagické
medúzy chybí, medúzové stádium je
redukováno na přisedlé gonofory


Aglaophenia pluma



Sladkovodní nebo brakické vody, polyp tvoří frustruly k vegetativnímu rozmnožování.

Craspedacusta sowerbyi - medúzka sladkovodní, zavlečena z Ameriky, skleníky i volná příroda. Jediný sladkovoní druh s metagenezí a pelagickou medúzou.

[video](#)



Sladkovodní bez stádia medúzy, vegetativní r. - pučení, nepříznivé podmínky pohlavní buňky, vajíčko v ootéce.


Hydra vulgaris, *Hydra oligactis*, *Hydra viridissima* - 3 typy buněk - cnidocyty - volvent, glutinant, penetrant

[video](#)



Hydromedúzy: stádium polypa redukované nebo zmizelo

Liriope – bez stádia polypa




Siphonophora - trubýši

Mořští koloniální, plavou na hladině, vznášejí se, polypoidní a medúzoidní polypi na kolmém stvolu, společné orgány, bez medúzy

- pneumatofory
- daktylozoidi
- gastrozoidi
- gonozoidi
- nektofory



Physalia physalis - měchýřovka portugalská – pneumatofor modrý, několik m dlouhá chapadla

Physophora hydrostatica - měchýřovka vznášivá – červené kolonie



video

video




Ectoprocta (= Bryozoa) mechovci

- mořští, sladkovodní, koloniální
- zoidi, bryozoidi
- kolonie buď monomorfní
- nebo polymorfní kolonie (ovicely, avikulárie, vibraculárie)
- vnější a vnitřní pučení (gemulace - statoblasty)
- mezodermální buňky uvnitř, vně chitinózní obal často s háčky
- flotoblasty = obal se vzdušnými komůrkami, plavou
- sesoblasty = obal lepivý bez komůrek




polypid, cystid



Ectoprocta (= Bryozoa) mechovci

- TS: tvar „U“, prvoci, bakterie, detrit, zachycována chapanély, přiháněna řasinkovým epitelem
- VS: jen přes epitel, někdy hnědé těleso
- CS: chybí
- svalovina je diferencována - retraktor lophophoru
- célem vyvinut v cystidech, prstenčí kolem úst s výběžky do chapanélek



Phylactolaemata - mechovky

- lophophor podkovovitý
- tělní stěny mezi zoidy mohou chybět
- monomorfni kolonie, statoblasty, rezistence proti mrazu, vyschnutí
- naše běžné druhy:

Plumatella repens (mechovka plazivá) -

rychlý růst

Plumatella fungosa (mechovka houbovitá)

- jako houba říční



by Masato Hirose



by Masato Hirose

video

Phylactolaemata - mechovky

Cristatella mucedo (mechovka hadovitá) - velké kolonie, statoblasty s háčky (za 24 hod o 10 cm)

Pectinatella magnifica (mechovka americká) - zavlečena ze Severní Ameriky, rosolovitá hmota se štítky na nich zoidi

Fredericella sultana – lophophor spíše kruhovitý




Gymnolaemata - keřnatenky

- polymorfní kolonie
- kruhovitý lophophor
- bez epistomu, bez svaloviny
- hibernákula = zimní pupeny

Paludicella articulata (keřnatenka bahenní) - žije ve sladké i brakické vodě

Bugula - běžný mořský rod



Gnathifera


„Rotifera“ - vířníci



- ◆ sladkovodní, vlhká půda, mech
- ◆ heterofágové – řasy, detrit
- ◆ stavba těla: hlava s vířivým aparátem, trup s orgány, noha s lepivými žlázami
- ◆ na povrchu těla kutikula, krunýřek
- ◆ TS: ústa, mastax, střevo, kloaka, anus
- ◆ VS: protonefridia
- ◆ CS a DS nejsou vytvořeny
- ◆ konstantní počet tělních buněk
- ◆ gonochoristé

■ - Kamptozoa

■ - Gnathifera

■ - Syndermata





- ◆ amiktická samička - diploidní vajíčka
- ◆ heterogonie:
- ◆ miktická samička - haploidní vajíčka
- ◆ samci, páří se samicemi své generace
- ◆ dormantní přezimující vajíčka




Monogononta – točivky

- ◆ zástupci: *Brachionus* – obrněnka, *Keratella* – hrotenka, *Floscularia* (laločenka), *Lecane*, *Plathya* a *Notholca*



Bdelloidea – pijavenky

- sladkovodní i půdní
- cylindricky stažitelné tělo, teleskopicky stažitelné
- zástupce: *Philodina* - pijavenka



Acanthocephala - vrtejši

- ❖ parazité s obligátním střídáním hostitele (obratlovci)
- ❖ vysunovatelný rypáček s háčky proboscis
- ❖ šíjová část obsahuje 2 lemnisky
- ❖ bez trávicí soustavy, příjem potravy osmoticky
- ❖ ganglion + nervová vlákna
- ❖ protonefridie
- ❖ gonochoristé
- ❖ vajíčko - mezihostitel - konečný hostitel



Acanthocephala - vrtejši

- *Acanthocephalus lucii*
- mezihostitel *Asellus aquaticus*
- definitivní hostitel okoun, candát, štika

- *Polymorphus magnus* - vrtejš kachní
- mezihostitel *Gammarus*
- konečný hostitel kachna


- *Macracanthorhynchus hirudinaceus* – vrtejš velký
- mezihostitel – chroust, zlatohlávek
- konečný hostitel prase



Acanthocephala - vrtejši



Acanthocephalus lucii



*Macracanthorhynchus
hirudinaceus*

