

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie – 23.2.2011

Studium buněk v podmírkách *in vitro*

doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta MU




MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky



10 μm

fibroblasty v buněčné kultuře

Program přednášky:


- vývoj kultivací buněk *in vitro*
- podmínky kultivace eukaryontních buněk *in vitro*
- typy kultivací (terminologie)
- vlastnosti normálních a transformovaných buněčných linií
- praktické aplikace
- archivace, sbírková pracoviště

VÝVOJ KULTIVACÍ BUNĚK *IN VITRO*


- 1907: kultivace nervových vláken izolovaných z žabích embryí (Harrison)
- 1912: explantáty kuřecí pojivové tkáně a srdeční svaloviny (Carrel; Burrows)
- 1916: trypsinizace a pasážování (Rous & Jones)
- 1943: stabilizace první buněčné linie - myší fibroblasty: L-cells (Earle et al.)
- 1948: první buněčný klon - L929 (Sanford et al.)
- 1952: stabilizace první lidské linie - karcinom děložního krčku: HeLa (Gey et al.)

1952 - stabilizace první lidské linie HeLa (Gey et al.)


- karcinom děložního krčku
- Henrietta Lacks (1920-1951)
- Johns Hopkins University Hospital (Baltimore, USA)




Linie HeLa:



Linie HeLa:



mikrotubuly (anti-Tu)
mikrofilamenta (phalloidin)
jádra (DAPI)



KULTIVAČNÍ PODMÍNKY

Kultivační podmínky pro savčí a lidské buňky

- co nejpodobnější podmínkám v původním organismu:
 - ✓ teplota 37°C,
 - ✓ maximální vlhkost vzduchu, 5% CO₂
 - ✓ neutrální pH (6,8 až 7,2)
 - ✓ živiny
- sterilní prostředí



Stabilní prostředí pro kultivace

CO₂ inkubátory

- definovaná stabilní teplota (37°C)
- maximální vlhkost vzduchu
- definovaný stabilní obsah CO₂ (5%),
příp. i O₂ (řízená hypoxie)
- vodní nebo vzduchový plášt'
- vnitřní povrch: měď nebo nerez
- připojení tlakových lahví přes redukční ventily



ŽIVNÉ MÉDIUM

Bazální médium

- tekuté nebo práškové
- soli, aminokyseliny, vitamíny, lipidy, zdroj energie, indikátor pH

+ krevní sérum / růstové faktory

Kompletní médium

SLOŽENÍ BAZÁLNÍHO MÉDIA:

Voda pro tkáňové kultury:

- ultrapure type I - resistivita < 18 MΩ/cm
- TOC (total organic carbon) < 10 ppb
(parts per bilion)

Úprava vody pro tkáňové kultury:

- reverzní osmóza
- absorbce na aktivní uhlík
- iontoměniče
- elektrodeionizace
- UV záření

SLOŽENÍ BAZÁLNÍHO MÉDIA:

Vyvážené solné roztoky (BSS, balanced salt solutions):

- udržování pH a osmolality
- udržování membránového potenciálu buněk
- kofaktory enzymů
- tvorba fokálních adhezí (růst na pevném substrátu)
- ionty: Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Cl^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} , HCO_3^-
- stopové prvky: Fe, Zn, Cu, Se ...

Hlavní typy BSS:

- DPBS (Dulbecco's phosphate-buffered saline)
- HBSS (Hank's balanced salt solution)
- EBSS (Earle's balanced salt solution)
- ESSS (Eagle's spinner salt solution)

SLOŽENÍ BAZÁLNÍHO MÉDIA:

Pufrovací systém:

- NaHCO_3 , HEPES (N-2-hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulphonic acid)


Aminokyseliny:

- esenciální, resp. vzácné (člověk, myš): arginin, histidin, isoleucin, leucin, lysin, methionin, fenylalanin, threonin, tryptofan, valin
- *in vivo* syntetizované ve specifických orgánech (játra, resp. ledviny): cystein, glutamin, tyrosin
- lze nahradit hydrolyzátem z proteinů (krátké peptidy)

SLOŽENÍ BAZÁLNÍHO MÉDIA:

- voda
 - anorganické sloučeniny (ionty, stopové prvky)
 - aminokyseliny
-

- vitamíny (zejména skupina B)
- lipidy (esenciální mastné kyseliny, cholesterol...)
- hormony, růstové faktory (inzulín, hydrokortizol)
- glukóza (zdroj energie)
- fenolová červeň (indikátor pH)
- antibiotika (penicilin + streptomycin)



Sérum:

- fetální telecí/hovězí - FCS/FBS, koňské, lidské...
- nedefinovaná směs růstových faktorů a dalších složek
- obsah v médiu 5 - 20% podle typu buněk
- bezsérová média pro speciální aplikace (definovaná směs růstových faktorů - tzv. serum replacement)

Nejdůležitější látky obsažené v séru:

- růstové faktory
- albumin
- transferrin
- anti-proteázy (antitrypsin, macroglobulin)
- attachment factors (fibronectin, laminin, fetuin)

Výhody použití séra:

- směs nejdůležitějších faktorů pro přežívání a proliferaci buněk
- univerzální použití pro kultivaci většiny buněčných typů
- ochrana buněčné kultury před výkyvy prostředí a toxickými vlivy (změny pH, ionty těžkých kovů, endotoxiny, proteolytické enzymy)

Nevýhody použití séra :

- potíže s reprodukovatelností (původ zvířat, krmení, roční doba...)
- riziko kontaminace
- dostupnost a cena
- vliv na produkci proteinů do média

Typy médií pro savčí buňky:

- Eagleovo médium (BME) a jeho modifikace (např. EMEM, AMEM, DMEM, GMEM, JMEM)
- RPMI média
(např. RPMI 1629, RPMI 1630, RPMI 1640)
- další média užívaná se sérem
(např. Fischerovo, Williamsovo)
- média užívaná bez séra
(TC199, MCDB)

Sterilní prostředí

- práce v tzv. laminárních boxech (HEPA filtry)
- typ podle úrovně Biosafety Level (BSL)
- jednorázový plastik
(sterilizováno radiací)
- sterilní sklo, nástroje a roztoky
(horkovzdušná sterilizace, autoklávování)
- antibiotika
(běžně směs Pen/Str, případně gentamycin, amphotericin, nystatin)

BIOSAFETY LEVELS (BSLs)

BSL-1

- mikroorganismy, které nezpůsobují onemocnění u zdravých dospělých; standardizované lidské a živočišné buněčné linie

BSL-2

- běžné patogeny středního rizika, mohou způsobovat různě závažná onemocnění, která lze dobře léčit (HBV, *Salmonella*, *Toxoplasma*, klinický materiál - krev, tělní tekutiny, tkáně; některé sbírkové linie - např. HeLa)

Laminární box - biohazard třída I




horizontální




vertikální

Laminární box - biohazard třída II



HEPA filtry
(částice $> 0,3$ mm)









BIOSAFETY LEVELS (BSLs)

BSL-3

- lokální nebo exotické patogeny vysokého rizika, respiračně přenosné, způsobují závažná a potenciálně letální onemocnění, která jsou obtížně léčitelná
- *Mycobacterium tuberculosis*, virus encefalitidy St. Louis, antrax

BSL-4


- extrémně rizikové patogeny, respiračně přenosné, způsobují letální onemocnění, proti nimž neexistuje léčba ani vakcinace
- hemorragické viry (Ebola, Marburg)


BIOSAFETY LEVEL 3 (BSL-3)



BIOSAFETY LEVEL 4 (BSL-4)









Typy kontaminací




- mykoplazmata
- viry
- bakterie, plísně, kvasinky
- kontaminace jinou buněčnou linií
(cross=contamination)




Kontaminace – mykoplazmata

Detekce mykoplazmat:

- a) fluorescenční mikroskopie
(značení DNA)
- b) PCR



KULTIVAČNÍ POSTUPY



invertovaný mikroskop



Typy buněčných kultur:

- adherované:
rostou přichycené na pevném podkladu
- suspenzní:
rostou volně v médiu

Kultivace na živné vrstvě (feeder-layer):

- obvykle inaktivované myší buňky (fibroblasty, peritoneální makrofágy)
- hybridomy, embryonální kmenové buňky

SUBKULTIVACE (PASÁŽOVÁNÍ)

Suspenzní kultury


- odstranění starého média centrifugací
- naředění buněk v čerstvém médiu
- přenesení do nové kultivační lahvičky s čerstvým médiem

Adherované buňky

- odstranění starého média, oplach v pufu
- uvolnění buněk z podkladu proteolýzou fokálních adhezí (trypsin)
- inaktivace trypsinu přidáním séra
- alternativa: mechanické uvolnění (škrabky)
- centrifugace, naředění buněk v čerstvém médiu
- přenesení do nové kultivační lahvičky s čerstvým médiem



DĚLENÍ BUNĚK V PODMÍNKÁCH *IN VITRO*:



TYPY KULTIVACÍ (TERMINOLOGIE)


TKÁŇOVÉ KULTURY / CELL CULTURES

- orgánová/tkáňová kultura (organ/tissue culture)
trojrozměrná kultura nerozvolněné tkáně, která si uchovává histologické znaky a vlastnosti původní tkáně v prostředí *in vivo*
- buněčná kultura (cell culture)
kultura odvozená z jednotlivých buněk, které už nejsou spojeny do struktury tkáně
- primokultura / primární kultura (primary culture)
buňky v kultuře jsou získány přímo z původní tkáně nebo fragmentu orgánu

primokultura multiformního glioblastomu - 5. den



primokultura multiformního glioblastomu - 12. den



primokultura multiformního glioblastomu - 12. den



Buněčná linie


- populace buněk odvozená z primokultury při první pasáži a dále udržovaná v podmírkách *in vitro*
(pasáž = přenos buněk z jedné kultivační nádobky do nádobky nové)
- diploidní (normální nenádorové buňky)
- stabilizovaná (nádorově transformované buňky)
- charakterizace buněčné linie:
označení (název), druh organisma, pohlaví, věk, výchozí orgán, typ kultury, počet pasáží, růstové parametry, morfologie, karyotyp, markery


Buněčný kmen

- buněčná populace, získaná subkultivací z původní linie - vyselektována na základě exprese určitého znaku

Buněčný klon

- buněčná populace, vzniklá pomnožením jediné buňky, izolované z původní linie
- všechny buňky v buněčném klonu teoreticky identické, avšak v praxi určitý stupeň heterogenity







NORMÁLNÍ A TRANSFORMOVANÉ BUNĚČNÉ LINIE

Růstové parametry buněčných linií:

- generační doba
období mezi dvěma mitózami = délka buněčného cyklu
- population doubling time (PDT)
čas, potřebný ke zdvojnásobení počtu buněk v populaci
- lifespan (délka života)
geneticky naprogramovaný počet dělení buňky
- kontaktní inhibice
zástava proliferace po dosažení určité limitní saturační density






Diploidní buněčné linie:

- normální nenádorové buňky
- omezená délka života *in vitro*
- standardní karyotyp (diploidní)
- obvykle anchorage-dependent (vyžadují substrát k přichycení)
- schopnost kontaktní inhibice
- tzv. „stárnutí kultury“ = změna morfologie a růstových parametrů se vzrůstající dobou v podmínkách *in vitro*
- LEP (lidské embryonální plíce)
HPLC (lidské lymfocyty periferní krve)

Stabilizované buněčné linie:

- nádorově transformované buňky
- neomezený generační potenciál = nesmrtelnost v podmírkách *in vitro*
- kratší PDT, redukovaná závislost na podkladu
- obvykle heteroploidní, resp. aneuploidní
- často bez schopnosti kontaktní inhibice
- lidské adherované: HeLa, A431, MCF-7...
lidské suspenzní: HL-60, Jurkat, HeLa-S...
L929, 3T3 (myší fibroblasty),
CHO (chinese hamster ovary)
MDCK (Madine-Darby canine kidney)
VERO (African green monkey kidney)

Rozdíl v počtu chromosomů během kultivace






normální buňky
(gliové buňky)


transformované buňky
(maligní melanom)

PRAKTICKÉ APLIKACE

- základní výzkum (buněčná biologie, cytogenetika, onkologie, imunologie, biochemie, molekulární biologie, virologie...)
- prenatální diagnostika
- toxikologie (testy léčiv, kosmetických přípravků, implantátů)
- reprodukční medicína (IVF)
- klinická onkologie (typizace nádorů, testování multidrug resistance, hodnocení markerů)
- výroba očkovacích látek (virové vakcíny)
- průmyslová výroba specifických buněčných produktů (transgenní linie)
- příprava buněčných a tkáňových derivátů (např. kůže)




Culture of Specialized Cells
CULTURE OF HUMAN TUMOR CELLS




Edited by
Roswitha Pfragner
R. Ian Freshney

Culture of Specialized Cells
CULTURE OF HEMATOPOIETIC CELLS



Editors
R. Ian Freshney
Ian B. Pragnell
Mary G. Freshney

Culture of Specialized Cells
CULTURE OF EPITHELIAL CELLS
SECOND EDITION




Edited by
R. Ian Freshney
and Mary G. Freshney

KRYOKONZERVACE, ARCHIVACE, SBÍRKOVÁ PRACOVIŠTĚ


Kryokonzervace živočišných buněk

- kultura v exponenciální fázi růstu
- po trypsinizaci resuspendování v zamražovací směsi:
90% sérum (FCS) + 10% kryoprotektivum (DMSO, glycerol)
- dvoustupňové zamražování:
„pomalý krok“ (optimální pokles o 1°C za minutu)
„rychlý krok“ (přemístění kryoampulí z -80°C do -150°C (hlubokomrazící boxy) nebo do -196°C (kontejnery s tekutým dusíkem))
- rozmražování:
nejprve rychlé ohřátí (rozmražení směsi), pak pomalé přidávání vychlazeného média (cca 1ml za minutu)


Příklady kryoprotektiv:




**dimethylsulfoxid
(DMSO)**



glycerol





American Type Culture Collection (ATCC)

LGC Standards
Excellence through measurement

Search Catalogue:
Catalogue Keyword Search
[Search Options](#)

[Home](#) | [Quick Order](#) | [Shopping Cart](#) | [Contact Us](#)

[About the ATCC-LGC Standards Partnership](#)

[LGC Standards Offices](#)

[How to Order](#)

[Special Forms](#)

ATCC Cultures and Products > [Cell Biology](#) > [Cell Lines and Hybridomas](#)
> [Microbiology](#) > [Stem Cell Products](#)
> [Molecular Biology](#) > [Media, Seria and Reagents](#)
> [Tissue Biology](#) > [Kits/ Panels](#)
> [Special Collections](#) > [DNA and RNA](#)
> [STR Profile Database](#)

ATCC Science >

ATCC Standards >

ATCC Deposit Services >

ATCC Custom Services >

ATCC Product Use Policy >

Technical Support >

Cell Biology

Culturing and preserving cells since 1962

ATCC was entrusted with its first cell line in 1962 and has consistently attained the highest standards and used the most reliable procedures to verify every cell line since.

that cell line integrity is critical for maintaining or standardized cell culture quality, including (ation), as a condition for receipt of grant funds well as for publication of research using

The comprehensive [HTERT Immortalized Cell Lines](#) standards are costly, time-consuming and require a high level of expertise. For years, scientists worldwide have relied on ATCC to provide fully authenticated and contamination-free biological reagents as a cost-effective and reliable option.

Discover why comprehensive testing at ATCC is important to your work.

European Collection of Cell Cultures (ECACC)

The screenshot shows the homepage of the European Collection of Cell Cultures (ECACC) website. At the top, there is a banner for the Health Protection Agency (HPA) with the tagline "Protecting people, Preventing harm, Preparing for threats". The main navigation menu includes Home, Products, Services, Technical, Ordering, About Us, Contact Us, and HPA website. On the right side, there are links for Register, View Cart, Log on, and Help, along with icons for a user profile, a shopping cart, and a lock.

The main content area features a large image of a petri dish containing a cell culture. Below the image, the text "Health Protection Agency Culture Collections" is displayed. To the right of the image is a search bar labeled "Quick Search" with a magnifying glass icon. A message "You are not logged on." is shown in orange text.

The breadcrumb navigation "You are here: ▶ Home ▶ Collections" is located below the main menu. On the left, there is a sidebar with a "Menu" section containing links to About Us - HPA Culture Collections, Products, Services, How to Order, Technical Support, Glossary, and Forms. Below this is a "Products" section listing Bacteria, Plasmids, Mycoplasmas; Cell Lines and Hybridomas; Primary Cells & Media; HepaRG® Cells; SCREENflex™ GPCR Cell Lines; DNA; Fungi; LENTICULE Discs; and Viruses. There is also a "Services" section.

The central content area has a blue header "European Collection of Cell Cultures (ECACC)". Below it, a welcome message says "Welcome to the European Collection of Cell Cultures (ECACC), a Health Protection Agency Culture Collection." It also includes a link to "About ECACC". A note states "We've made some changes which mean that now, the fastest way to order from us is online".

On the right, the ECACC logo is shown, featuring a stylized blue "E" and "C" followed by the text "ECACC European Collection of Cell Cultures A Health Protection Agency Culture Collection".

Below the central content, there is a promotional banner for a new edition of the "Fundamental Techniques in Cell Culture Laboratory Handbook". The banner features a green and blue design with the text "New Edition Out Now Fundamental Techniques in Cell Culture Laboratory Handbook".

IT LOOKS LIKE YOUR
CELL-CULTURE MIGHT
HAVE GONE BAD.



YEAH - I THINK YOU'RE
RIGHT ... THIS LATEST TRIAL
WON'T HAVE ANY VALIDITY.



HEY BUDDY!! WHAT ARE YOU
INSINUATING HERE!??
CELL-CULTURE HAS JUST AS
MUCH VALIDITY AS ANY
OTHER FORM OF CULTURE!!!

