

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie – 30.3.2011

Asistovaná reprodukce živočichů a klonování

doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta MU



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Sexing

technologies

Because Your Business Begins at Conception

home history process semen collection in vitro fertilization embryo collection sales economic aids links contact testimonials



search



Testimonials


"If you run the economics of using semen, particularly in flushing, you make a whole lot more money using sexed semen than conventional semen.

I've done 5 flushes now, and I would not use conventional semen for flushes if I had Sexed Semen available from a variety of bulls.

Conception rates on embryos are as good as they are with regular semen."

- Jack A. Dutton -Dutton Simmentals

Sorting Process



1. A piezo electric crystal is undulated approximately 90,000 times/second, which breaks the stream into droplets at a particular point in time. The location of the last-attached droplet in the stream is highly controllable.

2. An X- or Y-bearing sperm is compared to a preset sort criteria.

3. After a time delay, the insertion rod is charged.

4. A charge is applied at the time of insertion.

Bulls

Beef Cattle Bulls

- [Gray Brahman](#)
- [Red Brahman](#)
- [Angus](#)
- [Red Angus](#)
- [Red Brangus](#)
- [Simmental](#)
- [Braunvieh](#)
- [Beefmaster-Hereford-Wagyu](#)
- [Gyr-Guzerat-Bucking](#)
- [AI Recommendations Beef](#)

Program přednášky:


- asistovaná reprodukce u živočichů
přehled a praktické aplikace
- klonování živočichů
partenogeneze
splitting techniky
klonování pomocí tvorby chimér
metoda transferu jader (SCNT)
tvorba cybridů

ASISTOVANÁ REPRODUKCE U ŽIVOČICHŮ

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2011 - 06 / 30.3.

Inseminace u hospodářských zvířat:

- možnost kryokonzervace spermíí (40. léta 20. stol.)
- minimalizace počtu chovných býků
- experimenty s transplantací spermatogonií: umělá produkce vynikajících plemeníků
- třídění spermíí → (uplatnění v cíleném chovu skotu na mléko nebo na maso)
úspěšnost ~90%



Asistovaná reprodukce u hospodářských zvířat:


- hormonální stimulace → superovulace → inseminace → výplach embryí → transfer embryí (ET) / kryokonzervace embryí
- úspěšnost: 60-75% po transferu čerstvých embryí
35-45% po kryoembryotransferu

Ryuzo Yanagimachi (1998)

- experimenty s lyofilizací spermií
- nutnost ICSI



In vitro fertilizace u hospodářských zvířat:



Obchodování s embryi skotu



- rychlé zkvalitnění chovu zvířat (aukce embryí)
- superovulace , inseminace , výplach embryí
(od 1 krávy 5-6 embryí, max. kolem 20)
- produkce embryí pomocí IVF
(odběr oocytů z těl krav na jatkách nebo živých zvířat - opakovaně i během březosti)

Problémy u ostatních hospodářských zvířat:

- ovce, kozy - neekonomické
- prasata - problémy s polyspermií při IVF
- koně - nutnost ICSI

Teruhiko Wakayama a Ryuzo Yanagimachi (1998)


- vytváření funkčních oocytů transferem jádra z pólocytu u myší (úspěšnost metody 30-57%)




Snaha získat potomstvo od zvířat v co nejnižším věku

- hormonální stimulace nedospělých zvířat
(jehničky: 6 týdnů, jalovice: 2-6 měsíců)
- odběr oocytů z nenariozených samičích plodů

John Eppig (Jackson Lab)



živé potomstvo z primordiálních
oocytů kompletně kultivovaných in
vitro
(myšák Egbert)



KLONOVÁNÍ ŽIVOČICHŮ

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2011 - 06 / 30.3.

Metody klonování živočichů

- partenogeneze
- splitting techniky
- tvorba chimér
- přenos jádra somatické buňky
(SCNT, Somatic Cell Nucleus Transfer)

- vnitrodruhové klonování
- mezidruhové klonování = tvorba cybridů
 (= cytoplazmatických hybridů)

(1) PARTENOGENEZE


- přirozeně u bezobratlých (hmyz) i obratlovců (ještěrky, hadi, ryby, obojživelníci)

Savci - aktivace partenogeneze *in vitro*:

- myš (forelimb bud stage), ovce, kráva, prase, králík (11 dní), opice, primáti (implantační stádium)
- poruchy v regulaci diferenciace (extraembryonální tkáně a mesoderm) – genetický imprinting
- životaschopné myši (partenoti) – rekonstruovaná embrya ze dvou maternálních genomů
(Kono et al., Nature 428, 860-864, 2004)

Partenogeneze u člověka



- spontánně *in vivo* u některých typů germinálních tumorů (teratomy ovaríí)
- partenogenetický chimerismus u pacientů s vývojovými nebo sexuálními poruchami
- indukovaná partenogeneze *in vitro* (stádium blastocysty: 5-6 dní vývoje)




Cibelli et al., 2001

(2) SPLITTING TECHNIKY

- rozdělení embrya během časných stádií vývoje mikromanipulačními technikami
- 1892 – Hans Driesch (mořská ježovka)
1902 – Hans Spemann (žába)
- praktické aplikace v chovu skotu (v kombinaci s dalšími metodami AR)
- úspěšnost při dělení na max. 4 části





Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2011 - 06 / 30.3.


2000 - Gerald Schatten


- klonování makaka splitting technikou
- rozdělení embrya na 4 části:
1 živé mládě - samička Tetra



(3) KLONOVÁNÍ METODOU TVORBY CHIMÉR

- fúze embryonálních kmenových buněk = ESCs (somatické buňky) s tetraploidním embryem:
tetraploidní buňky → trofoblast
diploidní ESCs → embryoblast
- Janet Rossant et al. (PNAS 1993): klony myší







Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2011 - 06 / 30.3.

(4) PŘENOS JÁDRA SOMATICKÉ BUŇKY (SCNT)

- jádro somatické buňky vneseno do enukleovaného oocytu:
 - a) elektrofúze
 - b) intracytoplazmatická injekce diploidního jádra






tzv. dvojitá metoda klonování

- 50.léta 20.stol.:
experimenty na obojživelnících
- později SCNT embryonální buňky savců
- Dolly: poprvé SCNT buňky dospělého savce
(Ian Wilmut et al. 1997, Roslin Institute, UK)
- dosud naklonováno 14 druhů savců:
ovce, myš, kráva, koza, prase, muflon, mula,
kůň, kočka, králík, potkan, pes, vlk, velbloud
- neúspěch při klonování primátů
(poruchy mitotického aparátu v důsledku
enukleace)



1952 – SCNT u obojživelníků (žáby)



Robert Briggs (A ; 1911-1983)
Thomas J. King (B ; 1921-2000)

VOL. 38, 1952

ZOOLOGY: BRIGGS AND KING

455

² Steinbach, H. B., *Am. J. Physiol.*, **167**, 284 (1951).

³ Lorente de Nò, R., *J. Cell. & Comp. Physiol.*, **33**, suppl. (1949).

⁴ Tobias, J. M., *Ibid.*, **36**, 1 (1950).

⁵ Levi, H., and Ussing, H. H., *Acta Physiol. Scand.*, **16**, 232 (1948).


*TRANSPLANTATION OF LIVING NUCLEI FROM BLASTULA
CELLS INTO ENUCLEATED FROGS' EGGS**

BY ROBERT BRIGGS AND THOMAS J. KING


INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH AND LANKENAU HOSPITAL RESEARCH INSTITUTE,
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA

Communicated by C. W. Metz, March 15, 1952

Introduction.—The role of the nucleus in embryonic differentiation has been the subject of investigations dating back to the beginnings of experimental embryology. At first it was supposed by Roux, Weismann and others that differentiation is the result of qualitative nuclear divisions,



1970: John Gurdon




Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2011 - 06 / 30.3.

1984 (1986) – Steen Willadsen

- poprvé klonování ovcí metodou SCNT
- jádro z buněk rýhujícího se embrya, enukleovaný oocyt





Dolly
1996 - 2003

Bonnie



Dolly

The Maternal Nucleolus Is Essential for Early Embryonic Development in Mammals

Sugako Ogushi,^{1,2,3*} Chiara Palmieri,⁵ Helena Fulka,^{3,4} Mitinori Saitou,² Takashi Miyano,¹ Josef Fulka Jr.³



With fertilization, the paternal and maternal contributions to the zygote are not equal. The oocyte and spermatozoon are equipped with complementary arsenals of cellular structures and molecules necessary for the creation of a developmentally competent embryo. We show that the nucleolus is exclusively of maternal origin. The maternal nucleolus is not necessary for oocyte maturation; however, it is necessary for the formation of pronuclear nucleoli after fertilization or parthenogenetic activation and is essential for further embryonic development. In addition, the nucleolus in the embryo produced by somatic cell nuclear transfer originates from the oocyte, demonstrating that the maternal nucleolus supports successful embryonic development.

www.sciencemag.org SCIENCE VOL 319 1 FEBRUARY 2008

613



1998, Japonsko (Ishikawa):

- 2 klonovaná telata
- „Roslin method“, druhé klonování dospělého savce



1998, USA (Honolulu, Hawaï):

- myšák Fibro
- první samčí klon (fibroblasty ze špičky ocásku dospělého samce)



Ryuzo Yanagimachi
Teruhiko Wakayama

2000, USA (Virginia) – PPL Therapeutics:

- 5 klonovaných selat
- modifikovaná metoda (tzv. dvojitá)



2001, USA (Texas):

- kočka Cc (Copy cat, Carbon copy)
- „Roslin method“



2003, USA (University of Idaho):


- mula – hřebeček Idaho Gem
- fetální fibroblasty muly, enukleované oocyty koně



2005, Korea (Seoul National University):

- štěně SNUPPY (= Seoul National University Puppy)






Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2011 - 06 / 30.3.



2008 - první komerční klonování zvířat

- RNL Bio (South Korea) - zaváděcí cena 50 000 USD
- pitbull Booger → 5 klonovaných štěňat



Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2011 - 06 / 30.3.



2008 – myš klonovaná z buňky mrtvé myši, která byla zamražena 16 let při teplotě -20°C

- Wakayama et al. 2008, PNAS
- metoda: ntESCs + tetraploidní embryo

2009, Spojené arabské emiráty:
• velbloudice Injaz



2009, Jižní Korea: Ruppy (Ruby Puppy)


První klonovaný transgenní pes na světě:


- příprava transgenní linie psích fibroblastů (gen pro RFP z mořské sasanky)
- reprodukční klonování s využitím této linie (SCNT)



2009, Jižní Korea:

- štěně Ruppy (Ruby Puppy)





Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2011 - 06 / 30.3.

Table 1. Summary of cloned dog production.

| Cloned dogs (breed) | Donor cells (age) | Delivery | Abortion or neonatal death |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Two male dogs (Afghan hound) | Adult ear fibroblasts (3-year) | Caesarean section | One neonatal death |
| Three female dogs (Afghan hound) | Adult ear fibroblasts (2-month) | Caesarean section | — |
| Two female wolves (Grey wolf) | Adult ear fibroblasts (1-year) | Caesarean section | — |
| A small breed dog (Toy poodle) | Adult ear fibroblasts (14-year) | Caesarean section | One absorption Two still birth and |
| Three male wolves (Gray wolf) | Post-mortem adult ear fibroblasts (3-year) | Caesarean section | One neonatal death |
| Two female dogs (Beagle) | Fetal fibroblasts (28 day after pregnancy) | Natural delivery | — |
| Four male dogs (Beagle) | Adult fibroblasts (1-year) | Natural delivery/caesarean section | One dead pup |
| Three male and one female (Golden retriever) | Adult fibroblasts (2-year: male, 6-year: female) | NA* | One dead pup |
| Seven male dogs (Labrador retriever) | Adult ear fibroblasts (7-year) | Caesarean section/natural delivery | Three dead pups One fetal death |

Jang G, Kim MK, Lee BC:
 Current status and applications of somatic cell nuclear transfer in dogs.
 Theriogenology 74: 1311-1320, 2010

Klonování metodou tvorby cybridů


Cybrid (cytoplazmatický hybrid)

- organismus / embryo vznikající vnesením jádra somatické buňky jednoho živočišného druhu do enukleovaného oocytu jiného druhu (SCNT)
- 2000 – muflon (→ ovce), gaur (→ kráva)

září 2007: v UK povoleno experimentování s cybridy


- vkládání jádra lidské somatické buňky do zvířecího enukleovaného oocytu (kráva, králík)
- cílem izolace hESCs
- cybridy budou udržovány max. 14 dní *in vitro*

Postup při tvorbě cybridů




Klonování metodou tvorby cybridů

- plejtvák sejval (*Balaenoptera borealis*) → prase
- krysa → prase
- makak → kráva
- šimpanz → kráva
- panda červená (*Ailurus fulgens*) → králík



- člověk → kráva, králík, koza



CLONING

Results may vary