

# Mineralogie I


**Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.**

## **Mineralogický systém - silikáty**

**Osnova přednášky:**


- 1. Inosilikáty - amfiboly**
- 2. Fylosilikáty**
- 3. Shrnutí**

# Úvod - silikáty



Obr. 9.2: Způsob vazby tetraedrů ve strukturách:

- nesosilikáty (tetraedry jsou uloženy samostatně),
- sorosilikáty (tetraedry se vážou po dvojicích),
- cyklosilikáty (tetraedry se vážou do kruhů),
- inosilikáty (tetraedry se vážou do "nekonečných" řetězců),
- fylosilikáty (tetraedry se vážou do "nekonečných" roviných sítí),
- tektosilikáty (tetraedry se vážou do "nekonečné" prostorové sítě).



# 1. Inosilikáty - Skupina amfibolů

- obecný vzorec:  $AB_2C_5T_8O_{22} (OH,F)_2$

A = Na,Ca, vakance

B = Ca, Mg

C = Mg,  $Fe^{2+}$ , Al,  $Fe^{3+}$

T = Si, Al

rombické

antofylit




monoklinické

tremolit



aktinolit




obecný amfibol



Mg je často nahrazeno  $Fe^{2+}$ . Jako vedlejší prvky jsou přítomny Mn, Li, Ti, Cl.



Dnes je známo asi 60 amfibolů.



- Mísetelnost mezi jednotlivými amfiboly je velká.  
Závisí i na PT podmírkách.

# 1. Inosilikáty - Skupina amfibolů

obecný vzorec:  $AB_2C_5T_8O_{22}(\text{OH},\text{F})_2$




# 1. Inosilikáty - Skupina amfibolů

- **Vlastnosti:**  
barva kolísá podle chemického složení  
**Amfiboly chudé Fe (tremolit)**  
bezbarvý, bílý, šedý, žlutý, hnědý  
**Amfiboly bohaté Fe (aktinolit, amfibol)**  
tmavě zelený až černý  
 $t = 5-6$ ,  $h = 3-3,5$ , štěpnost výborná,  $120^\circ$   
**Amfiboly jsou velmi často pleochroické a mnohem výrazněji než pyroxeny.**
- Často tvoří stébelnaté, jehlicovité až vláknité agregáty, štěpnost amfibolů je viditelně dokonalejší než u pyroxenů.
- Amfiboly jsou středně odolné alteracím a zvětrávání, často jsou zatlačovány slídami, chlority.
- Výskyty magmatické a metamorfované horniny kůry, většinou chudé  $\text{SiO}_2$ .  
V plášti se vyskytuje jen zcela výjimečně.
- **Využití:** chemické složení amfibolů je indikátorem PT podmínek vzniku a složení mateřských hornin.



**Amfibol čedičový**



**Amfibol, Vlastějovice**

# 1. Inosilikáty - Skupina amfibolů



Tremolit



Antofyllit, Heřmanov



Amfibol

# 1. Inosilikáty - Skupina amfibolů





Tremolit, Olešnice



Aktinolit, Sobotín

# 1. Inosilikáty - Skupina amfibolu

**Vztah štěpnosti a krystalové struktury u pyroxenů a amfibolů.**



Obr. 9.4.2: Štěpnost pyroxenů (A) a amfibolů (B). Na obr. a) je schematické znázornění struktur s vyznačeným průběhem štěpnosti mezi řetězci, na obr. b) jsou průřezy krystalů s naznačenými štěpnými plochami a úhly mezi nimi. Projekce ve všech případech na (001) (řetězce probíhají kolmo k nákresně)

**Amfibol ve výbruse**

## 2. Fylosilikáty

**Velmi významná skupina silikátů, kde jsou tetraedry  $\text{SiO}_4$  propojeny třemi vrcholy do nekonečných rovinných sítí s hexagonální nebo pseudohexagonální symetrií. Periodicky se opakuje motiv  $\text{Si}_4\text{O}_{10}^{4-}$  resp.  $(\text{Si}_3\text{Al})\text{O}_{10}^{-3}$ . Tyto sítě jsou různě kombinovány s vrstvami oktaedrů a vytvářejí velké množství fylosilikátů typicky s výbornou štěpností podle báze 001.**

**Hlavní skupiny:**

- **Skupina slíd**
- **Skupina kaolinitu a serpentinu**
- **Skupina chloritů**
- **Skupina smektitů**

**Tzv. Jílové minerály, často řazené jako samostatná skupina fylosilikátů, zahrnují minerály s velikostí částic pod 0,01 mm a patří k nim zejména fylosilikáty ze všech vyčleněných skupin, ale také jiné minerály (např. hydroxidy, zeolity).**

## 2. Fylosilikáty

- Ve fylosilikátech se vyskytují dva typy střídání vrstev:

### dvojvrstevné struktury (vzácnější)

- tetraedrická + oktaedrická vrstva, spojené dohromady společně sdílenými kyslíky

Příklady:

kaolinit a serpentin


### trojvrstevné struktury (častější)

- vrstva oktaedrů, sevřená mezi dvěma vrstvami tetraedrů  $\text{SiO}_4$

Příklady:

slídy (muskovit, biotit), chlority, smekty

## 2. Fylosilikáty



## 2. Fylosilikáty

- Dvojvrstevné a trojvrstevné struktury jsou na základě valence kationtů uvnitř oktaedrické vrstvy dále děleny :
  - vrstvy s dvojvaznými kationty (Mg, Fe) se označují jako trioktaedrické, kationty v oktaedrické vrstvě obsazují všechny oktaedrické pozice  
tzv. brucitová vrstva – Mg (OH)<sub>2</sub>  
Příklad biotit (annit) K **Fe<sub>3</sub>** **Al** Si<sub>3</sub> O<sub>10</sub> (OH)<sub>2</sub>
  - vrstva s trojvaznými kationty (Al) je označena jako dioktaedrická, jsou obsazeny jen 2 ze 3 oktaedrických pozic (třetí je vakantní)  
tzv. gibbsitová vrstva – Al (OH)<sub>3</sub>  
Příklad muskovit K **Al<sub>2</sub>** **Al** Si<sub>3</sub> O<sub>10</sub> (OH)<sub>2</sub>

## 2. Fylosilikáty – skupina slíd

• Obecný vzorec I  $M_3 T_4 O_{10} (OH,F)_2$

I = K, Na, Ca

M = Li,  $Fe^{2+}$ , Mg, Al,  $Fe^{3+}$

T = Si, Al

Vedlejší prvky: Ba, B, Mn, Zn

Nejdůležitější slídy:

Muskovit  $K Al_2 (Si_3Al) O_{10} (OH)_2$

Illit  $K_{0,7} Al_2 (Si_3Al) O_{10} (OH)_2$

Annit  $K Fe_3 (Si_3Al) O_{10} (OH,F)_2$

Flogopit  $K Mg_3 (Si_3Al) O_{10} (OH,F)_2$

Biotit – termín běžně používaný v petrologii pro tmavé slídy složením mezi annitem a flogopitem

Sericit – jemnozrnná slída blízká muskovitu vznikající alterací




Lepidolit - Li-slídy (trilithionit, polylithionit, cinvaldit)

Margarit  $CaAl_2 Al_2 Si_2 O_{10} (OH)_2$  – křehká slída

Slídy jsou většinou monoklinické

• Typické substituce: Mn- $Fe^{2+}$ -Mg, Al- $Fe^{3+}$ , Si-Al, K-Na

• Mísetelnost mezi jednotlivými členy skupiny slíd je různá, závisí podmínkách.



illite

## 2. Fylosilikáty – skupina slíd

### Vlastnosti:

**Barva:** kolísá u jednotlivých slíd.

**Muskovit** – světlý, bezbarvý, nazelenalý

**Annit** - černý

**Flogopit** – světle hnědý

**Biotit** – černý až hnědý


**Lepidolit** – světle fialový, bezbarvý

**Výtečně štěpné podle 001, lupínky jsou pružné**

**T = 2,5-4,5, h = 2,7-3,3.**



**Muskovit, Bobrůvka**



### Výskyt:

**Typické horninotvorné a velmi rozšířené minerály magmatických a metamorfovaných hornin (muskovit, biotit), ale objevují se běžně také v sedimentárních horninách (illit). Li-slídy pocházejí z pegmatitů a greisenů. Slídy vznikají ve velmi širokém rozsahu teplot a tlaků, výjimečně od podmínek zemského pláště (flogopit) až po vulkanické horniny (biotit) a diagenezi (illit).**

## 2. Fylosilikáty – skupina slíd



Flogopit

Slídy jsou různě odolné vůči zvětrávání a hydrotermálním alteracím, ale zároveň bývají produktem těchto hydrotermálních alterací, např. muskovit zatlačuje andalusit aj. V sedimentárních horninách jsou stabilní muskovit a hlavně illit, zcela nestabilní je naopak biotit.



Lepidolit

Využití: chemické složení slíd je výborným indikátorem PT podmínek vzniku a také chemického složení mateřské horniny. Slídy mohou být i zdrojem některých vzácných prvků (Li,Cs).

## 2. Fylosilikáty – skupina slíd



Zinnwaldit, Cínovec



## 2. Fylosilikáty – skupina chloritů

obecný vzorec:  $A_{6-8} Z_4 O_{10} (OH, O)_8$

$A = Al, Fe^{2+}, Fe^{3+}, Li, Mg$

$Z = Si, Al, B$

vedlejší prvky Mn, Ni, Cr

Hlavní minerály

klinochlor  $(Mg_5 Al) Si_3 Al O_{10} (OH)_8$

chamosit  $(Fe^{2+}_5 Al) Si_3 Al O_{10} (OH)_8$

monoklinické a triklinické


Vlastnosti: Barva kolísá u jednotlivých chloritů, nejčastěji zelená s různými odstíny, výtečně štěpné podle 001, lupínky jsou křehké,  $T = 2,5-3,5$ ,  $h = 2,6-3,2$ .

Výskyt: Chlority se vyskytují v metamorfovaných horninách nízkého stupně až v sedimentárních horninách a na hydrotermálních žilách různého původu. Chlority nejsou odolné vůči zvětrávání a hydrotermálním alteracím a často jsou produktem těchto alterací, např. chloritizace biotitu.

## 2. Fylosilikáty – skupina chloritů



Chamosit



## 2. Fylosilikáty – skupina kaolinitu a serpentinu

obecný vzorec  $M_{6-4} Z_4 O_{10} (OH)_8 \cdot nH_2O$

$M = Al, Fe^{2+}, Fe^{3+}, Mg$ , vakance

$Z = Si, Al, Fe^{3+}$

kaolinit, dickit, nakrit



serpentiny blízké vzorci



antigorit - lupenitý

serpentin

chryzotil - vláknitý

Většinou monoklinické, méně rombické a triklinické.

**Vlastnosti:** Barva kolísá - kaolinit bílý, serpentin zelený s různými odstíny,  $T = 1-3,5$ ,  $h = 2,6-3,2$ . Výtečně štěpné.

**Výskyt:** vznikají přeměnou živců (kaolin) nebo olivínu (serpentin) v ultrabazických horninách při hydrotermálních alteracích nebo až v podmínkách zvětrávání (kaolin).

**Využití:** důležité keramické suroviny, indikátory alterací a zvětrávání.



Serpentin



Kaolinit

## 2. Fylosilikáty – skupina smektitů

Velmi důležitá skupina minerálů, které tvoří podstatnou část tzv. jílových minerálů. Jejich struktura podobná slídám.

Nejdůležitější minerály:

montmorillonit



nontronit




Bentonit – jílovitá hornina s vysokým obsahem smektitů.

Vlastnosti: barva většinou světlá s různými odstíny, nontronit je zelenožlutý, jemnozrnné, T = 1-2, H = 1,7-2,7 podle složení. Typickým znakem je schopnost vázat (absorbovat) do struktury různé látky.

Výskyt. Vznikají větráním nebo nízkoteplotní hydrotermální alterací různých hornin


Využití: velmi důležité keramické suroviny a látky schopné absorbovat.




Bentonit

## 2. Fylosilikáty – skupina smektitů


### Příklady jílových minerálů



Illit



Kaolinit



## 2. Fylosilikáty – další minerály

Mastek                     $\text{Mg}_3\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$   
Pyrofylit                 $\text{Al}_2\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$   
Monoklinické  
Strukturně jsou blízké slídám

### Vlastnosti:

světlé zbarvení (bílé, nažloutlé, nazelenalé), výtečně štěpné podle 001, T = 1-2, H = 2,8

Jemnozrnné agregáty, vzácně radiálně paprsčité (pyrofylit)

**Výskyt:** Hojné fylosilikáty vznikající během nízkého stupně metamorfózy, při nízkoteplotních hydrotermálních alteracích a také při zvětrávání. Zvětrávání jsou částečně odolné.

**Využití:** důležité suroviny.



Mastek



Pyrofylit

### **3. Shrnutí**

- 1.** Tato přednáška zahrnuje jen základní přehled hlavních minerálů ze skupiny inosilikátů (amfiboly) a fylosilikátů, ve skutečnosti je v těchto skupinách několik set minerálů.
- 2.** Minerály skupiny amfinolu mají poměrně vysokou tvrdost 5-6, hustota kolísá, většinou je větší než 3. Většina minerálů ze skupiny fylosilikátů má výtečnou štěpnost, naopak u inosilikátů je štěpnost dobrá až výborná.
- 3.** Barva kolísá podle obsahu Fe (Mn), minerály s výraznou převahou Mg nad Fe (Mn) jsou bezbarvé, světle žluté nebo světle zelené, minerály bez Mg a Fe mají různé ale většinou světlé barvy. Minerály s vysokým obsahem Fe jsou tmavé – černé, červenofialové nebo hnědé.
- 4.** Minerály s vysokým obsahem Fe mají také výrazný pleochroismus.
- 5.** Všechny minerály skupiny amfibolu obsahují  $H_2O$ , ale jen malé množství, fylosilikáty obsahují střední až vysoké množství  $H_2O$ .
- 6.** Většina minerálů skupiny amfibolu a také ze skupiny slíd vzniká za relativně vyšších teplot a tlaků v magmatických a metamorfovaných horninách. Cást slíd a většina dalších fylosilikátů vzniká za velmi nízkých teplot v povrchových částech zemské kůry nebo dokonce alterací a zvětráváním jiných minerálů.
- 7.** Jen u malé části minerálů je nutné znát chemické vzorce (tremolit, muskovit, biotit). Je ale nutné znát hlavní prvky jednotlivých minerálů).