



# Systém a evoluce obratlovců

## XI. Aves



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## XI. Aves

Původ: bipední theropodní plazi s prodlouženou přední končetinou a 3 prstou nohou

3prstá stopa theropoda i u Červeného Kostelce (HK) - 90. léta 20. st.



## Maniraptora (†)

prodloužené přední končetiny, opeření, **furcula**, **p. uncinati**, **crista sterni** (apomorfie ptáků!!!)

Vznik aktivního letu (ptáci) - prvotní stimul potrava ve vzduchu (hmyz):


- 1) Arboreální teorie (arboreal theory) - skoky z větve na větev, klouzavý let ze stromů - aktivní let (Marsh, 1880)
- 2) Kurzoriální teorie (cursorial theory) - z rychlého běhu, lov kořisti addukcí předních opeřených končetin - většina maniraptorů byli rychlí běžci - běh-skok-let (Williston, 1879)

Jeholská souvrství ze spodní křídy (Yixiang, Čína)

-*Microraptor* (Dromaeosauridae †) - opeření i na zadních končetinách (Čína), manévrování v běhu při pronásledování hmyzu, plachtění

Vzlet ze země až po úpravě krkavčí kosti (procoracoid) - zvednutí křídla nad horizontální úroveň

Nelétaví ptáci - druhotně z létavých forem, ve více vývojových liniích





## XI. Aves

Min. *Calypte helenae* - kalypta (olibřík) kubánská, 1,5 g, 6 cm

max. *Struthio camelus* - pštros dvouprstý, 100 kg, 2 m, *Dinornis (Moa)*,  
*Aepyornis* - 500 kg, 3 m, vejce 10 kg, *Argentavis magnificens* - rozpětí  
6-8 m, albatros stěhovavý a kondor velký - 3,5 m

### Charakteristika:



- endotermní a homoiotermní
- **Pokryv**: tenká suchá kůže, ramfotéka a podotéka, jen kostrční žláza, peří
  - pero = scapus (stvol) + vexillum (prapor)
  - calamus (brk)
  - rhachis (osten, 8)
  - rami (větve, 10)
  - radii (paprsky, 11)
  - hamuli (háčky, 12)



## XI. Aves

- typy per: pennae (obrysová) = tectrices (D, E), remiges (C), rectrices plumae (prachová, I)  
filoplumae (vlasová, F)  
vibrisy (hmatová, G)

remiges - letky ruční, loketní a ramenní





- opeření: neoptile - jen na pteryiae = pernice (+ apteriae = nažiny)  
teleoptile - pennae jen na pteryiae, plumae i na apteriae
- pelichání = ecdysis + endysis, 1-3 x do roka

Peří- dutá vlákna (brk), bez praporu - Ornithischia!- *Tianyulong confuciusi* (Čína 2009)  
Na hřbetě i břichu, k vizuální signalizaci, ne k letu  
Peří typické stavby známo u 20 druhů maniraptorů!

## Kostra - pevnost - srůsty, lehkost - pneumatizace kostí

- heterocélní obratle, C (10-26, 14-15), Th (3-10), notarium (Th), synsacrum (11-23, Th, L, S, Ca + pánev), Ca (5-8), pygostyl
- žebra (3-9) = vertebrocostalia s **processi uncinati** + sternocostalia
- sternum s crista sterni





1. cranium, 2. volné krční obratle, 3. humerus, 4. ulna, 5. radius, 6. scapula, 7. vertebrocostale, 8. processi uncinati, 9. femur, 10. synsacrum, 11. volné ocasní obratle, 12. pygostyl, 13. ulnare, 14. furcula, 15. carpometacarpus, 16. I.prst, 17. metacarpus III., 18.coracoid, 19. crista sterni, 20. sternum, 21. III. prst, 22. II. prst, 23. sternocostale, 24. fibula, 25. tibiotarsus, 26. tarsometatarsus, 27. I. prst nohy s metatarsem, 28-30. II-IV. prst nohy, 31. pubis (součást 10).


## XI. Aves

končetiny:

- a) křídlo - scapula + procoracoid + **furcula** (srostlé claviculy); humerus - ulna + radius - radiale-C5 + ulnare-M5 - **carpometacarpus** (C1-4, M1,2,4) + M3 - prsty: 1. (2, prox.), 2. (2-3, dist.), 3. (1, dist.)
- b) noha - **synsacrum** (ilium, ischium, os pubis + páteř); femur - **tibiotarsus** (tibia + 2 prox. T) + fibula - **tarsometatarsus** = běhák (dist. T + M2-5) - prsty: 1. (M1+2 čl.), 2. (3 čl.), 3. (4 čl.), 4. (5 čl.)




Typy nohou:





## lebka - cranium:

velká mozkovna a očnice; kinetická - **kloub čelistní** = articulare-quadratum-squamosum; **kloub basipterygoidní** = palatina - pterygoidy-praesphenoid; mizí švy, spojení v nepárovou choanu  
typy: palaeognathní (u běžců) a neognathní (u létavých)




## Svalstvo:

- létací svalovina (m. pectoralis, m. supracoracoideus)
- sevření prstů: m. ambicus, m. flexor perforans



### Nervová soustava:

- rozvoj koncového mozku: **striatum** (instinkty), **laterální a dorzální pallium** - zde již všechna nejvyšší ústředí (s výjimkou zraku - střední mozek)
- rozvoj mozečku - relativně největší ze všech obratlovců - koordinace pohybů při letu, zvrásnění kůry



### Smysly:


- dominantní zrak (denní aktivita) a sluch
- bolest, tlak a teplota - tělíska Herbstova, Grandryho, Vater-Paciniova, Merkelovy buňky - na zobáku, v zobáku, na jazyku, u semenožravých i na patře
- chut' - nepatrнě, v zadní části ústní dutiny chut'ové pupeny
- čich - slabě, s výjimkou kiviů, kondorů a kachnovitých
- ucho: sluch - 40 Hz - 30 kHz, opt. 1-3 kHz (jako člověk)
  - a) vnitřní - prostorné statodynamické ústrojí, spiralizace lageny v hlemýžď (**cochlea**), papilla basilaris se prodlužuje - **Cortiho orgán**
  - b) střední - vždy s columellou
  - c) zevní - krátký zvukovod a náznak boltců - val se vztyčenými peříčky (sovy)

- oko: velké, málo pohyblivé (složitější tvar), nepohyblivé (sovy), pohyblivé (tučňáci, pelikáni, kormoráni, rackové), 3 víčka - průhledná mžurka, větší víčko dolní (mrkání) s výjimkou sov a střízlíka; v bělimě 14 kůstek tvořících sklerotikální prstenec; akomodace - 12-20 D, sovy jen 2-4 D, potápějící se ptáci až 50 D; výrůstek cévnatky do sklivce - pecten, zvyšuje ostrost vrháním stínu na oční pozadí, na sítnici až 1 mil. zrakových buněk / 1 mm<sup>2</sup>, u denních barevné vidění


endokrinní soustava: luteinizační h. (i svatební opeření samců), prolaktin (i hnízdní pud), oxytocin (vypuzování vajec), tyroxin (i pelichání a tah)

### Trávicí soustava:


- **zobák**, bezzubé čelisti, patro a někdy i jazyk pokryty rohovinou, jazyk i lepkavý s háčky (datlovití), trubičkovitý (kolibříci), slinné žlázy (u vodních redukovány, dobře vyvinuty u suchozemských zejména datlovitých a salangán);
- na konci jícnu **vole (ingluvies)** u semenožravých a rybožravých, zpětná peristaltika při krmení mláďat;
- **žlaznatý (proventriculus)** - svalnatý žaludek (*ventriculus*, i tvorba vývržků) - *postventriculus* dravců;
- tenké a tlusté střevo, na rozhraní párové slepé střevo, kloaka ze 3 částí (**proctodeum, urodeum, koprodeum**);
- velká játra



## Dýchací soustava: trubicovité plíce




hlasové ústrojí (syrinx):  
pěvce                                kačera



mesobronchus  
dorsibronchi

ventrobronchi  
parabronchi



### Cévní soustava:

- relativně velké srdce

pštros: 6 % m            20 kPa (150 mmHg)        120/min        40 °C

kolibřík: 24% m            67                            615                    41 °C

- úplná mezikomorová přepážka (oddělení krvé odkysličené (P) od okysličené (L)), **jen pravý oblouk aorty**
- chybí žilný splav, srdeční násadec, kardinální žily
- na krku spojení mezi P a L jugulární žílou, časté anastamózy na periférii

### Vylučovací soustava:

- trojlaločné metanefros v prohlubních synsacra, **nefron s Henleovou kličkou**, resorbce vody i v kloace
- urikotélní (kys. močová)
- zahušťování moči v kloace: tekutá moč z urodea do proctodea vystlaného resorbčním epitelem, zde zahuštění v bílou suspenzi pokryvající trus
- chybí močový měchýř (vyvinut jen u běžců)

### Pohlavní soustava:

- úspornost, rozvoj jen v době hnízdění (období rozmnožování)
- malá nepatrná fazolovitá varlata pod předními laloky ledvin, až 360x zvětšení, chámovody se před vstupem do kloaky rozšiřují v semenné váčky (u pěvců vyklenují celou oblast kloaky)
- samice obvykle jen s levým vaječníkem a vejcovodem, u dravců a papoušků až 50 % samic s oběma funkčními vaječníky a vejcocody, u kiviů většina samic s oběma vaječníky
- části vejcovodu:
  - a) infundibulum (nálevka)
  - b) tubus - tvorba bílku
  - c) isthmus - tvorba papírové blány
  - d) uterus - tlustostěnná děloha, tvorba řídkého bílku, vápenné žlázky  
- tvorba skořápky
  - e) vagina - svalnatý oddíl, tvorba hlenu, vypuzování vajíček
- zásadně oviparní, péče o snůšku a vylíhlá mláďata

### Ekologie:

- teplokrevnost + vysoká pohyblivost, intenzivní a rychlý metabolismus, limitujícím faktorem je dostatek energie - tzn. potravy
- odolnost vůči nízkým teplotám a vlhkosti vzduchu
- největší rozšíření v tropech, směrem k pólům ubývají, v polárních oblastech přesto nejrozšířenějšími obratlovci
- osídlují všechny suchozemské niky kromě podzemí (buřňáci v podzemních norách jen hnízdí, potravu shánějí mimo nory, i vodní ptáci nacházející potravu ve vodě hnízdí na souši (tučňáci))
- vejce kladou vždy na souši
- potrava - rozmanitá, mláďata krmena potravou živočišnou i u ptáků semenožravých; omnivorní, insektivorní, karnivorní, lichenivorní, piscivorní, herbivorní, granivorní, fruktivorní, nektarivorní, palenivorní; potravní parazitismus (chaluhy)
- množství potravy (m sušiny/m těla): dravci 5-8%, pěvci až 40%
- hnízdění: stavba hnízda (1x, méně 2x i vícekrát ročně, náhr. hnízdění)
- fáze - klidová, akcelerační - teritoria (stimul - rostoucí fotoperioda, teplota, potrava), kulminační - kopulace, ovulace, až do osamostatnění mláďat
- snůška: 1-25 vajec, inkubace: 11 dní (12-18 malí pěvci) - 80 dní (tučňáci)
- taboni - snůšku zahrabávají do sopečného poela nebo tlejícího materiálu
- hnízdní parazitismus - kukačky, vlhovci, kachny

### Ekologie - postnatální vývoj: po vylíhnutí

- 1. **nidifugní** - mláďata opeřená, nekrmivá - samostatný příjem potravy, ochranné instinkty; větší vejce o větším počtu, delší zárodečný vývoj, hnízdění na zemi, rodiče vodí, zahřívají, chrání, po opuštění hnízda se již nevracejí; polokrmiví - mláďata v okolí hnízda, rodiče jim přinášejí potravu (rackové)
- 2. **nidikolní** - mláďata neschopná samostatného života, neopeřená nebo jen v prachovém peří, nebo jen z části opeřená, dobře vyvinuty TS, ale málo NS, smysly, pohybová soustava, nefunguje termoregulace - rodiče zahřívají a krmí; menší vejce o nižším počtu, krátkší zárodečný vývoj, hnízdění na stromech, velká péče při stavbě hnízda, mláďata dlouho na hnízdě (pěvci 14-20 dní, tučňáci 150-180 dní, buřňáci až 250 dní)
- pohlavní zralost - ve 2. roce života (drobní pěvci, holubi), ve stáří 2 let (husy, dravci, sovy), 4-8 let (velcí dravci, čápi)
- migralita: stálí, přelétaví (100-500 km), tažní (směrované přelety 2x ročně), souměrnost doby tahu s letním slunovratem (skřivan - rorýs), tahové cesty: rekapitulace původních cest šíření nebo ústupu; zpravidla hromadný tah (i více druhů společně), individuálně (kukačka, žluva), tah v noci (kachny, bahňáci), tah ve dne (vlaštovky, dravci), tah ve dne i v noci (skřivan, špaček), denní trasa max 200-300 km, drobní letí do 300 m nad zemí, kachny do 500 m, dravci do 1 km (ale i přelet velehor - Himaláje); invaze: nepravidelné, při nedostatku potravy


### Etologie:

- bohaté instinktivní projevy
- převážně denní aktivita, vizuální a akustická signalizace a komunikace
- různé strategie získávání potravy - predátoři (dravci v. sovy), získávání semen (datlovití, křivka), larev hmyzu (*Cactospiza pallida* - pomocí ostnů z kaktusů, datlovití - dlouhý vychlipitelný lepkavý jazyk s háčky - uprav. jazylkový aparát)
- párování při hnízdění: páry netvoří, jen při kopulaci (jeřábek, jespáci), několika-denní páry (bahňáci, moudivláček), páry na 1 hnízdní období (do osamostatnění mláďat, většina), celoživotní páry (husy, orli, jeřábi, chocholouš), polygynie - pštros, bažant, polyandrie - kukačka, bahňáci
- hnízdní teritoria: obsazují samci před hnízděním, hájí je nejdříve sami, pak i se samicí, značení akusticky (zpěvem), vyhružné nebo imponující postoje a pohyby, i potravní teritoria (dravci), lek (samci se předvádějí ve společné aréně - ze švédštiny (leka = hra, soutěž) - bahňáci, tetřevi atd.
- stavba hnízda (1 hnízdo na 1 sezónu, většina), používání starého hnízda (dravci): staví oba (ledňáček, datlovití, straka), on materiál, ona staví (holub, havranovití), jen ona (pěnkavovití, sýkorovití, kolibříci), ona materiál, on staví (fregatky), jen on (tuhýci, snovači), nestaví vůbec (sovy, lelci, alky, kukačka)
- inkubace snůšky: jen ona (u polygynních a páry netvořících nebo páry jen do snůšky), jen on (u monogamních, polyandrických i polygynních), oba (většina, předávací ceremoniál) - doba sezení (drobní až 2 hod., bahňáci až 24 hodin, supi až 5 dnů, tučňáci až 28 dnů)

## XI. Aves

- imprinting (vtiskávání) - akustické ve vejci (kachny), vizuální (husy); hlyasy: vábení, varování, uvědomovací hlas (kvokání slepice), svolávací hlas, uvědomovací hlas a hlas opuštěnosti mlád'at; **zpěv** (afinní pro F, difugní pro M)
- orientace v prostoru (při tahu): směrový a navigační smysl, optická orientace (slunce, hvězdy, líniové krajinné prvky), magnetické siločary (rackové)

## Systém



svrchní jura (Solnhofen): *Archaeopteryx* (1860)

spodní křída:

Čína: *Jeholornis*, *Confuciusornis*, *Sinornis*


Enantiornithes - Španělsko (*Iberomesornis*, *Concornis*, *Eoaluavis*),

*Ambiorhynchus* - Mongolsko, před 120 mil. lety, Mortimer (2004)

svrchní křída: *Rahonavis* (Madagaskar) - prapták?, slepá větev

USA (1870-) - *Hesperornis*, *Ichthyornis*, Argentina - *Patagopteryx*

## XI. Aves





## Druhohorní „ptačí“ (Saururae)

svrchní jura (Bavorsko):


*Archaeopteryx lithographica*

Německo, Solnhofen (1855/1970, 1860, 1861, 1877, 1955) - před 140 mil. lety, kombinace „plazích“ a „ptačích“ znaků



Plesiomorfie: tekodontní zuby, amficélní obratle, malé sternum, žebra bez p. uncinati, zápěstí a zanártí nesrostlé, 3 volné prsty s drápy, ocas

Apomorfie: ptačí pera, křídla, furcula, red. fibula, tibiotarsus, 4 prsty s palcem dozadu, částečná pneumatizace - již u Maniraptorů



## XI. Aves

spodní křída (Čína, Španělsko):

*Jeholornis* (Čína) - přechodový článek od maniraptorů k ptákům?

*Confuciusornis sanctus* - před 120 mil. lety,

*Sinornis* (Čína, jeholské vrstvy)



Enantiornithes

*Iberomesornis* (Španělsko), pygostyl

*Enantiornis, Concornis, Eoalulavis* -

Španělsko

velikost vrabce až jestřába,  
prodloužení ulny, sternum,  
kompetiční tlak na pterosaury




## Druhohorní praví ptáci (Ornithurae):


svrchní křída (S-Amerika): *Hesperornis, Ichthyornis*

Prokazatelně endotermní, crista sterni, ocas ptačího typu

*Hesperornis* - ozubené čelisti, nelétal




*Ichthyornis* - zobák, létal



## Třetihorní ptáci (Palaeognathae):


*Aepyornis* (3m)

býložravci, od paleogénu,  
Madagaskar, vyhubeni člověkem



*Dinornis* (Moa)

býložravci, od neogénu, Nový  
Zéland, vyhubeni člověkem



Třetihorní ptáci (Neognathae):  
eocén

péče o potomstvo - přežití dinosaurů

nelétaví (sekundárně):



*Diatryma* - 2 m, dravec

*Titanus* - 3 m

létaví:

*Argentavis magnificens* - největší letec, rozpětí 6 - 8 m, 80 kg



*Diatryma gigantea*  
spodní eocén, Neoaves



## Třetihorní ptáci (Neognathae):

Druhotně nelétaví


*Raphus cucullatus* - dronte mauricijský  
(*Didus ineptus* - blboun nejapný)  
od neogénu, vyhuben v 17. století




## Systém Aves

### Eoaves 14/57 - Palaeognathae - RATITAE (běžci)

A)



B)



## Struthionidae - pštrosovití (1/1)

Velká křídla s letkami, i rýdovací pera, jen 2. a 3. prst - běh, bez crista sterni a bez claviculy, samec s penisem, péče o potomstvo samec i samice, Afrika



pštros dvouprstý

## Rheidae - nanduovití (1/2)

Menší s křídly a letkami, ale bez rýdovacích per, 2., 3. a 4. prst, pneumatizace kostí zachována, samec s penisem, J-Amerika




nandu pampový


**Casuariidae** - kasuárovití (1/3)

**Dromaiidae** - emuovití (1/1)

Redukovaná křídla, bez letek a rýdovacích per, měkká dvojitá pera s velkým paostnem, 2., 3. a 4. prst, slabá pneumatizace, Austrálie, N. Guinea



kasuár přílbový



emu  
australský

## Apterygidae - kiviovití (1/3)

Silně redukovaná křídla a letky, 1. prst s drápkem, obrysové peří stejné (srst'ovité) bez paprsků, bez pneumatizace, bez crista sterni a claviculy, lopatka srůstá s procoracoidem, na noze 4 prsty s malým palcem, dobrý čich, špatný zrak, nozdry u špičky zobáku, noční aktivita, Nový Zéland



kivi jižní



## Tinamidae - tinamovití (9/47)


Krátká křídla, špatný let, pneumatizace kostí, crista sterni, ale bez processi uncinati, redukovaná rýdovací pera, u krycích per se paprsky spodních řad na konci spojují, stř. a J Amerika



tinama chocholatá





## Neornithes (moderní ptáci)



Systém Neoaves dosud nejednotný, sporná příbuznost a pochybnosti o monofylii některých skupin

Neognathae 2043/9918 (létaví) Podle Sibley & Monroe (1990) - hybridizace DNA





Polyfyletické skupiny: **Pelecaniformes, Falconiformes, Gruiformes, Charadriiformes, Ciconiiformes** U nás cca 400 druhů, z toho asi polovina hnízdí.

## Galliformes - hrabaví (58/214)

hrabavá noha se silnými tupými drápy

**Megapodidae** - tabonovití (6/19) - bez péče o potomstvo, zahrabávání snůšky

**Phasianidae** - bažantovití (45/177) - ostruha, sexuální dimorfismus



tabon holubí



bažant obecný



páv korunkatý  
páv bílý



orebice horská



koroptev polní



křepelka polní



## Galliformes - hrabaví (58/214)

Phasianidae - bažantovití (+ tetřevovití, krocanovití ...) (45/177)

Numididae - perličkovití (4/6)

Cracidae - hokovití (11/50)



tetřivek




tetřev

krocan




hoko pospolitý - *Crax alector*

Taboni a hokové  
= Craciformes



p. supí



perlička kropenatá

[www.tintazul.com/pzjulio/reis](http://www.tintazul.com/pzjulio/reis)

## Anseriformes - vrubozobí (45/160)

### Anhimidae - kamišovití (2/3)

bez plovacích blan, podobní kurům, na křídle rohovitá ostruha, nemají penis, herbivorní, bažiny a stojaté vody J Ameriky




### Anatidae - kachnovití (43/157)

**zploštělý zobák s rohovitými lamelami po stranách a nehtem na špici, plovací noha, nejdelší 3. prst, syrinx s rezonátorem, samci s velkým penisem**

#### 1) Cygninae - labutě

labut' velká- *Cygnus olor*



labut' černá

kamiš chocholatý  
- *Anhima cornuta*



čaja obojková- *Chauna torquata*

Anatidae - kachnovití (43/148)

1) Cygninae - labutě


2) Anatinae - a) Anserini - husy



husa malá  
husa běločelá



berneška velká - *Branta canadensis*



berneška bělolící

2) Anatinae - b) Anatini - kachny (plovavé a potápisné )  
husice liščí



kachna divoká  
- *Anas platyrhynchos*

zrzohlávka rudozobá



polák velký - *Aythya ferina*



čírka modrá

čírka obecná

polák chocholačka

2) Anatinae - b) Anatini - kachny

kajka mořská



kachnička mandarinská

morčák bílý



morčák prostřední




morčák velký - *Mergus merganser*

## „Falconiformes“ - „dravci“ (83/304)


1+2+4+5

Hákovitě zahnutý zobák s ozobím (voskovka), spár s dlouhými zahnutými ostrými drápy, svalnatý jazyk, vole, kostrční žláza, zoofágie - predace, nidikolní mlád'ata



- 1) Cathartidae - kondorovití (5/7)
- 2) Sagittariidae - hadilovovití (1/1)
- 3) Strigiformes - sovy (26/205)
- 4) Accipitridae - krahujcovití (65/234)  
včetně orlovce (1/1)
- 5) sokoli - Falconidae (11/62)

Cathartidae (kondorovití) - slabý horní zobák, dobrý čich - lichenivorie, tupé drápy, široká křídla - statické plachtění, Amerika



kondor královský - *Sarcoramphus papa*

kondor andský - *Vultur gryphus*

Sagittariidae (hadilovovití) - dlouhé nohy, krátká křídla k lovům plazů, běh, Afrika



hadilov písář - *Sagittarius serpentarius*



## Strigiformes - sovy (26/205)

Příbuzní dravcům (nebo lelkům ?), noční predátoři, oči ve frontální rovině, spáry s vratiprstem, měkké okraje obrysových per, orientace sluchem, mrkají horním víčkem, bez voleti, dlouhá slepá střeva, tvorba vývržků, cizí hnízda nebo hnízdní dutiny, nidikolní mláďata.



## Tytonidae - sovovití (2/16)



© - lubomir hlasek

sova pálená - *Tyto alba*

## Strigidae - puštíkovití (24/189)

puštík bělavý



puštík obecný - *Strix aluco*

## Strigidae - puštíkovití (24/189)

sýc rousný

sýček obecný - *Athene noctua*



kulíšek  
nejmenší



výr velký  
- *Bubo bubo*



výreček malý



„Falconiformes“ - „dravci“

Accipitridae (krahujcovití) - bez zejku

A) supi



sup mrchožravý - *Neophron percnopterus*



sup bělohlavý - *Gyps fulvus*



sup hnědý  
- *Aegypius monachus*




orlosup bradatý  
- *Gypaetus barbatus*

B) orli



orel mořský



orel skalní



orel opičí



orel kejklíř

C) ostatní



luňák červený - *Milvus milvus*



káně lesní - *Buteo buteo*

moták pochop - *Circus aeruginosus*



jestřáb lesní  
- *Accipiter gentilis*



krahujec obecný - *Accipiter nisus*

## Pandioninae - orlovcovití




orlovec říční - *Pandion haliaetus*

## Falconidae - sokolovití - zejk, úzká zašpičatělá křídla, lov nejčastěji ve vzduchu



karančo jižní



poštolka rudonohá - *Falco vespertinus*



poštolka obecná - *Falco tinnunculus*



raroh jižní - *Falco biarmicus*



© - lubomir hlasek  
[www.hlasek.com](http://www.hlasek.com)  
*Falco columbarius* 117

dřemlík tundrový - *Falco columbarius*

sokol stěhovavý - *Falco peregrinus*




ostříž lesní - *Falco subbuteo*

## „Pelecaniformes“ - „veslonozí“ (7/66)

veslovací noha, hluboce  
rozeklaný zobák, hrdelní  
vak, trojdílný žaludek -  
piscivorní, různé lovecké  
strategie - pelikáni (8),  
**Phalacrocoracidae** -  
kormoránovití (39),  
terejové (9), fregatky  
(5), anhingy (2)




terej



**Phalacrocoracidae**



fregatka



pelikán bílý  
- *Pelecanus onocrotalus*



kormorán velký - *Phalacrocorax carbo*



anhinga


## Procellariiformes - trubkonosí (24/110)

složená ramfotéka, trubicovitě protažené nozdry mořští, dynamické plachtění na dlouhých úzkých křídlech s převládající loketní částí, plovací noha se zakrnělým palcem, 1 vejce, dlouhý vývoj, nidikolní



albatros stěhovavý - *Diomedea exulans*

buřňák lední - *Fumarius glacialis*



albatros galapážský

## Sphenisciformes - tučňáci (6/17)

Nelétaví, veslovitá zploštělá krátká křídla s nepohyblivým loketním kloubem, kosti nejsou pneumatizovány, plovací noha s malým palcem a ostrými drápy na prstech, šupinovitá obrysová pera, podkožní tuk, nohy extrémně vzadu - potápění (20 m, max. 80 m, 36 km/hod), piscivorní, pelichání najednou, J polokoule


tučňák Humboldtův



tučňák brýlatý




tučňák císařský



## Phoenicopteriformes - plameňáci (1/5)

Dlouhý krk a nohy, krátký zahnutý zobák k filtraci potravy z vody - **na čelistech i na jazyku lamely**, plovací noha bez palce, rud. penis, dlouhá slepá střeva, kolonie u slaných jezer a v mořských zátokách, nidikolní mláďata



## Podicipediformes - potápkы (6/22)

lemovaná noha s plochými drápy  
na prstech, spirálovité paprsky,  
zkrácené rýdováky, plovoucí hnízda




potápka černokrká



potápka malá




potápka roháč - *Podiceps cristatus*




## Gaviiformes - potáplice (1/5)

plovací noha s malým palcem, nejdelší je 4. prst, nohy extrémně vzadu, piscivorní




potáplice severní - *Gavia arctica*



## Cuculiformes - kukačky (30/138)

### Cuculidae (kukačkovití)

zygodaktylní noha s vratiprstem, krátký běhák (sedací noha), dlouhá křídla, hnízdní parazitismus




### Opisthocomidae (hoacinovití, 1/1)

*Opisthocomus hoazin*





Řazení k hrabavým, turakovitým, krátkokřídlým nebo považování za samostatný řád blízký hrabavým, měkkozobým, lelkům, svištounům



## Musophagiformes - turakové (6/23)

Afrika, les, peří zelené, červené (turacin), semeno- a plodožraví, často řazeni ke kukačkám, příbuzní asi lelkům nebo sovám




Tauraco



## Columbiformes - měkkozobí (40/308)

Měkké ozobí, sedací nebo kráčivá noha, velké dvoudílné vole, malá slepá střeva - semenožraví, zašpičatělá křídla, chybí kostrční žláza - drobivý prach, sání vody, při spánku zatahují hlavu, nidikolní mláďata

### Columbidae - holubovití



holub hřivnáč - *Columba palumbus*



holub skalní - *Columba livia*



holub doupňák - *Columba oenas*



## Columbidae - holubovití

hrdlička divoká - *Steptopelia decaocto*



hrdlička zahradní - *Steptopelia turtur*



## Pterocliformes - stepokurové - (2/16)

Podobní kurům, s holubím zobákem a krátkýma nohama, příbuzní měkkozobým ?




© - josef hlasek  
[www.hlasek.com](http://www.hlasek.com)  
Pterocles alchata 6854

stepokur krásný - *Pterocles alchata*

## Caprimulgidae - lelkovití (20/118 i s gvačary)

Noční, s měkkým opeřením, široká hlava na krátkém krku, plochý hluboce rozeklaný zobák s vibrisami, krátké nohy s částečným vratiprstem, dlouhá křídla, bez volete, dlouhá lahvovitá slepá střeva, insectivorní - lov v letu, nestaví hnízda, hnízdění na zemi



lelek lesní - *Caprimulgus europaeus*




## Trogonidae - trogonovití (6/39) - stř. a J Am, JV Asie, Afrika



## Steatornithidae - gvačarovití - stř. a J Am



guacharo




v jeskyních (echolokace)

## Psittaciformes - papoušci (80/353)


Velký zobák, horní hákovitě zahnutý, kloubně spojený s mozkovnou, zygodaktylní noha, šplhání s pomocí zobáku, velké vole, ale bez slepých střev, prudký let jen na krátké vzdálenosti, plodo- a semenožraví - přidržování potravy nohou (maso - kea *Nestor*), velký telencephalon, drobivý prach, zakrnělá kostrční žláza



kakadu



andulka



ara




## Coraciiformes - srostloprstí (416/218)

syndaktylní noha, pestré zbarvení

(+ Bucerotiformes - zoborožci, Upupiformes - dudci)

Coraciidae (mandelíkovití), Alcedinidae (ledňáčkovití),  
Meropidae (vlhovití)



## Coraciiformes - srostloprstí (46/218)

(+ Bucerotiformes - zoborožci, Upupiformes - dudci)


Coraciidae (mandelíkovití), Alcedinidae (ledňáčkovití),

Meropidae (vlhovití)



asek  
om  
er 10133

**Coliiformes - myšáci (2/6) - Afrika**




Příbuzní trogonům nebo srostloprstým?

## Apodiformes - svišťouni

### Apodidae - rorýsovité (18/102)

Výborní letci, veslovací let s krátkým plachtěním, vysoký crista sterni, mohutná létací svalovina, srpovitá křídla, dlouhé ruční letky, krátké ramenní, pamprodaktylní noha, insectivorní, lov v letu, hnízdí ve stromových dutinách, ve skalách a v jeskyních (salangany - echolokace, jedlá hnízda)



rorýs obecný - *Apus apus*


### Trochiliidae - kolibříkovité (?/328)

Výborní letci, vířivý let, sedací noha, trubicovitý zobák, pestře zbarvení, dlouhý „ocas“, nektarivorní, polenivorní a insektivorní, ornitofilie



## Piciformes - šplhavci (51/355)

zygodaktylní noha, šplh s oporou  
rýdovacích per




žluna zelená

datlík tříprstý




## Picidae (datlovití)




© - lubomir hlasek

datel černý



strakapoud velký



krutihlav obecný

## Piciformes - šplhavci (51/355)

### Indicatoridae (medozvěstkovití)



### Rhamphastidae (tukanovití)



## Gruiformes - krátkokřídlí (59/203)

Rozmanitá skupina, spec. úprava karotid, opeření u kloaky, běhavá, lemovaná, brodivá noha, palec vysoko postavený nebo chybí, chybí vole, převážně v mokřadních biotopech, hnízdí na zemi, nidifugní mláďata

Rallidae - chřástalovití (33/134)

Gruidae - jeřábovití (4/15)

Otididae - dropovití (10/25)

Turnicidae - perepelovití (2/16), stepní, podobní křepelkám (V As, Afr, Aus)

Cariamidae - seriemovití (2/2, J Am)

Mesitornithidae - mesitovití (2/3, Madagaskar) aj.

## Rallidae - chřástalovití (33/134)

Krátká zakulacená křídla, mokřadní biotopy, zboku stlačené tělo, mláďata s červenými temeny, brodivá nebo lemovaná noha, omnivorní

chřástal vodní - *Rallus aquaticus*



slípka zelenonohá - *Gallinula chloropus*



chřástal polní - *Crex crex*




## Gruidae - jeřábovití (4/15)

Dlouhý krk a nohy, dlouhá křídla, nesedají na stromy, tažní, komplikovaný tok



jeřáb popelavý - *Grus grus*



jeřáb japonský



jeřáb královský

## Otididae - dropovití (10/25)

Stepní, rychlý běh, chybí palec, semenožraví, polygamní, nápadný tok

drop velký - *Otis tarda*



## Cariamidae - Seriemovití (2/2, J Am)

seriema rudozobá - *Cariama cristata*



*Chunga burmeisteri*



## Mesitornidae - mesitovití (2/3, Madagaskar) i k hrabavým

*Mesitornis unicolor* - mesit hnědý

*Mesitornis variegata* - mesit běloprsý

*Monias benschi* - monias Benschův



## Charadriiformes - dlouhokřídlí (76/348)

Vázáni většinou na vodní biotopy, malý palec, bez volete, s dlouhými slepými střevy, u nás hnízdí 18 druhů a protahuje 15.

1) bahňáci (50/220): brodivá noha, štíhlí s dlouhými křídly

ostnáci (6/8) - dlouhé tenké prsty

tenkozobcovití (3/10) - dlouhý tenký zobák, dlouhé nohy

dytíkovití (1/9), ouhorlíkovití (5/17)

ostnák



pisila čáponohá



tenkozobec opačný



1) bahňáci

kulíkovití (4/66) - krátký zobák

kulík říční



čejka chocholatá



slukovití (22/87) - dlouhý zobák



koliha velká



vodouš rudonohý



břehouš černoocasý

## slukovití (22/87) - dlouhý zobák



sluka lesní



2) rackové (16/105): plovací noha, dlouhá úzká křídla - dynamické plachtění, převládá ruční část křídla, chaluhovití (2/7), rackovití (6/51), rybákovití (7/44)




chaluha příživná




racek chechtavý

**3) alky (10/23)** - vřetenité tělo s nohami vzadu, krátká křídla - potápění, vysoký zobák, piscivorní, kolonie - „ptačí hory, bazary“, jen 1 vejce na skalních římsách, na S-polokouli ekologicky zastupují tučňáky - alky, alkouni a papuchalci




alka velká (1844 -†)



alkoun

alka malá



papuchalk



## Brodiví - Ciconiiformes (40/115)

Ciconiiformes (podle Sibley & Monroe 1990 zahrnuje řády: Charadriiformes, Accipitriformes, Falconiformes, Podicipediformes, Phoenicopteriformes - plameňáci, Pelecaniformes, Procellariiformes)

Ardeidae (volavkovití)

(Phoenicopteridae (plameňákovití))

Threskiornithidae (ibisovití)

Ciconiidae (čápowití) - s podčeledí Catharinae - kondoři

Dlouhý zobák, krk i nohy, **noha brodivá**, statické plachtění, chybí vole, trojdílný žaludek, sběr živočišné potravy z vody a mokřadů, rudimentární penis, hnízda na stromech (i kolonie) a v rákosinách

Ardeidae - volavkovití (18/63)


Ciconiidae - čápowití (6/19)

Threskiornithidae - ibisovití (14/33)

## Ardeidae - volavkovití (18/63)

Úzký klínovitý zobák - harpunování, v letu S-krk

volavka popelavá - *Ardea cinerea*



volavka stříbřitá - *Egretta garzetta*

kvakoš noční - *Nycticorax nycticorax*



bukáček malý - *Ixobrychus minutus*



bukač velký - *Botaurus stellaris*



## Ciconiidae - čápowití (6/19)

Velcí s klínovitým zobákem, klapání  
zobákem, v letu natažený krk



čáp bílý - *Ciconia ciconia*



čáp černý - *Ciconia nigra*



marabu



## Threskiornithidae - ibisovití (14/33)

Zobák tenký ohnutý nebo plochý na konci lžícovitě rozšířený, v letu natažený krk, lov bezobratlých v bahně nebo cezení planktonu



ibis hnědý



ibis posvátný



kolpík




## Passeriformes - pěvci (1161/5895)

Malí až střední, převážně stromoví, chybí mořské druhy, krátký plochý vomer, 14C, 5 costae, stejný tvar spermíí, rud. slepá střeva, mlád'ata extrémně nidikolní

Hackett et al. (2008): sesterský taxon k Psittaciformes (nDNA)

Edwards S.V. & Harshman J. (2006):






Fig. 1. Summary of passerine bird distribution and basal relationships (from Barker et al., 2002, 2004; Ericson et al., 2002).

# SUBOSCINES (13-14 čeledí/1000) - tropy

Moyle et al. 2006



# OSCINES - zpěvní (859/4550)

Harshman J. (2007)



## **Passeriformes - pěvci (1161/5895)**

Malí až střední, převážně stromoví, chybí mořské druhy, krátký plochý vomer, 14C, 5 costae, stejný tvar spermíí, rud. slepá střeva, mlád'ata extrémně nidikolní

SUBOSCINES (13-14 čeledí/1000) - tropy

**Eurylaimidae** - lobošovití (14)

Spojené šlachy ohýbačů 3 předních prstů, 1 páru zpěvných svalů, etiopská a orientální oblast

**Tyrannidae** - tyranovití (400)

Nezávislé prsty, 1-2 páry zpěvných svalů, tropy J Am

OSCINES - zpěvní (859/4550)


Nezávislé prsty, 2-3 páry zpěvných svalů, Austrálie

**Menuridae** - lyrochvostovití (2)

Nezávislé prsty, 7-9 párů zpěvných svalů, 40 čeledí

**Ptilonorhynchidae** - lemčíkovití

**Cnemophylinae (Paradisaeidae)** - rajkovití



Eurylaimide - lobošovití




Tyrannidae - tyranovití



tyran žlutý



# Oscines - zpěvní (859/4530)



Menuridae - lyrochvostovití

Ptilonorhynchidae - lemčíkovití

Cnemophylinae (Paradisaeidae) - rajkovití

Corvoidea

Passerida

Ptilonorhynchidae - lemčíkovití


Menuridae - lyrochvostovití




Cnemophylinae (Paradisaeidae) - rajkovití




## Oscines - zpěvní (859/4530)



Corvoidea - převážně Nový svět



Passerida - Starý svět



## Passerida

### a) Sylvioidea:

Sýkorovití - Paridae  
Moudivláčkovití - Remizidae  
Skřivanovití - Alaudidae  
*Panurus* - sýkořice  
Mlynaříkovití - Aegithalidae  
Sýkořicovití - Timaliidae  
„Pěnicovití“ - Sylviidae  
Vlaštovkovití - Hirundinidae

### b) Králíčkovití - Regulidae

### c) Muscicapoidea:

Brkoslavovití - Bombycillidae?  
Skorcovití - Cinclidae  
Drozdovití - Turdidae  
Lejskovití - Muscicapidae  
Špačkovití - Sturnidae

### d) Certhioidea

Brhlíkovití - Sittidae  
Zedníčkovití - Tichodromatidae  
Šoupálkovití - Certhiidae  
Střízlíkovití - Troglodytidae

### e) Passeroidea:

Vrabcovití - Passeridae  
Konipasovití - Motacillidae  
Pěvuškovití - Prunellidae  
Pěnkavovití - Fringillidae  
Strnadovití - Emberizidae