

Užitkové rostliny IV

Vít Grulich

Koření

- Příspěvky do pokrmů nebo nápojů s charakteristickou vůní
- Často dráždivá chuť
- Silice, alkaloidy, glykosidy
- Uplatnění v parfumerii, kosmetice, farmacii a medicíně
- Chuťová korigens
- Význam pro konzervaci
- Význam pro trávení
- Historický význam - motiv zámořských objevů

Apiaceae

■ *Carum carvi* - kmín

- Vytrvalá bylina
- Původ: Evropa
- Pěstování: mírný pás
- Užití: dvounažky



Apiaceae

■ *Coriandrum sativum* - koriandr

- Jednoletá bylina
- Původ: Blízký východ
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: dvounažky, čerstvé listy



Apiaceae

■ *Cuminum cyminum* - kmín římský

- Jednoletá bylina
- Původ: Středozeemí a Blízký východ
- Pěstování: subtropy
- Užití: dvounažky



Apiaceae

- *Ferula assa-foetida* - čertovo lejno
 - Vytrvalá bylina
 - Původ: Střední východ
 - Pěstování: tamtéž
 - Užití: pryskyřice z kořenové hlavy



Apiaceae

■ *Foeniculum vulgare* - fenykl

- Vytrvalá bylina
- Původ: Středozeemí
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: dvounažky



Foeniculum vulgare Mill.



Apiaceae

■ *Pimpinella anisum* - anýz

- Jednoletá bylina
- Původ: v. Středozeří
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: dvounažky



Capparidaceae

■ *Capparis spinosa* - kapary

- Poléhavý keř
- Původ: Od Středozeemí do Indie
- Pěstování: subtropy
- Užití: poupata



Fabaceae

■ *Trigonella foenum-graecum* řecké seno

- Jednoletá bylina
- Původ: v. Středozeemí a Blízký východ
- Pěstování: subtropy
- Užití: nať a semena



Trigonella foenum-graecum
Sertürner Photo CD

Illiciaceae

■ *Illicium* - badyáník

- Stálezelený strom
 - *Illicium verum* - Jv. Asie
 - *Illicium religiosum* - Japonsko
- Pěstování: tamtéž
- Užití: souplodí měchýřků a semena



Iridaceae

■ *Crocus sativus* - šafrán

- Vytrvalá bylina
- Původ: asi Blízký východ
- Pěstování: subtropy
- Užití: blizny



Lamiaceae

■ *Calamintha montana* - saturejka zimní

- Vytrvalý polokeř
- Původ: Středozeemí
- Pěstování: mírný pás
- Užití: nať



Lamiaceae

■ *Hyssopus officinalis* - yzop

- Vytrvalý polokeř
- Původ: Středozeemí
- Pěstování: mírný pás
- Užití: nať



Foto: Arne Anderberg



Lamiaceae

■ *Majorana hortensis* - majoránka

- Jednoletá až vytrvalá bylina
- Původ: v. Středozeří
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: nať



Lamiaceae

■ *Mentha* - máta

- Jednoleté až vytrvalé byliny
- Původ: Evropa
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: nať



Mentha × *piperita*



Mentha × *crispa*

Lamiaceae

■ *Ocimum* - bazalka

- Jednoleté a vytrvalé byliny a polokeře
 - *Ocimum basilicum* - Středozeemí
 - *Ocimum gratissimum* - Afrika
 - *Ocimum sanctum* - j. Asie
- Užití: nať



Ocimum basilicum

Lamiaceae

■ *Origanum vulgare* - dobromysl

- Vytrvalá bylina
- Původ: j. Evropa a z. Asie
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: nať



Lamiaceae

■ *Rosmarinus officinalis* - rozmarýn

- Vytrvalý polokeř
- Původ: Středozeemí
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: nať



Lamiaceae

■ *Salvia officinalis* - šalvěj

- Vytrvalý polokeř
- Původ: v. Středozeří
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: nať



Lamiaceae

■ *Satureja hortensis* - saturejka

- Jednoletá bylina
- Původ: Středozeemí
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: nať



Lamiaceae

■ *Thymus vulgaris* - tymián


- Vytrvalý polokeř
- Původ: Středozeemí
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: nať



Lauraceae

■ *Cinnamomum verum* - skořicovník

- Stálezelené stromy a keře
 - *Cinnamomum verum* - j. Asie
 - *Cinnamomum cassia* - j. Čína
 - *Cinnamomum burmanii* - jv. Asie
- Pěstování: tamtéž
- Užití: borka



Lauraceae

■ *Laurus nobilis* - vavřín

- Stálezelený keř nebo stromek
- Původ: Středozeemí
- Pěstování: subtropy
- Užití: listy



Myristicaceae

■ *Myristica* - muškátovník

- Stálezelené stromy a keře
 - *Myristica fragrans* - Moluky
 - *Myristica argentea* - Moluky
- Pěstování: tamtéž
- Užití: bobule: oplodí a semeno



Myristica



Myrtaceae

- *Pimenta dioica* - pimentovník
 - Stálezelený dvoudomý strom
 - Původ: Stř. Amerika
 - Pěstování: tropy
 - Užití: plody (bobule)



Myrtaceae

■ *Syzygium aromaticum* - hřebíčkovec

- Stálezelený strom
- Původ: Moluky
- Pěstování: tropy
- Užití: poupata



Orchidaceae

■ *Vanilla planifolia* - vanilka

- Bylinná liána
- Původ: Mexiko
- Pěstování: tropy
- Užití: tobolky



Piperaceae

■ *Piper* - pepř

- Byliny nebo keře, často ovíjivé
 - *Piper nigrum* - jz. Indie
 - *Piper longum* - sv. Indie
 - *Piper cubeba* - Indonésie
 - *Piper guineense* - z. Afrika
- Pěstování: subtropy
- Užití: bobule, semena

Piper nigrum



Piper cubeba



Piper longum

Piper



Poaceae


- *Cymbopogon citratus* - citronela
 - Vysoká tráva
 - Původ: tropy Starého světa
 - Pěstování: tamtéž
 - Užití: listy



Rutaceae

■ *Schinus molle* – růžový pepř

- stálezelený strom
- Původ: jižní Amerika
- Pěstování: subtropy a tropy
- Užití: sušené peckovice



Rutaceae

■ *Zanthoxylum piperitum* sečuánský pepř

- stálezelený keř
- Původ: Čína
- Pěstování: subtropy
- Užití: tobolky



Solanaceae

■ *Capsicum* - paprika

- Byliny a keře
 - *Capsicum annuum*
 - *Capsicum frutescens*
 - *Capsicum chinense*
- Původ: J. a Stř. Amerika
- Pěstování: mírný pás až tropy
- Užití: bobule



Capsicum chinense



Capsicum frutescens

Zingiberaceae

■ *Alpinia* - galgán


- Vytrvalá bylina
 - *Alpinia galanga*
 - *Alpinia officinarum*
- Původ: jv. Asie
- Pěstování: tropy
- Užití: oddenek



Zingiberaceae

■ *Curcuma longa* - kurkuma

- Vytrvalá bylina
- Původ: jv. Asie
- Pěstování: tropy
- Užití: oddenek



Zingiberaceae

■ *Elettaria cardamomum* kardamom

- Vytrvalá bylina
- Původ: jv. Asie
- Pěstování: tropy
- Užití: semena



Zingiberaceae

■ *Zingiber officinale* zázvorovník

- Vytrvalá bylinná
- Původ: jv. Asie
- Pěstování: tropy
- Užití: oddenek

