

# Fylogeneze a diverzita obratlovců


## V. Srovnávací morfologie obratlovců

- charakteristika
- vznik orgánů
- pokryv těla (integument)
- kostra (skelet)
- svalstvo
- nervová soustava
- smyslové orgány
- trávicí soustava
- dýchací soustava
- cévní soustava
- urogenitální soustava

## V. Morfologie obratlovců

### Charakteristika - apomorfie


- obratlovci včetně sliznatek - lebečnatí (Craniata) ■ včetně sliznatek
- obratlovci bez sliznatek - Vertebrata ■ bez sliznatek
- aktivní pohyb, intenzívní metabolismus
- podélná polarizace (hlava, trup, ocas), vnitřní metamerie (Hox - geny)
- multiplikace shluků Hox genů (13 paralogních genů)  
nejčastěji **2x duplikace - tetraploidizace - 2R hyp.**,  
**3x duplikace - 6-7 shluků (Teleostei)**



- vícevrstevná pokožka (rohovatění - deriváty)
- vnitřní kostra z **chrupavek** a kostí (evoluce kolagenu)

## V. Morfologie obratlovců

- evoluce genů kolagenů u strunatců - 3 nezávislé klady
- nezávislý vznik notochordu, chrupavky a kosti



Wada H. et al., 2006:

*Molecular evolution of fibrillar collagen in chordates, with implications for the evolution of vertebrate skeletons and chordate phylogeny. Evolution & Development, 8 (4): 370-377*

## V. Morfologie obratlovců



- postupná redukce notochordu, nahrazení páteří z obratlů (alespoň arcualia)
- lebka, končetiny s vnitřní kostrou (ichthyo-, chiropterygia)
- myotomy ve tvaru W
- uzavřená cévní soustava s autonomně tepajícím vícedílným srdcem, v krvi erytrocyty s hemoglobinem
- párové ledviny mezodermálního původu
- osmotický tlak tělních tekutin asi o třetinu nižší než mořská voda - hyperosmoregulace (u sliznatek osmokonforma)
- nervová lišta („4. zárodečný list“) - vytvoření hlavy
- diferencovaný mozek, kraliální nervy
- na dorzálních kořenech míšních nervů spinální ganglia
- epidermální smyslové plakody, z nich párové smyslové orgány na hlavě:
  - čichový ústroj, inverzní komorové oko, vnitřní ucho (1,2-3 polokružné chodby)
  - proudový orgán postranní čáry s neuromasty

## V. Morfologie obratlovců

- neurohumorální regulace, endokrinní žlázy, hypofýza, štítná žláza
- adenohypofýza vzniká z ektodermu ústní dutiny (stomodea)
- imunitní systém
  - (postupný vznik apomorfických znaků, synapomorfie definované u recentních korunových skupin nemusely být přítomny u vymřelých kmenových skupin)

# V. Morfologie obratlovců

## Vznik orgánů



neurula obratlovců

ektoblast  
neuroektoblast  
nervová lišta  
mezoblast  
entoblast



Ectoderm	Notochord	Endoderm
Neural tube	Mesoderm	Endoderm
Neural crest		

## V. Morfologie obratlovců

ektoblast

neuroektoblast

epidermální smyslové plakody

nervové lišta (ektomezenchym)

 pokožka

 nervová trubice

ganglia senzorických hlavových nervů, oční čočky, čichové a sluchové váčky, proudový orgán

**buňky nervové lišty (BNL)** - 40 tkání a orgánů, mezi pokožkou a nervovou trubicí, migrace

- prekurzory pojivových tkání (fibroblasty, chondroblasty, osteoblasty, odontoblasty, chromatoblasty);
- indukce mnohovrstevného epitelu - pokožka a deriváty, pigmentace trupu a ocasu;
- dorzální kořeny míšních nervů a jejich senzorické neurony, sympatická a parasympatická ganglia, Schwannovy buňky, endokrinní žlázy, dřeň nadledvinek
- senzorická ganglia hlavových nervů (V, VII, IX, X), měkká mozková plena
- viscerální endoskelet lebky (žaberní oblouky), základy zubů; trabeculae cranii, přední část lebky včetně exoskeletu; rybí šupiny; hladká svalovina cév; rozdílný vývojový potenciál **hlavové** a **trupové** nervové lišty

**mezoblast** (dermatom, myotom, sklerotom, nefrotom a gonotom)  škára, svalovina, somatický endoskelet, močopohlavní, cévní s.

entoblast

 trávicí trubice a žlázy, žábra a plíce

## V. Morfologie obratlovců

„Agnatha“ = bezčelistní: vymřelé skupiny („Ostracodermi“ = štítnatci)  
+ Cyclostomata = kruhoústí (mihule a sliznatky)

Gnathostomata = čelistnatci

Primárně vodní:

Placodermi = pancířnatci

Chondrichthyes = paryby

Osteognathostomata

Actinopterygii = paprskoploutví

(bichiři, chrupavčití, kostlíni, kaprouni, kostnatí)

Sarcopterygii = svaloploutví

latimérie, dvojdyšní, „Rhipidistia“ - starobylé ryby

Primárně suchozemští: Tetrapoda = čtvernožci

Raní tetrapodi a Lissamphibia = obojživelníci

Gymnophiona (Apoda) - červoři (beznozí)

Caudata = ocasatí

Anura = žáby

Amniota = blanatí

„Reptilia“ = plazi („Sauria“=ještěři, Ophidia=hadi)

Aves = ptáci

Mammalia = savci




# V. Morfologie obratlovců

## 1. Pokryv těla (integument)

kůže {

vícevrstevná pokožka (epidermis) z ektoblastu

škára (corium, dermis) z mezoblastu (dermatom)  
a z buněk neurální lišty



## V. Morfologie obratlovců

## Primárně vodní obratlovci

„AGNATHA“: kostěné štítky („Ostracodermi“) - druhotně nahá (mihule)


nahá Acelulárni kost (aspidin) - lamelárni + vaskulárni

**GNATHOSTOMATA:** → kostěné desky (Placodermi) - kostěné šupiny

Odontody = dentin + „sklovina“

## Šupiny:

a) plakoidní (dentin + enameloid) (Chondrichthyes) - zuby




## V. Morfologie obratlovců


b) kosmoidní (lamelární kost = izopedin, vaskulární kost, dentin=kosmin, enameloid=vitrodentin **z mezoblastu**; Sarcopterygii)

BNL - osteoblasty (kost) a odontoblasty (zubovina)

c) ganoidní (lamelární a vaskulární kost, redukce kosminu; email = ganoin **z ektoblastu**, Chondrostei, bichiři, kaprouni a kostlíni)





kosmoidní



ganoidní

d) leptoidní (elasmoidní) (lamelární acelulární kost, Teleostei)

a) cykloidní



trend - ztenčování  
v kůži jen slizové buňky (mihule, ryby)


## V. Morfologie obratlovců

### Primárně suchozemští obratlovci

dermatoskelet (krycí kosti) („krytolebci“) - nahá (rec. Lissamphibia) –  
rohovatění pokožky


– rohovinné deriváty (krunýře, štítky, šupiny) - ochrana před ztrátou vody  
AMNIOTA:

(„Reptilia“)



mnohobuněčné kožní žlázy (z ektoblastu):

Lissamphibia (max.) ————— Amniota - „plazi“



## V. Morfologie obratlovců

### zbarvení těla (ekologická adaptace)

chemické - pigmenty

(v chromatoforech a kožních derivátech)

melaniny

lipochromy

porfyriny

fyzikální

- rozptyl světla v komůrkách naplněných vzduchem
- interference při průchodu a odrazu světla vrstvami různých optických vlastností

chromatofory z BNL

## V. Morfologie obratlovců

### 2. Kostra (skelet)

A) notochord (entoblast)      B) chrupavka a kost (mezoblast, BNL)

Notochord zachován primárně u: „Agnatha“, Placodermi, Acanthodii, Sarcopterygii  
sekundárně (pedomorfóza?) u: Acipenseriformes

Notochord zaškrcován rozvojem těl obratlů: redukce až úplné vymizení:  
Chondrichthyes, Actinopterygii, Lissamphibia, Amniota („Reptilia“, Mammalia, Aves)

#### OSIFIKACE:

- endesmální (desmogenní, dermální)  
přeměna vaziva v kost  
(dermatoskelet z krycích kostí)} EXOSKELET
- endochondrální nebo perichondrální  
(chondrogenní)  
náhrada chrupavky za kost  
(endoskelet z náhradních kostí)} ENDOSKELET

Acelulárni kost (aspidin) - celulárni kost

# V. Morfologie obratlovců

**EXOSKELET** (kostěný):

pancíře, krunýře, rybí šupiny, krycí kosti lebky, část pásmá přední končetiny (cleithrum, clavícula)

**ENDOSKELET** (chrupavčitý nebo kostěný):


**A) somatický (ze sklerotomu somitů)**

obratle, chrupavčité neurocranium, část kostěného neurocrania, costae, sternum, část pásmá přední končetiny (scapula, procoracoid atd.), celé pásmo zadní končetiny, celá kostra volných končetin


**B) viscerální (ze splanchnopleury a BNL)**

žaberní oblouky, viscerocranium, sluchové kůstky

A



B




## V. Morfologie obratlovců

### Osní skelet - vertebrae, costae, sternum

Obratle: vznik kolem notochordu ze sklerotomu, vývoj nejednotný

- oblouky (arcualia)
  - dorzální (neurální, neuropofýzy)
  - ventrální (hemální)


nejstarší částí neurální oblouky (mihule), vznikající těla obratlů postupně zaškrcují notochord (paryby a ryby)




## V. Morfologie obratlovců

Typy obratlů podle tvaru těl:

- amficélní (Chondrichthyes, Actinopterygii)




- platycélní (acélní, amfiplatní) (Mammalia)





- heterocélní (Aves)

- opistocélní (Caudata)



- procélní (Anura, „Reptilia“)




## V. Morfologie obratlovců

Žebra: dorzálně připojena na těla a processi transversi obratlů

A) dolní - v blízkosti myosept na somatopleuře, výztuha stěny coelomu, u vodních čelistnatců

B) horní - v septum horizontale, suchozemští obratlovci a některé ryby



metamerie  
(vodní čelistnatci)

redukce (jen hrudní)  
„Sauria“, Aves, Mammalia)  
sekundární metamerie  
(Ophidia)  
vymizení  
(Anura, Apoda)

Sternum: u suchozemských obratlovců

Anura - „Sauria“ - Aves (+crista sterni) - Mammalia (manubrium, corpus, processus xiphoideus)

chybí: Caudata, Ophidia

## V. Morfologie obratlovců

Lebka


CRANIUM




### 1. neurocranium

#### A. ENDOSKELET (somatický)

- chrupavčité neurocranium : párové chrupavky praechordalia (trabeculae cranii), parachordalia




srůst - bazální ploténka



## V. Morfologie obratlovců

pololebka (mihule)



kompaktní lebka (paryby): regio - occipitalis  
(chondrocranium)  
otica  
orbitalis  
ethmoidalis



- kostěné neurocranium : v komplexu **sphenoidale** (lebeční báze)  
spodina lebeční: **ethmosphenoidale**, **praesphenoid**, **basisphenoid** + **basioccipitale**  
vertikální stěny: **turbinalia**, **orbitosphenoid**, **alisphenoid**, **exoccipitale**

## V. Morfologie obratlovců

### EXOSKELET

- lebeční klenba: nasale, frontale, parietale, jugale, lacrimale, intertemporale, supratemporale, squamosum
- patrový komplex: pterygoidy, parasphenoid, vomer, ossa palatina

# V. Morfologie obratlovců

## 2. viscerocranium

ENDOSKELEŤ (viscerální) - z ektomezenchymu neurální lišty, chrupavčitý, kostěný žaberní oblouky (9):

0. (2) - praemandibulární ?

1. (1) - čelistní (*Otx* gen a *Dlx* geny)

horní (?): palatoquadratum - quadratum - incus  
dolní: mandibulare - articulare - malleus

2. (1) - jazylkový (*Hox a2* gen)

horní: hyomandibulare - columella - stapes

dolní: hyoideum-rohy jazylky-jiné části jazylky

3. opora žaber (vodní) - části jazylky (Tetrapoda)


4.-6. opora žaber (vodní) - chrupavky hrtanu (Tetrapoda)

7. opora žaber (Chondrichthyes) až vymizení (Tetrapoda)


EXOSKELEŤ (dermální) - jen kostěný

horní čelist: praemaxillare, maxillare


dolní čelist: dentale (mandibula), angulare



A. Hypothetical jawless condition




B. Mandibular arch functions as jaws




C. Jaws associated with braincase

Premandibular arches	Mandibular arch
Hyoid arch	Carotid arch
Vagal arches	Notochord


## V. Morfologie obratlovců




původ sluchových kůstek savců  
(Gaupp - Reichertova teorie)




# V. Morfologie obratlovců




**A. Hypothetical jawless condition**



**C. Hypothetical early tetrapod**




**B. Gnathostome**



**E. Placental mammal**

## V. Morfologie obratlovců




žralok

## V. Morfologie obratlovců

Žaberní oblouky ryb - branchiale

- ◆ pharyngobranchiale
- ◆ epibranchiale
- ◆ ceratobranchiale
- ◆ hypobranchiale


jazylkový komplex - hyale



Obr. 29. Kapr obecný (*Cyprinus carpio*) – kostra žaberního ústrojí z boční strany. 1 – basihyale; 2 – hypohyale; 3 – ceratohyale; 4 – epihyale; 5 – urohyale; 6 – hřeben urohyale; 7 – interhyale; 8 – chrupavčitá podpůrná tyčinka; 9 – os pharyngeum, kost požeráková; 10 – pharyngobranchiale; 11 – epibranchiale; 12 – ceratobranchiale . Podle Urbanowiczové

## V. Morfologie obratlovců

## Rozvoj dermálního viscerocrania - max. ryby (Halecomorphi - kaprouni; „Holostei“: Amiiformes)




### **B. Bones of the cranial skeleton of *Amia***

# V. Morfologie obratlovců

## Připojení viscerocrania k neurocraniu

primární  
autostylie  
(euautostylie)



hyostylie

amphistylie

sekundární  
autostylie  
(metaautostylie)

## V. Morfologie obratlovců

### Kostra končetin

„Agnatha“

nepárový ploutevní lem - chrupavčité paprsky  
**Gnathostomata**

vodní obratlovci - ichthyopterygia (ploutve)

**A) nepárové**

pinna                  caudalis (C)  
                          dorsalis (D)  
                          analis (A)

fixace v trupu: pterygiophory (D, A), páteř (C)

volná končetina: paprsky

ceratotrichia - lepidotrichia - camptotrichia  
(Chondrichthyes)      (Actinopterygii)      (Dipnoi)

**B) párové**


pinnae                  pectorales (P)  
                          ventrales (V)

fixace v trupu: pásmá (přední - lopatkové, zadní - pánevní)

volná končetina: basalia - radialia - paprsky


## V. Morfologie obratlovců

pinna caudalis




## V. Morfologie obratlovců

heterocerkní




A. Caudal skeleton of *Polyodon* (heterocercal)

urostyl  
hypuralia



homocerkní



D. Caudal skeleton of *Latimeria* (difycercal)


difycerkní

## V. Morfologie obratlovců

### Vznik párových ploutví

metapleurová teorie:

rozpad párového ploutevního lemu (metapleur)



## V. Morfologie obratlovců

### Chondrichthyes

#### pinnae pectorales



pásмо: coracoscapulare = scapulocoracoid  
(k lebeční bázi)

volná končetina:

basalia, radialia  
ceratotrichia

#### pinnae ventrales

ischiopubicum (k páteři)  
= puboischiadicum



## V. Morfologie obratlovců

### Sarcopterygii (archipterygium)

pinnae pectorales

pásмо: scapulocoracoid („Rhipidistia“)  
scapula + coracoid (Dipnoi)

clavicula, (interclavica)  
komplex cleithrum



volná končetina:

basalia, radalia  
lepidotrichia (camptotrichia)

biseriální

uniseriální

uniseriální



## V. Morfologie obratlovců

### Actinopterygii

pinnae pectorales

pásмо: scapulocoracoid

clavicula (jen u starobylých)  
komplex cleithrum

pinnae ventrales

basipterygium

volná končetina:

jen zkrácená radialia  
prodloužená lepidotrichia

jen prodloužená lepidotrichia

## V. Morfologie obratlovců

### Tetrapoda

#### Suchozemští obratlovci - chiropterygia

přední

pásмо: scapula + procoracoid  
+ (meta)coracoid (jen u ptakořitných)

zadní

pelvis (ilium, ischium, pubis)

---

clavícula, (interclavícula, cleithrum)

volná končetina:

stylopodium: humerus

femur

zeugopodium: ulna + radius

tibia + fibula

autopodium: carpalia (12)

tarsalia (12)

metacarpalia (5)

metatarsalia (5)

digitali (5?)


digitali (5?)

2-3-4-5-3

2-3-4-5-4


## V. Morfologie obratlovců

Vznik chiropterygií čtvernožců (Tetrapoda)  
přeměnou uniseriálního archipterygia ryb „Rhipidistia“



118

119




117

b

c

118


## V. Morfologie obratlovců




# V. Morfologie obratlovců

## Tetrapoda

přední(anterior)



zadní (posterior)



# V. Morfologie obratlovců

## 3. Svalstvo

somatická svalovina - příčně pruhovaná, z myotomu somitů

viscerální svalovina - ze splanchnopleury, hladká útrobní,

srdeční sval

branchiální svalovina - z BNL, příčně pruhovaná žaberní  
(pohyb čelistí, žvýkací a mimické svaly savců)

kožní svalovina - z dermatomu (čepýření peří, ježení srsti)

### Metamerie (vodní)

- boční sval




- myomery a myosepta

- epaxiální a hypaxiální

část, septum

horizontale

### Rozpad bočního svalu (suchozemští)




Aves

# V. Morfologie obratlovců

## 4. Nervová soustava

NS = CNS + periferní nervstvo

mozek      mícha  
míšní  
hlavové (10, 12)  
vegetativní systém:  
sympaticus a parasympaticus



### Mozek - encephalon

A) 2 váčky

1. Prosencephalon

2. Rhombencephalon

(7 rhombomer - NL,  
hlava, Hox geny)

B) 3 váčky

1. Prosencephalon

3. Mesencephalon

2. Rhombencephalon

C+D) 5 částí

4. Telencephalon

5. Diencephalon

3. Mesencephalon

6. Metencephalon

(cerebellum)

pons Varoli


7. Myelencephalon

Otx  
Emx

Pax  
Hox

Šedá hmota: bazální ganglia - subpallium (striatum, septum)  
kůra (cortex) - pallium

# V. Morfologie obratlovců



Fylogeneze šedé hmoty konc. mozku

## Pallium:

- mediální
- dorzální
- laterální



## Subpallium:

- striatum
- septum



dorzální komorový hřeben (plazi a ptáci)

- stereoskopické vidění

hippocampus savců - sensorické funkce, explorační chování, krátkodobá paměť


piriform - laterální pallium savců, olfaktorické informace

septum - limbický systém

striatum - koordinace pohybu


# V. Morfologie obratlovců

## Mozek - encephalon



pa - paraphysa, op - pineální org., epi - parietální org. (epiphysa)

## V. Morfologie obratlovců



Chondrichthyes

Teleostei

Amphibia

Reptilia

Aves

Mammalia

„Agnatha“ - diencephalon

Teleostei - mesencephalon


ostatní - telencephalon

# V. Morfologie obratlovců

Mícha - medulla spinalis

bílá hmota míšní

šedá hmota míšní



## V. Morfologie obratlovců


### Vegetativní nervstvo

truncus sympatheticus  
(sympatický kmen)

mícha (medulla spinalis)

sympaticus

parasympaticus



# V. Morfologie obratlovců

## 5. Smysly



Smyslové buňky: primární a sekundární

Receptory:      a) extero-, proprio-, entero-;  
                      b) chemo-, mechano-, radio- (foto-, termo-)

### • kožní receptory (exteroreceptory)

Volná nervová zakončení - bolest; Merkelovy terčky (sek.) - dotecky

Tělíska - Meissner, Pacini, Herbst - hmat;  
Krause, Rufini - chlad, teplo



## V. Morfologie obratlovců

### • zrak - inverzní komorové oko


1. bělima (+ rohovka), 2. cévnatka (+ duhovka, pupilla), 3. sítnice; přední a zadní komora, čočka (lens), řasnatý val (corpus ciliare)

sklivec  
(corpus vitreum)

sítnice (11 vrstev)  
(retina)

cévnatka  
(chorioidea)

bělima  
(sclera)




## V. Morfologie obratlovců

- zrak - akomodace

klid

na blízko

mihule a kostnaté ryby




zaostřování - akomodace

na dálku

m. retractor lentis

na dálku

paryby, starobylé ryby,  
obojživelníci





na blízko

m. protractor lentis

na dálku


Amniota - plazi, ptáci, savci



na blízko

## V. Morfologie obratlovců



- proudový orgán - neuromasty



## V. Morfologie obratlovců

- sluchově rovnovážný orgán - ucho

- A. vnitřní ucho - kostěný (perilympfa) a blanitý labyrinth (endolymfa); vestibulární aparát (U,S, DS)+ sluch (lagena - cochlea)
- B. střední ucho - středoušní dutina, tympanum, sluchové kůstky (1-columella, 3 - maleus, incus, stapes), oválné a kruhové okénko, Eustachova trubice
- C. vnější ucho - zevní zvukovod, boltec



## V. Morfologie obratlovců

- sluchově rovnovážný orgán - ucho

### A. vnitřní ucho

utriculus (U)

sacculus (S)

lagena (L) - cochlea

ducti semicirculares (2, 3),  
ampullae

Statické receptory:

maculae U, S, L

statokonie - drobné,

statolity (3 otolity) - velké

Kinetické receptory:


cristae d. semicircularii

Akustické receptory:

maculae L - papilla basilaris

(+ macula amphibiorum) -


Cortiho orgán




# V. Morfologie obratlovců

## 6. Trávicí soustava

- A) mihule
- B) žralok
- C) okoun
- D) skokan
- E) holub
- F) králík




ústní dutina  
hlítan  
jícen  
žaludek  
střevo



## V. Morfologie obratlovců

mihule






žralok

bahník

spirální řasa

## V. Morfologie obratlovců





pylorické výběžky - prodlužování střeva (střevní kličky) - diferenciace (tenké a tlusté střevo)

## V. Morfologie obratlovců

kur

složený žaludek přežvýkavců




vole (ingluvies), žlaznatý (proventriculus) - svalnatý žaludek (ventriculus) - postventriculus

# V. Morfologie obratlovců

## 7. Dýchací soustava


- žábry

žaberní váčky




mihule

žaberní přepážky



žralok

žaberní oblouky, skřele




kostnatá ryba


## V. Morfologie obratlovců

- žábry

paryby



ryby



# V. Morfologie obratlovců

- plynový měchýř


ductus pneumaticus

Physostomi

ovál a červené těleso

Physoclisti

- plícní vaky,  
plíce






## V. Morfologie obratlovců

- plíce

### pták

mesobronchus  
dorsibronchi  
ventrobronchi  
parabronchi  
vzdušné vaky




# V. Morfologie obratlovců

## 8. Cévní soustava

### Srdce


- sinus venosus
- předsíň (1, 2)
- komora (1, 2)  
(ne)úplná mezikomorová přepážka
- conus arteriosus  
nebo bulbus arteriosus  
(jen mihule, kaprouni a kostnaté ryby)



# V. Morfologie obratlovců

## 9. Urogenitální soustava


• nefron



B. Ammocoetes and larval lissamphibians


vnější glomerulus

(holonefros, pronefros)



vnitřní glomerulus  
(opisthonefros, mesonefros, metanefros)


## V. Morfologie obratlovců



- nefron

Malpighiho tělíska =  
glomerulus + Bowmannův váček

## V. Morfologie obratlovců




## V. Morfologie obratlovců

- ledviny - nefros



metamerie, vnější glomerulus  
koncentrace, vnitřní glomerulus



Holonefros - minohy  
a larvy červorů

Pronefros - přední  
ledvina mihulí,  
kostnatých ryb  
a pulců

Opistonefros -  
ledvina dospělých  
„Anamnií“

Mesonefros - ledvina  
embryí Amniot

Metanefros - ledvina  
dospělých Amniot

## V. Morfologie obratlovců

Skupina	Typ ledviny (~ nefros)					Močové cesty		Pohlavní cesty	
	holo~	pro~	opisto~	meso~	meta~	prim.	sekund.	prim.	sekund.
minohy	hatched								
mihule						black			
paryby		white					black		
ryby prim.						black		dark blue	
ryby kostnaté						black			black
larvy červorů	hatched	white							
larvy ostatních		dark blue							
ocasatí o.			black				white	black	
žáby			black				black	black	
embrya amniot			white	dark blue					
amniota					black		black	black	

prim. = primární močovod, resp. chámovod (Wolfova chodba),  
 příp. chámomočovod (žáby), chámovod (paryby, ocasatí)

# V. Morfologie obratlovců

## „ANAMNIA“

- opisthonefros
- varle

Amphibia

Chondrichthyes

Sarcopterygii

Actinopterygii

