

Zvětrávání

Zvětrávání - proces


Zvětrávání – chemická a fyzikální degradace hornin na relativně jemné částice (půdy a sedimenty) a rozpuštěné látky, klíčový prvek exogenního geochemického cyklu



- **salinita oceánů**
- **výživa pro biotu**
- **rudy**
- **transformace povrchu**
- **spotřeba H^+**
- **spotřeba CO_2**

Zvětrávání - posloupnost


Continued disruption of rock material




Physical breakdown extends, broadens original defects

Dearborn, Bull. Int'l Ass'n Eng. Geol. v9, 1974


Weathering effect on rock material



Dearborn, Bull. Int'l Ass'n Eng. Geol. v9, 1974



Mechanické zvětrávání



Zvětrávání bazaltové lávy na Havaii.

Mechanické zvětrávání

- Mrazové štípání
- Růst krystalů
- Působení tepla
- Kořeny rostlin



Pulpit, Lysefjord, severní Norsko.




Mount Whitney, Sierra Nevada.

Mechanické zvětrávání



Yellowstone National Park.



Ta Prohm u Angkoru, Kambodža.

Chemické zvětrávání

Chemické zvětrávání

Voda, kyslík, oxid uhličitý

Hydrolýza

Hydratace

Oxidace

Vyluhování

Oxidovaná půda na
Hawaii.



- prosté rozpouštění (určeno součinem rozpustnosti)
- rozpouštění karbonátů: $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{HCO}_3^-$
- oxidace: $\text{Fe}_2\text{SiO}_4 + 1/2 \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{H}_4\text{SiO}_4$
- hydrolýza: $\text{Mg}_2\text{SiO}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Mg}^{2+} + 4\text{OH}^- + \text{H}_4\text{SiO}_4$




Chemické zvětrávání



mnohotvárnost reakcí proti vysokoteplotním procesům (proč?)

Zvětrávání – jílové minerály


Zvětráváním horninotvorných minerálů vznikají jílové minerály: Variabilní zastupování Si^{4+} iony Al^{3+} , nábojová nevyrovnanost vrstev, kompenzována dalšími iony, vyměnitelné kationy, výměnná kapacita



Skupina

Obecný vzorec


Montmorillonit



Illit




Kaolinit




Zvětrávání - podmínky

Doplňující faktory, které ovlivňují zvětrávání


- Typ a struktura horniny
- Sklon svahů
- Klima
- Hrabavá zvířata, hmyz, červi
- Charles Darwin – červi – 2,5 kg/m²
- Čas



Rychlost fyz. zvětrávání




Rychlost chem. zvětrávání



Půda - profily


Půdy
Půdní profil
Půdní horizonty



- O_i** – listy a organický odpad, většinou nerozložený
- O_a** – organický odpad, částečně rozložený
- A** – tmavě zbarvený horizont směsi minerálů a organických látek, vysoká biologická aktivita
- E** – světle zbarvený horizont, ztráta jílových minerálů, organických látek, oxidů
- B** – maximální akumulace jílových minerálů, oxidů a organických látek
(K – v aridních oblastech, více než 50 % kalcitu, kaliche, hardpan)
- C** – zvětralý zdrojový materiál, někdy chybí
- R** – zdrojová hornina

Někdy horizonty úplně chybí
Někdy zvláštní – laterity (latere – cihla)

Půdy - profily






New Mexico, semiaridní klima.



Laterit, Indie.

Půda- struktura

- směs produktů zvětrávání, org. látek a zbytků původních hornin a vody
- typická půda 5 % organických látek, 95 % anorganických
- posloupnost vrstev (půdní profil); je závislé na klimatu (T, srážky atd.), vegetaci, času, podložní hornině



Geochemie půdy



- Acidobazické a výměnné reakce v půdách
- Makroživiny
- Mikroživiny
- Pesticidy a chemické odpady v půdách
- Ztráta půdy – dezertifikace

Eroze

Eroze větrem a vodou
Dopad dešťových kapek
Povrchový splach
Eolická eroze
(Aeolus – řecký bůh
větru)
Abraze



Eroze, Shawnee, Oklahoma.



Písečné duny, Danakii, Egypt.