



Fylogeneze a diverzita obratlovců – cvičení

Savci 2

**hlodavci (Rodentia)
zajícovci (Lagomorpha)**

Tomáš Bartoňíčka



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Hlodavci (Rodentia)

- ploskochodci
- neúplný chrup, redukce špičáků, praemolárů - **diastema**, 1 pář řezáků-velký řezák - **hlodák** - nemá kořeny, stále dorůstá, tvar stoliček, dlouhé a úzké tvrdé patro, volné zuby - páčidlo
- 1003
- 1003
- pachové žlázy asi
- 2000 druhů, v ČR 24 druhů ze 7 čeledí,
- 5 druhů nepůvodních (ondatra pižmová, potkan, krysa obecná, myš domácí, nutrie).

- Veverkovití (Sciuridae)
- Bobrovití (Castoridae)
- Nutriovití (Myocastoridae)
- Křečkovití (Cricetidae)
 - Ve druhé nejpočetnější čeledi hlodavců Cricetidae se podle současné koncepce systému rozlišuje šest podčeledí, z nichž v naší fauně mají zastoupení dvě – křečci a hraboši. Křečci (Cricetinae) a početnější hraboši (Arvicolinae) v jiném pojetí systému bývají obě skupiny rozlišovány na úrovni čeledí (Cricetidae a Arvicolidae, syn. Microtidae).
- Myšovití (Muridae)
- Tarbíkovití (Dipodidae)
- Plchovití (Gliridae)

Hlodavci (*Rodentia*)


Svalový výběžek stejně dlouhý nebo delší než kloubní, 1pár řezáků bez rýhy


čeleď: veverkovití (Sciuridae)

- na lebce široké čelní kosti, z nichž vybíhá na obě strany nadočnicový výběžek a vzadu zajařmový výběžek, brachyodontní M

- na přední tlapce jen 4 prsty
- ocas pokryt delší huňatou srstí
- 1 0 2 3
1 0 1 3
- veverka obecná (*Sciurus vulgaris*)
 - ◆ sysel obecný (*Spermophilus citellus*)
 - ◆ svišť horský (*Marmota marmota*)

veverka obecná (*Sciurus vulgaris*)





Obr. 112: Lebka a určovací znaky veverky obecné (a) a sysla obecného (b)

sysel obecný (*Spermophilus citellus*)



zadní okraj tvrdého patra
s hrotitým výběžkem






čeleď: bobrovití (Castoridae)

- plovací blány mezi prsty zadních noh, svaly na uzávěr uší a nozder
 - široký plochý ocas pokrytý šupinami
 - všechny nohy 5 prstů
 - hlodáky vpředu oranžové, malý podočnicový prostor
 - stoličky bez kořenů
 - $$\begin{array}{r} 1013 \\ \hline 1013 \end{array}$$
- ◆ bobr evropský (*Castor fiber*)

bobr evropský (Castor fiber)





vysoké korunky hypsodontních M, nízký a široký úhlový výběžek



Obr. 110: Lebka bobra evropského (a) a b. kanadského (b)

čeleď: nutriovití (Myocastoridae)

- velcí hlodavci
- nohy s 4 prsty, na zadní noze prsty spojeny plovací blánou
- ocas na průřezu okrouhlý, není zploštělý, štětinovité chlupy
- stoličky s kořeny, na skusné ploše 4 příčné lamely, velký podočnicový prostor vs bobr, hákovitý výběžek dolní čelisti
- vegetarián
- 1 0 1 3
1 0 1 3
 - ◆ nutrie (*Myocastor coypus*)



Obr. 111: Lebka nutrie

© Miloš Anděra





čeleď: křečkovití (Cricetidae) nebo Cricetinae




- do stran jařmové oblouky, stoličky s kořeny – brachyodontní (nízká korunka, silné kořeny), korunky stoliček se dvěma řadami hrbolků a uprostřed podélnou prohlubní
- 1 0 0 3
1 0 0 3
 - ◆ křeček polní (*Cricetus cricetus*)

křeček polní (*Cricetus cricetus*)





podobnost s lebkou potkana
podočnicový otvor, hřebeny



Obr. 116: Lebka, alveoly
a zuby křečka polního

hrbolky na M ve dvou podélných řadách, dlouhý a úzký svalový výběžek

čeleď: hrabošovití (Arvicolidae) nebo Arvicolinae


6 druhů

- vysoké zuby, na vrcholcích plocha rozdělena na samostatná políčka – hypsodontní, trojuhelníková struktura třecí plochy
- nemají kořeny (až na *Myodes glareolus* a *Ondatra zibethicus*)
- krátký ocas
- krátké ušní boltce, osrstěné
- malé oči ukryté v srsti
- zakulacená lebka
- 1 0 0 3
1 0 0 3

čeleď: hrabošovití (Arvicolidae)

- ◆ onatra pižmová (*Ondatra zibethicus*) – velká lebka
- ◆ hryzec vodní (*Arvicola amphibius*) – střední lebka
- ◆ norník rudý (*Clethrionomys*, *Myodes glareolus*) – malá lebka
- ◆ hraboš polní (*Microtus arvalis*)
- ◆ hraboš mokřadní (*Microtus agrestis*)
- ◆ hrabošík podzemní (*Microtus subterraneus*)


stoličky s vysokými korunkami - hypsodontní
stoličky s nízkými korunkami - brachyodontní



ondatra pižmová (*Ondatra zibethicus*)

nemá plovací blány, allochtonní, zploštělý ocas bočně, stoličky s kořeny






Obr. 117: Lebka a tvar třecích ploch stoliček ondatry (a) a hryzce vodního
(bm – mladý jedinec, bs – starý jedinec)

hryzec vodní (*Arvicola amphibius*)

svalový a úhlový výběžek



dlouhý ocas, krátce ostrstěný

5 mozolů na zadní noze (ostatní 6, ne M.sub.), hypsodontní chrup

norník rudý (*Clethrionomys*, *Myodes glareolus*)

velké boltce, delší ocas (1/2 těla), brachyodontní, zaoblené tvary dvůrků




rod *Microtus* – tvrdé patro s většími prohlubněmi, hypsodontní chrup

hraboš polní (*Microtus arvalis*)




nepigmentovaná
chodidla,
hustě ale krátce
osrstěný boltec



hraboš mokřadní (*Microtus agrestis*)




větší, chodidlo nad 18mm,
tmavě pigmentované chodidlo
delší chlupy řídké na boltci




Obr. 118: Lebka hraboše a určovací znaky norníka rudého (a), hraboše polního (b) a h. mokřadního (c)


hrabošík podzemní (*Microtus subterraneus*)




Obr. 121: Lebka a určovací znaky hrabošíka podzemního (a) a h. tatranského (b)

nejmenší z našich hrabošů, malé boltce v srsti
chodidlo pod 15,5mm; 5 mozolů, splynutí dvůrků v přední části M
delší chlupy řídké na boltci, málo se pohybuje





Obr. 119: Tvar třecích ploch stoliček u hraboše polního (a), h. mokřadního (b) a h. hospodárného (c)



Obr. 120: Tvar třecích ploch stoliček u norníka rudého (a), hraboška podzemního (b) a h. tatranského (c)


čeleď: myšovití (*Muridae*)

- bunodontní chrup
- oblé hrbolky ve 3 řadách (M1-3)
- dlouhý ocas
- slabě vyvinuty chlupy na ocase (šupinatý)
- boltce velké, řídce ochlupené
- velké oči
- lebka vybíhá v rypáček
- 1 0 0 3
1 0 0 3

čeleď: myšovití (Muridae)

- ◆ potkan (*Rattus norvegicus*)
- ◆ krysa (*Rattus rattus*)
- ◆ myš domácí (*Mus musculus*)
- ◆ myšice lesní (*Apodemus flavicollis*)
- ◆ myšice křovinná (*Apodemus sylvaticus*)
- ◆ myšice malooká (*Apodemus uralensis*)
- ◆ myšice temnopásá (*Apodemus agrarius*)
- ◆ myška drobná (*Micromys minutus*)

myšice (*Apodemus* sp.) vs myš (*Mus* sp.)



myšice lesní (*Apodemus flavicollis*)


myšice křovinná (*Apodemus sylvaticus*)



A




B



C



D



myšice křovinná (*Apodemus sylvaticus*)

ocas kratší těla, méně kontrastní, skvrna malá podlouhlá i chybí



© Miloš Anděra



myšice lesní (*Apodemus flavicollis*)

určení? tlapka nad 24mm, dlouhý ocas, žlutá skvrna se větví u nohou a napojuje na bok



myšice temnopásá (*Apodemus agrarius*)


myšice malooká (*A. uralensis*)



kratší ocas, tmavý pásek,
menší řezákový otvor,
nadočnicové lišty



menší uši, tlapka 18,5-19,5mm,
nížiny J Moravy, stepní,
dvoubarevný ocas



Obr. 126: Lebka a určovací znaky myšice křovinné (i lesní) (a),
m. temnopásé (b) a *m. malooké* (c)

myš domácí (*Mus musculus musculus*)

kratší ocas, bílé břicho

myš západoevropská (*M. m. domesticus*)

ocas stejný jako tělo, tmavší břicho



myška drobná (*Micromys minutus*)

žlutavá, dlouhý ovíjivý ocas, drobné boltce



potkan (*Rattus norvegicus*)


ocas kratší než tělo, boltce při přehrnutí nedosahují k očím,
šedohnědý hřbet



krysa (*Rattus rattus*)

delší ocas, boltce k očím, hřbet černý či šedý, hlava protáhlá





Obr. 127: Lebka a určovací znaky krysy obecné (a) a potkana (b)


čeleď: tarbíkovití (Dipodidae) nebo myšivkovití (Zapodidae)

- drobní, dlouhý ocas, prodloužené zadní končetiny
 - na přední noze 4 prsty
 - stoličky mají kořeny- brachyodontní, na skusné ploše hrbalky jako u myšovitých
 - 1 0 1 3
1 0 0 3
-
- ◆ myšivka horská (*Sicista betulina*)


myšivka horská (*Sicista betulina*)



dlouhý ocas, tmavý pruh, vyšší polohy hor, velké podočnicové otvory
(*Micromys* má malé)




Obr. 124: Lebka a určovací znaky myšky drobné (a) a myšivky horské (b)



Obr. 125: Zuby myši domácí (a), myšky drobné (b) a myšivky horské (c)

čeleď: plchovití (Gliridae)

- soumračná - noční aktivita
- stromy, keře
- huňatý ocas
- na předních nohách 4, na zadních 5 prstů
- stoličky s kořeny a s příčnými, rovnoběžnými hrbolek na žvýkací ploše
- hibernace (některí až 8 měsíců)
- $$\begin{array}{r} 1013 \\ \hline 1013 \end{array}$$



čeleď: plchovití (*Gliridae*)

- ◆ plch velký (*Glis glis*)
- ◆ plšík lískový (*Muscardinus avellanarius*)
- ◆ plch zahradní (*Eliomys quercinus*)
- ◆ plch lesní (*Dryomys nitedula*)


plch velký (*Glis glis*)




plšík lískový (*Muscardinus avellanarius*)



bílá skvrna na hrudi, žemlová barva



plch zahradní (*Eliomys quercinus*)



uzdička až na krk, štětička na ocase, delší boltce

plch lesní (*Dryomys nitedula*)




www.naturfoto.cz


uzdička po ucho, S Morava – Jeseníky a Beskydy, K. Sněžník




M₃ M₂ M₁ P₄



M₃ M₂ M₁ P₄



b



c








d



e

Obr. 114: Zuby našich plchů
(vysvětlivky viz obr. 113)

Obr. 115: Zubní alveoly
našich plchů (vysvětlivky
viz obr. 113)



a




b



c



d



a

Obr. 113: Lebka plcha velkého (a)
a dolní čelist p. zahradního (b),
p. lesního (c) a plšíka lískového (d)

Zajíci, Zajícovci (Lagomorpha)

- konvergance s hlodavci
- hlodáky mají podélnou rýhu, sklovina je u nich i ze zadu, za prvním párem hlodáků ještě dva malé řezáky, hypsodontní chrup
- velká diastema
- hypsodontní chrup
- dlouhé boltce a chodidla na zadních nohou
- 2 0 3 3
1 0 2 3
- cekotrofie

Zajícovci (Lagomorpha)

čeleď: zajícovití (Leporidae)

svalový výběžek nízký, slabě naznačen
2 páry rezáků s rýhou

- ◆ zajíc polní (*Lepus europaeus*)
- ◆ králík divoký (*Oryctolagus cuniculus*)

zajíc polní (*Lepus europaeus*)



delší zadní nohy,
nidifugní mláďata
superfetace


Široké otvory
na konci tvrdého patra,
menší nadočnicové
výběžky

králík divoký (*Oryctolagus cuniculus*)


kratší nohy i boltce, nidikolní mláďata, kulatější hlava

úzké otvory na konci tvrdého patra, větší nadočnicové výběžky





zuby zajíc polní



Obr. 144:
Lebka a určovací znaky
zajíce polního (a)
a králíka divokého (b)