

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IV

Vybrané typy environmentálních polutantů

(04/01)

Persistentní organické polutanty (POPs)

Persistentní, bioakumulativní a toxické látky (PBTs)

Persistentní toxické látky PTS



Definice, osud, modelování osudu a distribuce

Ivan Holoubek

RECETOX, Masaryk University, Brno, CR

holoubek@recetox.muni.cz; <http://recetox.muni.cz>

Koloběh chemických látek v prostředí



Organické sloučeniny v prostředí

Přírodní

Antropogenní


Degradabilní

Persistentní

Těkavé

Netěkavé

Organické polutanty



PBTs - základní charakteristika

- ↳ P - degradace v prostředí je pomalá nebo prakticky zanedbatelná - **persistence**;
- ↳ mohou se vyskytovat v plynné fázi nebo v kondenzovaných stavech (sorbované nebo rozpuštěné) za environmentálních podmínek - **semi-volatilita**;
- ↳ B - mají tendenci ke kumulaci v tukových tkáních různých organismů - **bioakumulace**;
- ↳ T - mají potenciálně škodlivé účinky na volně žijící organismy a lidskou populaci ve stopových množstvích - **toxicita**.

Legislativa, mezinárodní konvence - POPs - persistentní organické polutanty

PBTs - základní charakteristika


PBTs (POPs) jsou:

- ↳ Multifázové látky
- ↳ Vyznačují se dlouhou dobou života
- ↳ Jsou „nepolapitelné“
- ↳ Organismy na vyšších trofických úrovních jsou nejzranitelnější vůči působení těchto látek


Typy POPs v prostředí

- ↳ **POPs jsou přítomny v prostředí a biotě jako komplexní směsi**
 - v mnoha případech neznámého složení
- ↳ **Třídy POPs – různé strukturní typy – společné/různé typy toxických účinků**
- ↳ **Toxické interakce - aditivní/ne-aditivní, synergismus/antagonismus**
- ↳ **Různé typy mechanismů účinků**
- ↳ **Přírodní/dietární chemické látky**


Persistentní, s tendencí k bioakumulaci, toxické




PCDDs
 $(P = 4 \text{ to } 8)$




PCDFs
 $(P = 4 \text{ to } 8)$




PCBs
 $(P = 0 \text{ to } 10)$




γ -HCH




α -HCH




β -HCH




benzo[a]pyrene




**DDT
and metabolites**




HCB



Transport látek v prostředí




Osud látek v prostředí





Persistent Toxic Substances

- ↳ Persistent
- ↳ Bio-accumulative
- ↳ Toxic
- ↳ Transboundary movement
- ↳ POPs a subgroup



Rachel Carson
Photograph by Erich Hartmann,
Magnum Photos



Persistent Toxic Substances

Persistent

- ↳ Resists degradation in the environment
- ↳ Other chemicals, even though degrading faster in the environment, are persistent due to continuous release

Properties of persistent organic pollutants (POPs)

Persistency:

Half time in water > 2 months

Half time in soil > 6 months

Half time in sediments > 6 months

Air - half time > 2 days

Bioaccumulation:

Biological concentration factor for water biotop > 5000

Log Kow > 5

Effects of POPs

Bio-accumulative

- ↳ Concentrates in fatty tissue (lipophilic)
- ↳ Bio-accumulation factor in animals dependent on the Log K_{ow} – a measure of the affinity of chemicals to lipids
- ↳ Chemicals to be included – Log K_{ow} > 3 but molecular weight < 1 000 Daltons
- ↳ Chemical accumulates up the food chain




Damir Sagolj / Reuters

Effects of POPs

Toxicity

- ↳ Chemicals show chronic toxicity properties including : developmental, reproductive, carcinogenic, immunotoxic and neurotoxic activities in humans and wildlife
- ↳ ADI values are compared to NOEL/LOEL values to establish risk from exposure
- ↳ Substances with acute toxicity and with continuous release/exposure to be considered



Research Centre for Toxic Compounds in the Environment

<http://recetox.muni.cz>

Effects of POPs

The most important effects:

- ↳ Induction of AHH receptors
- ↳ Neurotoxicity
- ↳ Immunotoxicity
- ↳ Endocrine disruption:
 - estrogens/antiestrogens
 - antiandrogens
 - thyroid hormones

Chloracne

The Seveso accident



Research Centre for Toxic Compounds in the Environment

<http://recetox.muni.cz>

Chloracne

Viktor Yushchenko (Before and After)





Copyright 2004

Účinky POPs

Nejběžnější známé účinky:

- ↳ Ovlivnění AHH receptorů
- ↳ Neurotoxicita
- ↳ Imunotoxicita
- ↳ Endokrinní disruptory
 - estrogeny/antiestrogeny
 - antiandrogeny
 - thyroidní hormony

Expoziční cesty pro člověka a nehumánní organismy (van Leeuwen and Hermens 1995)



POPs v prostředí

POPs primárně emitované do atmosféry z různých zdrojů podléhají v atmosféře transformačním reakcím a mohou být transportovány na značné vzdálenosti, především sorbované na tuhé částice.

Z atmosféry jsou odstraňovány suchou a mokrou atmosférickou depozicí, její pomocí se dostávají do vody a půdy.

Vodním sloupcem se postupně dostávají do sedimentů.

Atmosférickou depozicí, vodou či půdou se mohou dostat do živých organismů všech typů a v nich se významně kumulovat.


POPs v prostředí

Transport a distribuce POPs v prostředí jsou určeny řadou fyzikálně-chemických vlastností a to se odráží v hodnotách charakteristik, jako jsou:

- ↳ rozpustnost ve vodě,
- ↳ tenze par,
- ↳ Henryho konstanta,
- ↳ rozdělovací koeficient n-oktanol-voda (K_{OW})
- ↳ sorpční koeficient pro organickou složku půdy či sedimentu (K_{OC}).


Trendy v PCBs kontaminaci

K.C. Jones, P. de Voogt / Environmental Pollution 100 (1999) 209–221




Trendy v environmentálních hladinách POPs


Emission or use



Concentration in Air




Concentration in Soil




Výměnné procesy vzduch – půda - trendy


In 1960:



In 1995:




Globální historické použití PCBs podle latitud a latitudální množství v půdách




PCB použití

(Meijer et al., 2003)

Množství v půdách



Globální PCBs emise



Procesy řídící transport POPs

Ovzduší : $g \leftrightarrow$ aerosolová fáze

Řízeno VP nebo K_{OA} (K_{OA} může být 10^{12})

Ovlivněno: persistencí, depozicí, expozicí

Voda: voda \leftrightarrow částice \leftrightarrow DOM \leftrightarrow Biota

Řízeno K_{OW}

Ovlivněno: persistencí, sedimentací, vytěkáváním

Sedimenty: minerál \leftrightarrow org \leftrightarrow voda \leftrightarrow biota

Řízeno K_{OW}

Relativně nízká přímá expozice – via bentické potravní řetězce

Půda: minerál \leftrightarrow vzduch \leftrightarrow org \leftrightarrow voda \leftrightarrow biota

Řízeno K_{OW} a K_{OA}

Ovlivněno: persistencí, vymýváním do spodních vod, povrchových vod, transportem do vegetace

Klíčové procesy transformací POPs

Ovzduší :

- ↳ Reakce s OH radikálem
- ↳ Fotolýza


Voda:

- ↳ biodegradace
- ↳ hydrolyza
- ↳ fotolýza
- ↳ oxidace


Půda:

- ↳ biodegradace
- ↳ povrchová katalýza
- ↳ hydrolyza


Typický gradient znečištění



PBTs – dálkový transport



Migrační procesy POPs




Wania, F., Mackay, D. 1996

Transportní mechanismy PBTs


Porozumění mechanismům environmentálního transportu vyžaduje poznat:

- ↳ Spojení, nejlépe kvantitativní, mezi zdroji PBTs a expozicí těmito látkami v daném regionu
- ↳ Informace o potenciálním transportu těchto látek z jedné oblasti do druhé (dálkový transport - long range transport)



Podobnosti PBTs vzhledem k transportním mechanismům



- ↳ persistence zvyšuje svůj relativní význam pro transport ve vztahu k transformacím řídícím osud kontaminantu
- ↳ distribuční charakteristiky vedou k významné přítomnosti v různých environmentálních složkách (ovzduší, voda, půda)



LRT chování „Multi-Hop“ PBTs (HCB)

Protože rychlosti depozice a vypařování jsou teplotně závislé, poskakování (hopping) je řízeno sezónními, periodickými teplotními změnami

Teplotní gradienty jsou v prostoru v kombinaci s atmosférickým mísením a zajišťují přednostní transport z teplejších do chladnějších regionů na globální i regionální úrovni




Transportní mechanismy ve vodě rozpustných PBTs

Chemické látky rozpustné ve vodě zůstávají ve vodné fázi, to znamená, že například těkání není uvažováno jako významný mechanismus dálkového transportu

Účinný LRT vodami vyžaduje vysokou persistenci ve vodě



Klasifikace PBTs dle rozdělovacích vlastností




3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


$\log K_{OA}$

Rozdělovací koeficient oktanol-vzduch
<http://recetox.muni.cz>


The Chemical Partitioning Space



defined by equilibrium phase partition coefficients between air, water and octanol



Transportní chování jako funkce rozdělovacích vlastností




Transport Focus: Long-Range Transport Potential

Characteristic Travel Distance, CTD

$$C_X = C_0 e^{-kX/U}$$

when $C_X/C_0 = 1/e (= 0.37)$, $X = U/k$

- ↳ C_X, C_0 = concentrations at distance X and origin
- ↳ k = first-order removal constant (deposition, degradation)
- ↳ U = average wind speed (4 m/s in models)



Matthies, M., Klasmeier, J., Beyer, A., Ehling, C. 2009. Assessing persistence and long-range transport potential of current-use pesticides. *Environ. Sci. Technol.* 43, 9223-9229.

Scheringer, M., Jones, K.C., Matthies, M., Simonich, S., van de Meent, D. 2010. Multimedia partitioning, overall persistence, and long-range transport potential in the context of POPs and PBT chemical assessments. *Integ. Environ. Assess. Mgmt.* 5, 557-576.

Fenner, K. et al. 2005. Comparing estimates of persistence and long-range transport potential among multimedia models *Integ. Environ. Sci. Technol.* 39, 1932-1942.

Transportní chování PBTs v různých regionech


Zatímco relativní význam různých transportních mechanismů se může lišit pro jednotlivé regiony, **základní mechanismy a principy LRT jsou platné globálně.**

Rozdíly v transportním chování mezi jednotlivými regiony jsou způsobeny variacemi:


- ↳ Klimatu (teplota, srážky, rychlosť větru, variabilita)
- ↳ Vzdušných a oceánických proudění
- ↳ V pokrytí povrchu (distribuce země/oceán, pokrytí zemského povrchu, topografie)
- ↳ Charakteristik hydrologického cyklu

Region-specifické vlivy na atmosférický transport

Vliv výměny vzduch-povrch a degradace



- ↳ Atmosférická degradace vzrůstá s koncentrací OH radikálů
- ↳ Atmosférická depozice vzrůstá s vyšší rychlosťí srážek, nižší teplotou, vyšší zatěží atmosférickými částicemi, vyšší rychlosť větru a atmosférické turbulence, vysoká retenční kapacita a drsnost povrchu
- ↳ Vypařování vzrůstá s vyšší teplotou, vyšší rychlosťí větru, snížením retenční kapacity povrchového materiálu



Potenciál pro atmosférický transport v regionech

Nižší zeměpisné šířky

Pro PBTs, které reagují rychle s OH, atmosférický LRT je v nižších zeměpisných šířkách zcela omezen. Látky přežívající déle atak OH radikálu za koncentrací v nižších zeměpisných šířkách, mohou mít vysoký potenciál pro rychlé cykly opakováných skoků.

Střední zeměpisné šířky

Pokud je LRT limitován účinnou degradací (relativně reaktivní, relativně těkavé) atmosférický LRT je vyšší v zimě, zatímco pro látky, u kterých je LRT limitován účinnosti depozice (relativně pomalé reakce, semi-volatilní) nastane opačný případ.

Vyšší zeměpisné šířky


Nízký potenciál pro vypařování (nízká T, pokrytí sněhem/ledem), nízká degradace (tma, zima) a depozice (malé srážky, omezené množství aerosolů, silná stratifikace)



Region-specifické vlivy na oceánický transport

Vlivy oceánických proudů


Regionálně, v povrchových vrstvách oceánů jsou řízen geostrofickými větry



- Existují velmi omezené experimentální důkazy pro mořský transport PBTs v nižších zeměpisných šírkách
- Množství důkazů velkoplošného transportu HCHs v severních vodách

Region-specifické vlivy na oceánický transport

Vlivy usazování částic a degradace



- Degradace v oceánické vodě je závislá na teplotě (hydrolýza), přítomnosti a aktivitě mikroorganismů (biodegradace), a intenzitě slunečního záření (fotooxidace). To předpokládá, že degradace je pomalejší ve vyšších zeměpisných šířkách a vyšší v teplejších, slunečných mořích s vysokou biologickou aktivitou.
- Gravitační usazování závisí na mořské biologické produktivitě a je vyšší v pobřežních mořích a zálovech.


Oceánický LRT je nejvýznamější ve vyšších zeměpisných šířkách, protože nízký výpar z vody, pomalé degradační rychlosti a omezené gravitační usazování budou zvyšovat dobu zdržení PBTs v chladných povrchových vodách.

Region-specifické vlivy transportu řekami

- ↳ **Rozpustnost ve vodě mnoha PBTs je příliš malá pro významný transport řekami v rozpuštěné fázi**
- ↳ **Transport málo rozpustných PBTs je pak závislý na transportu koloidních nebo suspendovaných částic sedimentů**
- ↳ **Závisí na hydrologickém režimu a charakteristikách povodí (relief, geologie, vegetační kryt a klima)**
- ↳ **Vysoké zátěže řek suspendovanými částicemi sedimentů jsou spojeny s vysokými proudovými podmínkami, v určitých obdobích na intenzitě odtoku a záplavách**
- ↳ **PBTs transportované řekami budou eventuálně kontaminovat pobřežní sedimenty**

Modelování osudu a distribuce

PBTs - výskyt v prostředí



Objemová koncentrace v rovnováze

$$OP \gg W > A$$

Objem environmentálních fází

$$A > W >> OP$$

Environmentální koncentrace

$$A \approx W \approx OP$$

PBTs - výskyt v prostředí

Výskyt:

- ↳ **Vyšší koncentrace v okolí zdrojů**
- ↳ **Klesá s rostoucí vzdáleností → výsledek zřed'ování, disperze, degradace (PCDDs)**


(SOLUTION OF POLLUTION IS DILUTION)

- ↳ **Vyšší koncentrace PBTs daleko od zdrojů:**
 - severní polární oblasti (PCBs, DDTs)
 - vyšší hladiny v organismech Eskymáků
 - PBTs ve vegetaci - vyšší hladiny na severu než v místech původního použití
 - α -HCH - nárůst koncentrací podél pacifického pobřeží - od tropů k pólu
 - vyšší koncentrace ve vyšších nadmořských výškách




Arctic Monitoring and Assessment Programme

AMAP Assessment Report: Arctic Pollution Issues, Figure 6·1



Srovnání hladin POPs v arktickém ekosystému

Transport POPs mimo EMEP region



Látka	Tok mimo, % roční emise
B[a]P	30
PCBs	50
PCDD/Fs	60
γ -HCH	75
HCB	80

PBTs – dálkový transport

Jaké je vysvětlení vysokých koncentrací a z toho plynoucí vysoké expozice ?


(1) Vlivy rovnovážného rozdělení

(2) Vlivy rychlých fázových změn

(3) Dynamické a kinetické vlivy

PBTs - rovnovážné rozdělení

(1) Vlivy rovnovážného rozdělení



pak



$$Z_1 > Z_2$$

$$C_1 > C_2$$

Fáze s vyšší Z má vyšší C $Z = f(T)$

PBTs - rychlé fázové změny

(2) Vlivy rychlých fázových změn



Když: $m_{po} = m_{před}$

a: $V_{po}, < V_{před}$

a/nebo: $Z_{po} < Z_{před}$

pak: $f_{po} > f_{před}$

a: $C_{po} > C_{před}$

Žádné nebo zanedbatelné ztráty

Změna fázového složení, nárůst T, snížení V, malé ztráty, f roste

PBTs - rychlé fázové změny

(2) Vlivy rychlých fázových změn



- ↳ Bioobohacování v GIT
- ↳ Sedimentace biogenních částic ve vodních ekosystémech
- ↳ Metamorfóza sněhu
- ↳ Rychlá mobilizace lipidických tkání

PBTs - dynamické vlivy

(3) Dynamické a kinetické vlivy

Dynamické vlivy vedoucí ke zvýšeným hladinám (advektivní transportní procesy)

$$N_{do} = D_{do} * f_{do}$$



$$N_{ven} = D_{ven} * f$$



$$D_v \gg D_{vně}$$

$$N_v \gg N_{vně}$$

pak:

$C = Z * f$ je vysoká

PBTs - kinetické vlivy

(3) Kinetické vlivy - základní principy vedoucí k vysokým vstupům a nízkým výstupům

- ↳ **Princip „nálevky“ (funneling)** - látka je z větší oblasti soustředěna v malé lokalitě,
- ↳ **Princip filtrace (filtering)** - látka dispergovaná v tekoucím mediu prochází porézním mediem a je oddělena,
- ↳ **Princip pumpy (pumping)** - látka je aktivně transportována z jednoho místa do druhého proti odporu,
- ↳ **Princip záchytu (trapping)** - látka je přinášena na místa, odkud se může dostat jen s obtížemi,
- ↳ **Princip zachování (preserving)** - látka je přinášena na místo, kde je snížena schopnost reagovat (degradace).

PBTs - kinetické vlivy - příklady

- ↳ Vzrůst depozice atmosférických kontaminantů v oblastech s vysokými srážkovými úhrny:


Dálkový transport do určitých oblastí (funnelling) - depozice plynů a aerosolů (pumping) - průnik vegetací a půdou (filtering) - záchyt vegetací a půdou (trapping)

- ↳ Biogenní fokusace:


Kumulace v organismech, jejich migrace a rozšíření do jiných oblastí (pumping - funnelilng)

- ↳ Jezera, povodí, sedimenty:

Kumulace látek v sedimentech (funneling, trapping, preserving) - sedimenty hlavní rezervoáry PBTs



PBTs - dynamické vlivy - organismus



Filtering - povrch těla, žábry, membrány


Pumping - GIT

Preserving - omezený metabolismus - kumulace v lipidické fázi

Trapping - záchyt mateřským organismem - přenos na potomstvo - plod, vajíčka, mateřské mléko

PBTs - fokusace v čase

Dynamické účinky v prostoru a čase



Prostorová a časová fokusace prostřednictvím arktického ledu:

Velké oblasti v Arktice kde led vzniká (Kara, Laptěvovo moře) a relativně malé, kde taje (Barentsovo moře, Buffinův záliv) - silné efekty:

„funneling“ - dálkový přenos - studená kondenzace, sibiřské řeky, Pacific +

„trapping“ - nízká T - nízký výpar - (depozice > kondenzace), velmi dlouhá doba zdržení, velmi stabilní vertikální stratifikace, malá primární produkce, bioobohacování

PBTs - lesní půdy


Zvýšené hladiny PBTs v lesních půdách

Vlivy rovnovážných rozdělení - lipidické kutikuly listů a jehličí mají vysoké hodnoty Z pro PBTs - záchyt.

Dynamické vlivy - transfer PBTs z atmosféry do půd je ovlivňován několika dílčími kinetickými procesy:

- filtering - záchyt (g) a (s) PBTs korunami stromů,
- pumping - sezónní opad a splach korun a kmenů stromů transportuje PBTs zachycené nadzemní částí do půdy,
- trapping - ztráty PBTs v půdách jsou omezené, lesní půdy jsou obecně méně „aktivní“ než zemědělské; povrchový splach a vymývání pod korunami stromů jsou omezeny díky ztrátám vody intercepcí a evapotranspirací.

Vlivy rychlých fázových změn - po opadu - během přeměny čerstvých listů na surový humus dochází k redukci objemu a rozklad opadu snižuje zádrž PBTs - koncentrace v surovém humusu mohou být až 10-krát vyšší než v jehličí na stejném místě.



Klasifikace LRT hodnoticích modelů

Všeobecný přístup k hodnocení potenciálů k LRT

Regionální přístupy k hodnocení LRT

Spatially Unresolved Regional Box Models

Spatially Resolved Regional Box Models


Highly Resolved, Meteorology-Based Regional Transport Models

Globální přístupy k hodnocení LRT

Spatially Resolved Global Box Models


Highly Resolved, Meteorology-Based Global Transport Models

Všeobecné přístupy k hodnocení LRT potenciálu




Jednoduché multisložkové modely mohou počítat potenciál k dálkovému transportu


Relativní velikost každého indikátoru umožní rozdělení, srovnání a zařazení různých PBTs s ohledem na jejich LRT potenciál




Regionální a globální modely PBTs osudu a transportu



Spatially Unresolved
Box Models



Spatially Resolved
Box Models



Highly Resolved,
Meteorology-Based
Transport Models

Vzrůst "realismu"
Vzrůst požadavků na data (emise, prostředí)


X

NE:

vzrůst spolehlivosti

vzrůst vyvratitelnosti nebo schopnost k hodnocení


POPCYCLING-Baltic – schéma modelu



Schematic representation of the types of environmental compartments in the POPCYCLING-Baltic model and how they are connected by diffusive and advective transport terms. A chemical can be released into six types of compartments, and degradation can occur in all types of media.

POPCYCLING-Baltic, Technical Report – Appendix 1 to Executive Final Summary Report

EMEP MSC East Model distribute POPs



Modelování osudu a transportu organochlorových látek v prostředí

Název modelu	Reference	Média	Látky	Vstupní data	Typ modelu
Level I	D. Mackay (1991)	Vzduch, voda, půda, sediment, suspendovaný sediment, ryby, aerosoly		Vlastnosti látek a prostředí, emise	Regionální
Level II	D. Mackay (1991)			Vlastnosti látek a prostředí, emise	Regionální
Level III	D. Mackay (2001)			Vlastnosti látek a prostředí, emise	Regionální
CalTox	T. McKone (1993)	Vzduch, voda, sediment, 3 půdní vrstvy, vegetace			Regionální
ChemCAN	CEMC, Kanada	Vzduch, sladká voda, sediment, ryby, půda, vegetace, pobřežní vody		Regionální data, vlastnosti látek, emisní data	Regionální pro Kanadu, (24 regionů) Level III model

Modelování osudu a transportu organochlorových látek v prostředí

Název modelu	Reference	Média	Látky	Vstupní data	Typ modelu
Soil Model	A. Di Guardo et al. (1994)	Různé typy půd, vzduch	Pesticidy	Vlastnosti látek a půd, dávka	Reakce a degradace látek v půdě
TaPL3	A. Beyer et al. (2000)	Vzduch, voda, půda, sediment		Vlastnosti látek a prostředí	
EVN-BETR	K. Jones, A. Sweetman, Velká Británie	Vzduch, vegetace, půda, povrchové vody, sediment, pobřežní vody	PCBs, PAHs, PCDD/Fs, PBDEs, OCs	Environmentální charakteristika Evropy, vlastnosti látek, kontaminace	Pro celý evropský kontinent (54 regionů)
ELPOS	M. Matthies, Německo	Vzduch, voda	65 pesticidů, 21 POPs, 23 prům. chemikálií		Level III vícesložkový model
HYSPLIT 4	P. Bartlett, USA	Atmosféra	POPs, HCB, PCBs, dioxiny	Meteorologická data, vlastnosti látek	Model atmosférického transportu
ChemRange	M. Scheringer (1996)	Půda, povrch oceánů, troposféra	Nepolární organické látky, těžké kovy	Vlastnosti látek a prostředí	Globální model
MSCE-POP	Viktor Shatalov, MSC-E	Atmosféra, půda, mořská voda, vegetace, sediment	PAHs, HCHs, PCBs, HCB, PCDD/Fs	Fyz.-chem.vlastnosti, meteorologická data, geofyzikální data, emise	Regionální a hemisferický model

Modelování osudu a transportu organochlorových látek v prostředí

Nejistoty modelových odhadů

- ↳ **Analýza nejistot – součást modelových odhadů**
- ↳ **Jaká je únosná míra nejistoty?**
- ↳ ***Screening x detailní studie***
- ↳ ***Osud v jedné komponentě x více komponent***

Modelování osudu a transportu organochlorových látek v prostředí


Nejistoty modelových odhadů

- ↳ Vstupní data – *kvantifikace emisí a jejich prostorově-časová charakterizace*
- ↳ Fyzikálně-chemická data – *omezené zdroje informací (validita údajů)*
- ↳ Data o transformaci v prostředí – *údaje o rychlosti transformací (místně specifické podmínky), obecná znalost dějů (př. nepřímá fotolýza)*
- ↳ Data o procesech – *znalost rozdělovacích koeficientů (sníh – okolí, atmosféra – rostlina,...)*
- ↳ Data o prostředí – *údaje o fyzikálních a chemických vlastnostech prostředí (dynamika parametrů)*
- ↳ Hodnocení pro komplexní směsi (odpady) – *heterogenita vlastnosti (nutné provádět extrapolace z typického zástupce ve směsi)*
- ↳ Validace výstupů z modelů – *cross-validation (kalibrační data), srovnání s objektivní realitou*

All models are wrong...some are usefull

Čím lépe matematické zákony popisují realitu, tím jsou méně přesné, a čím jsou přesnější, tím hůře popisují realitu.

Albert Einstein



Solution of pollution is not dilution