


# Fyziologie působení farmak a toxicických láték - úvod



vondracek@ibp.cz



machala@vri.cz



## Náplň předmětu/sylabus:


- ➡ Základní přehled chemických látek, které mohou cíleně nebo náhodně narušovat normální fyziologické procesy - antropogenní organické polutanty, farmaka, sekundární metabolity (dietární látky a neantropogenní toxiny); typy expozice - půda, vzduch, sedimenty, voda, potravní řetězec.
- ➡ Farmakokinetika, transport a akumulace cizorodých látek v těle.
- ➡ Principy regulace metabolismu cizorodých látek, enzymy I. a II. fáze biotransformace, antioxidační enzymy, III. fáze biotransformace.
- ➡ Základní typy toxicitních efektů cizorodých látek (genotoxicita, hepatotoxicita, neurotoxicita, imunotoxicita, nádorová promoce, endokrinní disrupce), toxicité farmak - cytostatika, hormonální přípravky, neuroleptické látky. Chemoprotektivní látky.




## Náplň předmětu:

- ➡ Deregulace signální transdukce cizorodými látkami.
- ➡ HLH/PAS rodina proteinů - HIF1 $\alpha$ , Ah receptor a jeho signalizační dráha.
- ➡ Jaderné receptory (ER, AR, PR, GR, TR, RAR/RXR, CAR, PXR, PPAR) - jejich ligandy, jejich úloha v regulaci metabolismu, fyziologické funkce zprostředkovované modulací cílových genů.
- ➡ Biosyntéza a metabolismus přirozených ligandů NR (steroidy, mastné kyseliny, lipidové mediátory); hormonální regulace biosyntézy.
- ➡ Principy hormonální regulace a endokrinní disruptce - bezobratlí.
- ➡ Endokrinní regulace a disruptce - obratlovci - ER, AR, PR, GR.
- ➡ Endokrinní disruptce, regulace embryonálního a postnatálního vývoje - obratlovci - RAR, RXR, PPAR, TR.

Fyziologické aj. funkce (homeostáze, vývoj, diferenciace, rozmnožování etc.) jsou založeny na KOMUNIKACI - na stovkách různých signálních drah. Jak endogenní signály, tak cizorodé látky (dietární, farmaka, environmentální cizorodé látky) ovlivňují komunikaci a tím regulace v buňkách:





Náplň předmětu:


# Fyziologie komunikace

Nízkomolekulární látky přírodního a antropogenního původu:

- **Signalizace, metabolismus**
- **Toxicita**
- **Fyziologické podmínky vs. lidské zásahy**

Mechanismy jejich působení na buněčné úrovni


# Regulace jsou komplexní a ve všech místech mohou být ovlivňovány cizorodými látkami




(Hanahan, Weinberg, Cell, 2000)

Již na úrovni jednobuněčných organismů je nezbytná schopnost:


1. Přijímat a identifikovat signály z vnějšího prostředí - např. za účelem výměny genetické informace;
2. Eliminovat toxické látky přijímané z vnějšího prostředí/vznikající jako vedlejší produkty metabolismu;






U mnohobuněčných organismů (živočichů) se vyvinuly stovky signálních drah a dalších mechanismů:

1. Embryonální a postnatální vývoj;
2. Regulace metabolismu a obecně homeostázy;
3. Pohlavní rozmnožování;
4. Tvorba a degradace signálních molekul i toxicických sloučenin; přenos signálu



## Zásahy z vnějšího prostředí:

1. Produkty sekundárního metabolismu rostlin a hub;
2. Zásahy člověka - cílené - aplikace chemických látek jako jsou pesticidy, syntetické feromony; terapie;
3. Zásahy člověka - nezamýšlené - toxické sloučeniny; odpad.
4. Pohyb a transformace cizorodých látek v prostředí (půda, voda, ovzduší, živé organismy); akumulace.



# Přehled farmak a dalších cizorodých látek, které modulují fyziologické, celulární, biochemické a molekulárně biologické procesy

## KLASIFIKACE CIZORODÝCH LÁTEK PODLE PŮVODU:


- přírodní látky (peptidy, biogenní aminy, alkaloidy, polyfenoly, xanthofily aj. barviva, terpenoidy, bakteriální toxiny, mykotoxiny);
- syntetická farmaka (farmaka vegetativního nervového systému, např.  $\beta$ -blokátory nebo inhibitory AChE, analgetika, cytostatika atd.);
- průmyslově produkované cizorodé látky (pesticidy, PCB, ftaláty, detergenty);
- průmyslové kontaminanty prostředí (dioxiny, PAH)
- anorganické látky (kovy, oxidy kovů, oxidy dusíku, dusičnany a dusitany aj.)

## KLASIFIKACE PODLE ÚČINKU:


- genotoxiny, tumorové promotery, chemické karcinogeny;
- endokrinní disruptory;
- neurotoxicke látky (inhibitory AChE,  $Ca^{2+}$ , dopamin aj.);
- imunomodulační látky;
- chemoprotektivní látky (antioxidanty, inhibitory enzymů signální transdukce, inhibitory CYP atd.)

# Přírodní látky odvozené z biogenních aminů

M-receptory  
(cholinergní  
receptory ACh)



interference  
se serotoninem  
a adrenalinem  
(„psychomime-  
tika“)




adrenergní  
receptory




D(-)-efedrin  
(redukcí OH: pervitin)


# Alkaloidy



NIKOTIN




MORFIN



CHININ


- nikotin - nikotinové (cholinergní) receptory v gangliích
- morfin - opioidní receptory (analgetický a euforický efekt)

# Alkaloidy: xanthiny




- antagonisté adenosinového receptoru (brání účinku adenosinu, který vyvolává spánek)
- inhibice fosfodiesterázy (zabrání hydrolyze cAMP - stimulace cAMP-dependentních kináz - regulace glykogenu, metabolismu cukrů a lipidů, zvýšené uvolňování katecholaminů (noradrenalinu a dopaminu) - mírná stimulace CNS a kardiovaskulárního systému)

# Polyfenoly




KYSELINA ELLAGOVÁ




EPIGALLOCATECHINGALLATE

- kys. elagová - příklad polyfenolických antioxidantů
- EGCG - hlavně v zeleném a bílém čaji


# Polyfenoly: flavonoidy




FLAVONY



GENISTEIN  
(ISOFLAVON)




KVERCETIN




RUTIN

- Chem. struktura: flavony, isoflavony, flavanony
- Zástupce fytoestrogenů - genistein (sója)
- Flavonoidy - antioxidanty, inhibitory MAPK, (anti)estrogeny
- Flavonoidy v přírodním stavu obsahují cukernou složku (rutin)


# Příklady farmak: cytostatika



6-AZAUURACIL




5-FLUOROURACIL




- cytostatika - řada mechanismů účinku; př. „antimetabolitů“ (azapyrimidinů) - inhibice syntézy DNA, chybná inkorporace do RNA - užití tam, kde převládají rychle proliferující buněčné populace



# Příklady farmak: cytostatika



CYKLOFOSFAMID






DOXORUBICIN



Deriváty CISPLATINY




- cyklofosfamid alkyluje guaninovou bázi; aktivní je až 4-OH-metabolit; využití v experim. výzkumu (blokuje biosyntézu)
- Cisplatina - kovalentní vazba s puriny; různá účinnost a cytotox. derivátů
- Doxorubicin - blokuje topoisomerase 2; oxidativní stres.

# Estrogeny / antiestrogeny




- 17 $\alpha$ -ethinylestradiol - první semisynthetický estrogen (aktivuje ER);
- Tamoxifen - antiestrogenní

# Inhibitory enzymů signální transdukce



- Indomethacin, ibuprofen - inhibitory cyklooxygenáz (inhibice syntézy prostaglandinů);
- U0126 - inhibitor proteinkináz MEK1/2 (signální dráha vedoucí k aktivaci ERK1/2)


# Průmyslové kontaminanty: organochlorové pesticidy




- DDT - otvírá sodíkové kanály v neuronech hmyzu; vysoko persistentní (persistentní je i metabolit DDE), bioakumulace;
- HCH aj. - široce používány v 1950-1970.

# Průmyslové kontaminanty: moderní pesticidy


(tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců - herbicidy, insekticidy, fungicidy - vys. účinnost i degradace)



ORGANOFOSFÁTY




KARBAMÁTY




- Organofosfáty - ireversibilní inhibice acetylcholinesteráz
- Karbamáty - reversibilní inhibice AChE
- Pyrethroidy (př. cypermethrin) - vysoce účinné insekticidy, odvozené od přírodního pesticidu kys. chrysantémové


# Polychlorované dibenzo-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly




2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin




Polychlorované dibenzofurany



Polychlorované bifenyly  
(209 různých kongenerů)




PCB 126 (koplanární,  
podobný dioxinům)




PCB 153 (nekoplanární,  
jiné mechanismy působení)

- Vysoce persistentní a biakumulující látky; planární kongenery (PCDD, PCDF, některé PCB jako např. PCB 126) působí přes aryluhlovodíkový receptor - „dioxinová“ toxicita
- Nekoplanární PCB - efekty na steroidní receptory, plasmat. membránu aj., vede k nádor. promoci a endokrinní disruptci.


# Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a jejich deriváty




Benzo[a]pyren



1-Nitropyren




Anthrachinon



1-Methylpyren

- PAH - mnohem méně persistentní než polychlorované látky; genotoxické a karcinogenní metabolismy; ale i efekty na AhR a další negenotoxické mechanismy toxicity.




# Průmyslové kontaminanty: nové neionogenní detergenty (nejsou na bázi sulfonanů a fosfátů)


Polyglykoétery alkylovaných fenolů



Alkylfenoly



- degradační produkty (4-nonyl-, oktylfenol) jsou toxické (narkotický účinek, efekty na steroidní receptory apod.) a relativně persistentní v prostředí



## REGULACE BUNĚČNÝCH PROCESŮ

- ➡ **Regulace tvorby aktivního enzymu:** indukce/suprese biosyntézy (negat., pozitivní kontrola transkripce, mutace), regulace enzymové aktivity (allosterická regulace, de/fosforylace, zpětno-vazebná regulace produktem metabolismu), stabilizace a degradace proteinů, nespecifické mechanismy (ztráta energie - NAD(P)H, ATP).
- ➡ **Typy signalizace mezi buňkami** (endokrinní, parakrinní, autokrinní, přímé komunikace - GJIC, „adherens junctions“ aj.).
- ➡ **Intracelulární signální transdukce** (bun. povrchové receptory, aktivace enzymů - MAPK, lipázy, sekundární „messengery“, transkripční faktory).
- ➡ **Extracelulární chemické stimuly:** hormony, růstové faktory, cytokiny, xenobiotika, dietární PUFA atd.