

# Užitkové rostliny IV

Vít Grulich


# Koření

- Přísady do pokrmů nebo nápojů s charakteristickou vůní
- Často dráždivá chuť
- Silice, alkaloidy, glykosidy
- Uplatnění v parfumerii, kosmetice, farmacii a medicíně
- Chuťová korigens
- Význam pro konzervaci
- Význam pro trávení
- Historický význam - motiv zámořských objevů

# Apiaceae

## ■ *Carum carvi* - kmín

- Vytrvalá bylina
- Původ: Evropa
- Pěstování: mírný pás
- Užití: dvounažky



# Apiaceae

## ■ *Coriandrum sativum* - koriandr

- Jednoletá bylina
- Původ: Blízký východ
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: dvounažky, čerstvé listy




*Coriandrum sativum*  
Apiaceae  
Gerald D. Carr

# Apiaceae

## ■ *Cuminum cyminum* - kmín římský

- Jednoletá bylina
- Původ: Středozemí a Blízký východ
- Pěstování: subtropy
- Užití: dvounažky



# Apiaceae

## ■ *Ferula assa-foetida* - čertovo lejno

- Vytrvalá bylina
- Původ: Střední východ
- Pěstování: tamtéž
- Užití: pryskyřice z kořenové hlavy



# Apiaceae

## ■ *Foeniculum vulgare* - fenykl

- Vytrvalá bylina
- Původ: Středozemí
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: dvounažky



*Foeniculum vulgare* Mill.

©2001 Herbarium Virtual Universitat Illes Balears



# Apiaceae

## ■ *Pimpinella anisum* - anýz


- Jednoletá bylina
- Původ: v. Středozemí
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: dvounažky



# Apiaceae

## ■ *Trachyspermum ammi* - ajwan

- Jednoletá bylina
- Původ: Blízký východ – Indie
- Pěstování: Írán a Indie
- Užití: dvounažky, nať



# Capparaceae

## ■ *Capparis spinosa* - kapary


- Poléhavý keř
- Původ: Od Středozemí do Indie
- Pěstování: subtropy
- Užití: poupatá



# Fabaceae

## ■ *Trigonella foenum-graecum* řecké seno

- Jednoletá bylina
- Původ: v. Středozemí a Blízký východ
- Pěstování: subtropy
- Užití: klíčky, nať a semena



# Illiciaceae

## ■ *Illicium* - badyáník

- Stálezelený strom
  - *Illicium verum* - Jv. Asie
  - *Illicium religiosum* - Japonsko
- Pěstování: tamtéž
- Užití: souplodí měchýřků a semena



# Iridaceae

## ■ *Crocus sativus* - šafrán

- Vytrvalá bylina
- Původ: asi Blízký východ
- Pěstování: subtropy
- Užití: blizny



# Lamiaceae

## ■ *Calamintha montana* - saturejka zimní

- Vytrvalý polokeř
- Původ: Středozemí
- Pěstování: mírný pás
- Užití: nať



# Lamiaceae

## ■ *Hyssopus officinalis* - yzop

- Vytrvalý polokeř
- Původ: Středozemí
- Pěstování: mírný pás
- Užití: nať





Foto: Arne Anderberg



# Lamiaceae

## ■ *Majorana hortensis* - majoránka

- Jednoletá až vytrvalá bylina
- Původ: v. Středozemí
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: nať



# Lamiaceae

## ■ *Mentha* - máta

- Jednoleté až vytrvalé bylinky
- Původ: Evropa
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: nať



*Mentha × crispa*



*Mentha × piperita*

# Lamiaceae

## ■ *Ocimum* - bazalka

- Jednoleté a vytrvalé bylinky a polokeře
  - *Ocimum basilicum* - Středozemí
  - *Ocimum gratissimum* - Afrika
  - *Ocimum sanctum* - j. Asie
- Užití: nať



*Ocimum basilicum*

# Lamiaceae

## ■ *Origanum vulgare* - dobromysl

- Vytrvalá bylina
- Původ: j. Evropa a z. Asie
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: nať



M06002  
mbleeker@euronet.nl

# Lamiaceae

## ■ *Rosmarinus officinalis* - rozmarýn

- Vytrvalý polokeř
- Původ: Středozemí
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: nať



# Lamiaceae

## ■ *Salvia officinalis* - šalvěj

- Vytrvalý polokeř
- Původ: v. Středozemí
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: nať



# Lamiaceae

## ■ *Satureja hortensis* - saturejka

- Jednoletá bylina
- Původ: Středozemí
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: nať



# Lamiaceae

## ■ *Thymus vulgaris* - tymián

- Vytrvalý polokeř
- Původ: Středozemí
- Pěstování: mírný pás a subtropy
- Užití: nať



Thymus vulgaris L.  
©Thomas Schoepke  
[www.plant-pictures.com](http://www.plant-pictures.com)


# Lauraceae

## ■ *Cinnamomum verum* - skořicovník

- Stálezelené stromy a keře
  - *Cinnamomum verum* - j. Asie
  - *Cinnamomum cassia* - j. Čína
  - *Cinnamomum burmanii* - jv. Asie
- Pěstování: tamtéž
- Užití: borka



ko-ojin



# Lauraceae

## ■ *Laurus nobilis* - vavřín

- Stálezelený keř nebo stromek
- Původ: Středozemí
- Pěstování: subtropy
- Užití: listy



# Myristicaceae

## ■ *Myristica* - muškátovník

- Stálezelené stromy a keře
  - *Myristica fragrans* - Moluky
  - *Myristica argentea* - Moluky
- Pěstování: tamtéž
- Užití: bobule: oplodí a semeno




# *Myristica*



# Myrtaceae

## ■ *Pimenta dioica* - pimentovník

- Stálezelený dvoudomý strom
- Původ: Stř. Amerika
- Pěstování: tropy
- Užití: plody (bobule)



# Myrtaceae

## ■ *Syzygium aromaticum*

- hřebíčkovec

- Stálezelený strom
- Původ: Moluky
- Pěstování: tropy
- Užití: poupatá



# Orchidaceae

## ■ *Vanilla planifolia*

- vanilka

- Bylinná liána
- Původ: Mexiko
- Pěstování: tropy
- Užití: tobolky




# Piperaceae

© 2001 David E. Lemke

## ■ *Piper* - pepř

*Piper nigrum*

- Bylinky nebo keře, často ovíjivé
  - *Piper nigrum* - jz. Indie
  - *Piper longum* - sv. Indie
  - *Piper cubeba* - Indonésie
  - *Piper guineense* - z. Afrika
- Pěstování: subtropy
- Užití: bobule, semena







*Piper longum*



*Piper cubeba*





*Piper guineense*

# Poaceae

## ■ *Cymbopogon citratus* - citronela


- Vysoká tráva
- Původ: tropy Starého světa
- Pěstování: tamtéž
- Užití: listy



# Ranunculaceae

## ■ *Nigella sativa* - černucha

- Jednoletá bylina
- Původ: Blízký východ
- Pěstování: tamtéž
- Užití: plody



# Rutaceae

## ■ *Schinus molle* – růžový pepř

- stálezelený strom
- Původ: jižní Amerika
- Pěstování: subtropy a tropy
- Užití: sušené peckovice



# Rutaceae

## ■ *Schinus terebinthifolia*


- stálezelený strom
- Původ: jižní Amerika
- Pěstování: subtropy a tropy
- Užití: sušené peckovice



# Rutaceae

## ■ *Zanthoxylum piperitum* sečuánský pepř

- stálezelený keř
- Původ: Čína
- Pěstování: subtropy
- Užití: tobolky



# Solanaceae

## ■ *Capsicum* - paprika

- Bylinky a keře
  - *Capsicum annuum*
  - *Capsicum frutescens*
  - *Capsicum chinense*
- Původ: J. a Stř. Amerika
- Pěstování: mírný pás až tropy
- Užití: bobule

*Capsicum frutescens*



*Capsicum chinense*

# Zingiberaceae

## ■ *Alpinia* - galgán


- Vytrvalá bylina
  - *Alpinia galanga*
  - *Alpinia officinarum*
- Původ: jv. Asie
- Pěstování: tropy
- Užití: oddenek



# Zingiberaceae

## ■ *Curcuma longa* - kurkuma

- Vytrvalá bylina
- Původ: jv. Asie
- Pěstování: tropy
- Užití: oddenek



# Zingiberaceae

## ■ *Elettaria cardamomum* kardamom

- Vytrvalá bylina
- Původ: jv. Asie
- Pěstování: tropy
- Užití: semena



# Zingiberaceae

## ■ *Zingiber officinale* zázvorovník

- Vytrvalá bylinná
- Původ: jv. Asie
- Pěstování: tropy
- Užití: oddenek

