



# Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin

## Historie systematické botaniky

### Petr Bureš




evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


# Historie systematické botaniky a vývoj jejích metod

Zpočátku uspořádání rostlin jen nevědomé uspořádání kapitol či popisů rostlin v knize, bez explicitní potřeby klasifikovat.

Od antiky až do renesance (zhruba do 16. století) byla botanika aplikovanou vědou = součástí lékařství, farmacie a alchymie




# Antické Řecko (4–3. stol. př. Kr.) – Theophrastos



**Theophrastos**  
371-287 př. Kr.



gymnasiarcha Lykeionu v Athénách




Renesanční vydání  
*Historia plantarum*

Peri fyton historias = **Historia plantarum**; ca 500 druhů rostlin hlavně středomořských ale také z výprav Alexandra Makedonského do V Asie.

Klasifikace na habituálním principu: stromy, keře, byliny vytrvalé, byliny jednoleté

# Antický Řím (počátek letopočtu) – Dioscorides




**Pedanius Dioscorides**  
1 stol.

Lékař římských legií – prošel s nimi mnohá území, kde sbíral neznámé rostliny

Dioscorides sbírající rostliny během pochodu římských legií – ilustrace Roberta Thoma z r. 1950




Dioscorides popisující mandragoru – obraz Ernesta Boarda z r. 1909



Poprvé užil termín **botaniké** = nauka o rostlinách v díle **Peri hyles iatrikes** = **De materia medica**

# Antický Řím (počátek letopočtu) – Dioscorides

Byzantský přepis  
Dioskoridova  
*De materia medica*  
6. stol.




Řecký přepis  
Dioskoridova  
*De materia medica*  
10. stol.



Arabský přepis  
Dioskoridova  
*De materia medica*  
14. stol.






Renesanční latinské  
vydání Dioskoridova  
*De materia medica*  
1554



# Dioscorides – inspirace renesančních bylinářů

Mattioliho  
*Comentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis*  
1554

České vydání Mattioliho  
Herbáře  
1558



# Renesanční bylináře (16 - 17. stol)




Petr Bureš: Prezentace přednášky Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - část 2.


# Němečtí renesanční otcové botaniky (16. stol.)



**Otto Brunfels**  
1488 - 1534




**Hieronymus Bock**  
(Tragus)  
1498 - 1554




**Leonard Fuchs**  
1501 - 1566

Habituálně podobné druhy např. čeledí *Asteraceae*, *Apiaceae*, *Lamiaceae* pohromadě = intuitivně přirozené uspořádání na habituálním principu

Fenomenální  
ilustrace Hanse  
Weiditze v  
Brunfelsově  
herbáři




Fuchsův kapesní atlas  
Historia stirpium, 1549



Petr Bureš: Prezentace přednášky Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - část 2.

# Herbáře = kolekce preparovaných rostlin

Vynálezce herbarizace rostlin = Luca Ghini, prefekt botanické zahrady v Pise.



Luca Ghini



JAN FRANTIŠEK BECKOVSKÝ,

kněz ryt. řádu křížovníků s červenou hvězdou, historik český.  
Zanechal nejstarší český herbář (sbírku sušených rostlin).

\* 18. VIII. 1658 v Německém Brodě, † 26. XII. 1725 v Praze.  
Reprodukováno podle rytiny v *Přelomových sAbbildungens*, díl II.  
(Z výtisku *Dobroveská* v Knihovně Národního muzea v Praze.)


Nejstarší herbářovou sbírkou vytvořenou v Čechách je herbář Jana Františka Beczkovského, křížovníka řádu s červenou hvězdou. (Přelom 17/18. stol.)

ČR je z hlediska počtu herb. položek na hlavu na 5. místě na světě.

Před námi je Švýcarsko, Švédsko, Finsko a Rakousko.

# Herbář je nepřekonanou konzervační metodou

1. uchovává data o morfologické variabilitě, geografickém rozšíření, ...
2. dává možnost kontroly těchto dat
3. z herbářových položek lze také na rozdíl od literárních dat či počítačových databází izolovat DNA
4. jedinou formou jak uchovávat nomenklatorické typy



# Herbářové sbírky nad 30 tis. v České republice a na Slovensku (stav v r. 2014)



# Největší světové herbáře (nad 3 miliony položek – stav v r. 2014)



Muséum National d'Histoire Naturelle	Paris, France	P	8
New York Botanical Garden	Bronx, New York, USA	NY	7,3
Komarov Botanical Institute	St. Petersburg, Russia	LE	7,2
Royal Botanic Gardens	Kew, England, UK	K	7
Conservatoire et Jardin botaniques	Geneva, Switzerland	G	6
Missouri Botanical Garden	St. Louis, USA	MO	5,9
British Museum of Natural History	London, England, UK	BM	5,2
Harvard University	Massachusetts, USA	GH	5
Naturhistorisches Museum	Wien, Austria	W	5


# Z čeho sestává herbářová scheda?

Musí na ní být:

1. naleziště
2. stanoviště
3. sběratel
4. rok


Je vhodné aby na ní bylo:

5. jméno rostliny
6. jméno herbáře
7. datum
8. nadmořská výška / zeměpisné souřadnice





# V renesanční bylinářích nebyly rostliny hierarchicky klasifikovány

bylo jich několik set  
200-500





jednoúrovňová (**lineární**) klasifikace =  
přiřazení jmen k objektům



klasifikace hierarchická

Příkladem vynuceného přechodu od lineární klasifikace ke klasifikaci hierarchické je knihovna



# Umělé hierarchické systémy rostlin (konec 16. stol)



italský lékař a botanik **Andrea Cesalpino**, osobní lékař papeže Klimenta VIII. Dílo: *De plantis* (Firence 1583) (16 knih o rostlinách)



**Andrea Cesalpino**  
(Caesalpinus)  
1519 - 1603


Jako Teofrastos považuje dřeviny za samostatnou skupinu, byliny dělí do 13 skupin dle generativních znaků:

- (1) tvar plodu
- (2) počet semen
- (3) počet přihrádek v semeníku
- (4) stavba květu




# Druhové diagnózy (počátek 17. stol.)

Počet známých druhů rychle rostl - od dob "německých otců botaniky" za necelých 100 let se víc než zdesateronásobil.



**Gaspard Bauhin**  
1560 - 1624


Švýcar **Gaspard Bauhin** použil krátké a výstižné diagnózy = soubory rozlišovacích znaků, k pojmenování rostlin a zároveň jako determinační pomůcka = určovací klíč



*Pinax theatri botanici* (1623)

# Pojem a definice druhu (1686)

**John Ray**  
1627 - 1705



"abychom mohli začít rostliny inventarizovat a správně klasifikovat, musíme se snažit zjistit některá kritéria na rozlišení tzv. druhů. Po dlouhém a usilovném výzkumu jsem nezjistil jiné kritérium na rozlišení druhů než jsou diferenční znaky, zachovávající si při rozmnožování semeny svoji stálost."



Druh je podle Raye skupinou jedinců, kteří jsou v rámci své variability geneticky stálí. (*Historia generalis plantarum*, Londini 1686-1704 )

# Carl Linné - vrchol umělé klasifikace (pol. 18. stol.)



**Carl Linné**  
(Linnaeus)  
1707-1778



**Carl Linné** synteticky navázal na vše progresivní co zjistili nebo zavedli jeho předchůdci:

- John Ray - definice druhu
- August Bachmann - binomická nomenklatura
- Joachim Jung - morfologická terminologie
- Joseph Pitton de Tournefort hierarchie taxonomických jednotek
- Gaspard Bauhin - diagnózy


# Species plantarum (1753)




24 tříd dle počtu, délky, srůstu tyčinek a pestíků, tedy pohlavních orgánů, tedy proto nazýván systém sexuální



# *Plantae hybridae* (1751)



Mezidruhová hybridizace = způsob vzniku nových druhů




# První přirozené systémy (2. pol. 18. stol.)



Michel Adanson  
1727 - 1805

Michael Adanson (1763) Rostliny rozdělil do 58 čeledí

1. podle komplexu morfologických znaků
2. hodnota jednotlivých znaků stejná



Antoine Laurent de Jussieu (1789)

teoreticky rozpracoval systém strýce Bernarda.  
20.000 druhů ve 100 čeledích a 15 třídách




Antoine Laurent  
de Jussieu  
1748 - 1836

1. na konci diagnóz čeledí uvádí vztahy k sousedním čeledím
2. tyto vztahy použil jako kritérium třídění čeledí
3. ve vymezení tříd se přidržuje hlavně stavby květu.



# Objev a zobecnění rodozměny (18/19. stol)




1784 – mechorostry

– první zobrazení spór a jejich klíčení


– první zobrazení archegonií a antheridií



Johann Hedwig (1730–1799)





# Objev a zobecnění rodozměny (1. pol. 19. stol)



**1796** – první zobrazení klíčení spór kapradin a vznik sporofytu na gametofytu – **John Lindsay** (britský chirurg působící na Jamaica)

**1851** – rodozměna = životní cyklus všech výtrusných vyšších rostlin – **Wilhelm Hoffmeister** (1824–1877)



genetická podstata haploidní a diploidní fáze byla poznána až počátkem 20. století.



# Objev principu opylení rostlin (1. pol. 19. stol)



**Giovanni Battista Amici (1786-1863)**  
prof. fyziky v Mondeně

1823 objevuje pylovou láčku, jež proroste  
skrz čnělku do semenníku.


*Osservazioni microscopiche sopra varie piante* (Mondena 1823)




**Carl Wilhelm von Naegeli (1817 - 1891)** prof. botaniky na  
univ. v Zürichu

1842 studuje dělení buněk uvnitř vznikajícího pylového zrna


*Zur Entwicklungs-geschichte des Pollens bei den Phanerogamen.* (Zürich 1842).



# Objev principu oplození rostlin (2. pol. 19. stol)



1877 popis dělení a diferenciacie buněk uvnitř zárodečného vaku



*Über Befruchtung und Zelltheilung* (Jena 1877)


**Eduard Strassburger**, 1844–1912, prof. botaniky univ. v Jeně



1898 objev dvojího oplození u rostlin

*Novyje nabljuděnija nad oplodotvorenijem u Fritillaria tenella i Lilium martagon*, které vyšlo jako součást sborníku Dněvnik X. sjezda ruskich estěstvoispytatělej i vračeij v Kijevě.

**Sergej Gavrilovič Navašin**, 1857–1930, prof. botaniky na univ v Moskvě




# Evoluční teorie (2. pol. 19. stol.)



1859 evoluční teorie - Angličan **Charles Darwin** (1809-1882).

On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. (O vzniku druhů přírodním výběrem neboli uchováním prospěšných plemen v boji o život) (1859).

1866, Němec **Ernst Haeckel** (1834-1919) vyslovuje zákon rekapitulace = biogenetický zákon: ontogeneze = zkrácená fylogeneze (v témže roce zavádí pojem ekologie jakožto vztah organismu a prostředí).





1846 **Richard Owen** (1804-1892) definoval homologie a analogie / později obdoba v Hennigových apomorfiích a homoplasiích

Report on the archetype and homologies of vertebrate skeleton

# Paleobotanické přístupy (počátky)

Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733) švýcarský kartograf a lékař





1709 (Ed. 2. 1723) *Herbarium diluvianum* – první vyobrazení nálezů fosilních rostlin, zejména otisků listů kapradin z karbonu a permu a také třetihorních nálezů krytosemenných – zejména listů stromů

# Paleobotanické přístupy (19. století)

**Kašpar Maria Šternberk (1761–1838)**

český botanik, mineralog a geolog zakladatel národního muzea (1818)

1820-1825 *Versuch einer geognostisch-botanischen darstellung der flora der vorwelt* – „Nástin zeměznalecko-botanického přehledu flóry pravěta“  
= „starting point“ nomenklatury fosilních rostlin




**Alexandre Brongniart (1770–1847)**

francouzský chemik, mineralog a geolog – *Histoire des végétaux fossiles* (1828-37)

1828 – v úvodu této knihy – první periodizace fosilní flóry do 4 období – výtrusných rostlin, jehličnanů, cykasů, kvetoucích rostlin


# Paleobotanické přístupy (od 1. pol. 20. stol.)



Skot **Robert Kidston** a Brit **William Henry Lang** během 1. svět. války studovali fosilie u obce Rhynie ve Skotsku



Dr Robert Kidston (right) and the palaeobotanist Professor David Thomas Gwynne-Vaughan (left).



**Telomová teorie:** evoluční základ všech rostlinných orgánů = prastonek = telom. Z jeho prostorové dichotomické podoby u ryniofyt vznikly různé typy větvení stonku, postavení a uspořádání sporangií a listy u všech dalších rostlin.

Na základě studia fosilních rostlin, zejména ryniofyt, ji vyslovil roku 1930 Němec **Walter Zimmermann** (v díle *Phylogenie der Pflanzen*).

# Chromosomy v rostlinné systematice (20. stol.)



Courtesy of American Philosophical Society, Carl Stern Papers. Noncommercial, educational use only.

Theodor Boveri  
1862–1915



Hugo de Vries  
1848–1935





**1848** – Němec Wilhelm Hofmeister poprvé pozoroval fáze **mitózy** v buňkách trichomů nitek *Tradescantia virginica*

**1882** – Němec Eduard Strasburger si poprvé všímá, že počet diferencujících chromosomů je při mitóze **stálý**.

**1888** „Počet chromosomů: druhově specifický stabilní znak“ – německý cytogenetik a anatom **Theodor Boveri**.

**1886** nová polyploidní forma *Oenothera lamarckiana* „Gigas“ – Holanďan **Hugo de Vries** (chromosomy analyzovala u tohoto polyploida v roce 1907 Američanka Anne Lutz)


**1917** Švéd **Ojvind Winge** – role chromosomů a polyploidie v evoluci a klasifikaci rostlin



Ojvind Winge  
1886–1964

**V rostlinné systematice se chromosomy zjišťují od 20. let 20. stol. Dnes u 25-30% rostlinných druhů znám počet chromosomů**


# Od počtu chromosomů k velikosti genomu = průtoková cytometrie (konec 20 stol.)



Od poloviny 80. let 20. stol. prodělává dramatický rozvoj

Původně sloužila k analýze krevních buněk

U rostlin umožňuje měření obsahu DNA a stupeň ploidie v buněčných jádrech



Efektivní a šetrná metoda umožňující sledovat mikroevoluční procesy v populacích


Vedle polyploidie, velikosti genomu umožňuje analyzovat breeding systémy (identifikovat, kolik semen vzniklo apomixií a kolik sexuálně)

**Velikost genomu známa u 4 % druhů vyšších rostlin**


# Syntetická teorie evoluce (1. pol. 20. stol.)



**Godfrey Harold Hardy**  
1877-1947  
britský genetik



**Wilhelm Weinberg**  
1862-1937  
německý genetik



**Theodosius Dobzhansky**  
1900-1975  
amer. populační genetik



**George Ledyard Stebbins**  
1906-2000  
americký botanik

1937 zákon o frekvenci alel v panmiktické populaci = Hardy-Weinbergova rovnováha.

Darwinismus + genetika = syntetická teorie evoluce

**Ne jedinec, ale populace je základní jednotkou evoluce. Evoluce = změna frekvence alel v populaci – selekce, ... drift, ... drive(s)**

**Theodosius Dobzhansky** (Genetics and the origin of species 1937).

**G. Ledyard Stebbins** (Variation and Evolution of Plants 1950).


# Isoenzymy - markery populační genetiky 20. stol.

**Gelová elektroforéza** zviditelní rozdíly v prostorovém uspořádání, hmotnosti a síle elektrického náboje enzymů, bílkovin, nukl. kyselin

Elektroforézu vynalezl 1937 švédský biochemik **Arne Wilhelm Kaurin Tiselius** (1902-1971) (Nob. cena 1948).



v systematice od 80 let - hybridní původ druhů, breeding systémy: selfing vers. outcrossing, populační genetiky




# Objektivizace a racionalizace taxonomických dat = Biostatistika (20. století)



Biometrika rostlin - přelom 19/20. stol. britský matematik **Charles Pearson**

definoval základní pojmy popisné statistiky – např. koeficient variance; pracoval většinou se znaky s normální gausovskou distribucí – sledoval např. počty ostnů na listech *Ilex aquifolium*



**Charles Pearson**  
(1857-1936)

**Fenetika = „každý znak má a priori stejnou váhu“**

1963 Američané Robert **Sokal** a Peter **Sneath** **numerická taxonomie** – využívá shlukové analýzy, diskriminační analýzy, analýzy hlavních komponent a mnoha dalších,

Uplatnění podmíněno rozvojem výpočetní techniky



**Robert Sokal**  
(1926-2012)  
entomolog





**Peter Sneath**  
(1923-2011)  
mikrobiolog

# Znaky kvantitativní a kvalitativní – biometrika.

Variabilita živých organismů si vynucuje použití metod biostatistiky. Nejčastějšími výstupy numericko taxonomických metod jsou:

**dendrogram** (v případě metod klasifikačních jako je např. clustrová analýza) nebo

**ordinační diagram** (vyjádřený obvykle ve formě scatter plotu, v případě metod ordinačních jako je např. analýza hlavních komponent PCA = principal component analysis, a. hlavních koordinát PCoA, či analýza DCA).



# Kladistika

1950 něm. entomolog  
Willi Hennig

Rekonstrukce fylogeneze  
= spojování skupin se  
společnými předky, na  
základě sdílení nově se v  
evoluci objevivších  
(odvozených) znaků =  
apomorfii



Willi Hennig  
(1913–1976)

**Kladogram** vychází z apomorfii při  
maximální úspornosti (= minimálního počtu  
změn) „**maximum parsimony tree**“.

Každý znak byl někdy v evoluci nový – např.:

genetický kód = apomorfie všech živých organismů,

cévní svazky = apomorfie vyšších rostlin kromě mechorostů,

konduplikátně svinutý plodolist = apomorfie krytosemenných. Může ale vzniknout i  
nezávisle vícekrát, evoluce může vést vlivem selekce i ke konvergenci znaků.

**Gymnosperms:**  
Conifers, cycads &  
First plants to reproduce with seeds,  
located inside of a cone, inside spores



**Dicots:** Tomatoes,  
Cacti, & most tree  
species  
Second and larger  
class of flowering  
plants



**Seedless vascular plant:**  
Ferns and fern allies



**Monocots:**  
Orchids, grasses,  
lilies & palms  
Major class of  
flowering plants



**Moss & liverworts:**  
Basal plants




Reduction to one cotyledon,  
parallel venation in leaves,  
flower parts in  
multiples of 3,  
loss of woody  
tissue

**ANGIOSPERMS:**  
Flowering plants


Flower parts in  
multiples of 4 or 5  
- carpels in flowers & insect pollination  
- Embryos in protective seed & secondary growth, two cotyledons  
- Developed vascular system & sporophyte dominant

**Chlorophyta:**  
green algae  
(photosynthesis, reproduction via spores  
unicellular or filamentous body)

- Terrestrial & dominant gametophyte  
& unbranched dependent sporophyte



# Fylokód - fylogenetická definice jmen



jméno je definováno jedním ze tří způsobů:

**a** – odkazem na nejbližšího společného předka dvou taxonů a všechny jeho potomky

**b** – odkazem na všechny organismy, které mají bližšího společného předka s označeným organismem než s jiným označeným organismem

**c** – odkazem na prvního předka, u kterého se vyvinul určitý znak a na všechny jeho potomky

# Studium DNA 90. léta 20. stol.

(1) postupy založené na **polymerázové řetězcové reakci (PCR)** v programovatelném zařízení, zvaném **termocykler**.

(2) Pro čtení sekvence nukleotidů – sekven(c)ování se využívá automatický **sekvenátor**. Výhodou metod je, že stačí jen malé množství materiálu umožňující přežití zkoumaného jedince.



automatický sekvenátor



The Nobel Prize  
in Chemistry 1980




Paul Berg

1926-



Walter Gilbert

1932-



Fred Sanger


1918-



Kary B. Mullis 1944-



The Nobel Prize  
in Chemistry 1993



1970 - objev restričních endonukleáz


Werner Arber, Hamilton Smith a Daniel Nathans obdrželi 1978 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.



Restriční enzymy jsou produkovány bakteriemi, které jich užívají k obraně proti virové RNA nebo DNA.

Každý takový enzym rozpoznává a štěpí konkrétní krátkou nukleotidovou sekvenci, která v bakteriální DNA chybí.


Například enzym EcoRI štěpí nukleotidové sekvence GAATTC.



Werner Arber  
(1929)




Hamilton Smith  
(1931)



Daniel Nathans  
(1928-1999)

# Bar-coding

## identifikace rostlin pomocí sekvence DNA



**NCBI**  
National Center for Biotechnology Information  
National Library of Medicine    National Institutes of Health

PubMed   All Databases   BLAST   OMIM   Books   TaxBrowser   Structure

Search All Databases for  Go

**SITE MAP**  
Alphabetical List  
Resource Guide


**About NCBI**  
An introduction to NCBI

**GenBank**  
Sequence submission support and software

**What does NCBI do?**  
Established in 1988 as a national resource for molecular biology information, NCBI creates public databases, conducts research in computational biology, develops software tools for analyzing genome data, and disseminates biomedical information - all for the better understanding of molecular processes affecting human health and disease. [More about NCBI...](#)

**Hot Spots**

- ▶ Clusters of orthologous groups
- ▶ Coffee Break, Genes & Disease, NCBI Handbook
- ▶ Electronic PCR
- ▶ Entrez Home




Př. *Eriophorum angustifolium*: sekvence intronu chloroplastového genu pro transferovou RNA

```
CCTCTTACTATAAATTCATTGTTGTCGATATTGACATGTAGAATGGACTCTCTCTTTATTCTCGTTTGATTTATCATCATT  
TTTTCAATCTAACAAATTCATAATGAATAAAATAAATAGAATAAATTGACTACTAAAATTGAGTTTTTTCTCATTAACTT  
CATATTTGAATCAATTTACCATAAATAATTCATAATTTATGGAATTCAAAAAATTCCTGAATTTGCTATTCCATAATCATTG  
TCAATTTCTTTATTGACATGAAAATATGATTTGATTGTTATTATGATCAATCATTGATCATTGAGTATATATACGTACGTC  
TTTTTTGGTATAGACGGCTATCCTTTCTCTTATTTGATAAAGATATTTAGTAATGCAACATAATCAACTTTATTCGTTA  
GAAAACTTCCATCGAGTCTCTGCACCTATCTTTAATATTAGATAAGAAATATTTTATTTCTTATAATAAATAAGAGATATT  
TATATCTCTCATTCTCAAATGAAAGATTTGGCTCAGGATTGCCACTCTTAATTCCAGGGTTTCTCTGAATTTGGAA  
GTTAACACTTAGCAAGTTNCCATACCAAGGCCAATCCAATGC
```


[http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&PAGE\\_TYPE=BlastSearch&LINK\\_LOC=blasthome](http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome)


**Petr Bureš: Prezentace přednášky Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - část 2.**

Next-generation-sequencing = kombinace štěpení DNA PCR a nanotechnologií



Nano-porová metoda





# Angiosperm Phylogeny Group

Stevens, P. F. (2001 onwards).  
 Angiosperm Phylogeny  
 Website. Version 7, May 2006  
 [and more or less  
 continuously updated since].

<http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/>.

There are direct links from all terminal taxa and all internal nodes to the relevant page of the characterizations.

Tree icons link to or will link to tree for each order.

[Link to Model Organism Tree](#)

