



Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin

Ryniofyty


Petr Bureš



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Ryniofyty

primitivní cévnaté rostliny



Ryniofyty

primitivní cévnaté rostliny



vesnička Rhynie ve Skotsku

dnes

Ryniofyty

primitivní cévnaté rostliny



vesnička Rhynie ve Skotsku

Před 420 miliony let

unikátní podmínky: rychlá silicifikace (zkřemenění, permineralizace) rostlin vlivem aerosolu v okolí gejzírů dokonale zachovala ryniofytí silurskou flóru

je možné dělat velmi tenké řezy a výbrusy, na kterých lze zkoumat mikroskopicky nejen povrchy, ale i anatomii

Petr Bureš: Prezentace přednášky Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - ryniofyty

dnes

ryniofyty = vývojový stupeň (parafyletická skupina)

Po odštěpení mechorostů

se odštěpily primitivní bezlisté ryniofyty




ryniofyty = vývojový stupeň (parafyletická skupina)

Po odštěpení mechorostů

se odštěpily primitivní bezlisté ryniofyty

zbývající větev se v devonu podle stavby listů rozdělila na dvě linie:

**mikrofylní
megafylní**




ryniofyty = vývojový stupeň (parafyletická skupina).

Po odštěpení mechorostů

se odštěpily primitivní bezlisté ryniofyty

zbývající větev se v devonu podle stavby listů rozdělila na dvě linie:

**mikrofylní
megafylní**




ryniofyty = vývojový stupeň (parafyletická skupina)

Po odštěpení mechorostů

se odštěpily primitivní bezlisté ryniofyty

zbývající větev se v devonu podle stavby listů rozdělila na dvě linie:

**mikrofylní
megafylní**



„oddělení“ *Rhyniophyta*

Drobné (2–20 cm) bezlisté a bezkořenné výtrusné rostliny plochých bahnitých břehů řek a jezer

Poprvé svrchní silur, vyhynuly ve středním devonu


420 My BC – 390 My BC

Evoluční inovace:

- v životním cyklu dominuje sporofyt
- sporofyt má víc sporangií (ne jediné jako mechorosty)
- někdy využitě tracheidy cévních svazků

Bezlisté ryniofyty zahrnují jak rostliny bez cévních svazků – rody *Horneophyton* a *Aglaophyton* (označované někdy *Protracheofyta*),

tak rostliny cévnaté – rody *Rhynia* a *Cooksonia*, které se všemi pokročilejšími vyššími rostlinami tvoří stupeň cévnatých rostlin *Tracheophytina*





Telomy

- hladké nebo hrbolekaté, bez šupinovitých emergencí,
- v mládí circinátně stočené (jako u kapradin)
- vidličnatě větvené prostorově, (ne v rovině)
- s jednotlivými sporangii na koncích telomů
- sporangií na sporofytu mnoho (ne jediné jako u mechůrostů)



Rhizomy = podzemní stonky (oddenky)

- fixovaly sporofyt k substrátu
- s jednobuněčnými **rhizoidy** – příjem živin a vody (geny pro gametofytní tvorbu rhizoidů kooptovány sporofytem)




Sporangia

- euporangiátní
= tlustostěnná
= stěnu tvoří více vrstev buněk
- izosporická
- někdy uvnitř sloupek
(columella)
- nemají žádnou dehiscenci = ztenčeninu, otvírají se
rozpadem stěny, vzácně terminálním otvorem

Tlustosěnná sporangia (euporangia) mají všechny výtrusné cévnaté rostliny, kromě odvozených kapradin. Euporangiátní jsou i mechorosty.


Terminální sporangia sdílejí ryniofyty s mechorosty, u plavuní jsou na bočních zkrácených větvíkách a kapradin na spodní straně listů



Horneophyton lignieri, c = columella



Nothia aphylla




Aglaophyton major

Epidermis sporofytů – průduchy a kutikula

Na povrchu epidermis je tenká kutikula

Průduchy až 180 µm dl. – u současných rostlin obvykle 10–100 µm.

? důsledek vysokého atmosférického CO₂ v siluru a devonu




Vstřebávání CO₂ pomalejší než transpirace vody / velké průduchy hůře regulovatelné a proto hůře hospodařící s vodou – to v siluru a devonu nevadilo

Teprve devonsko-karbonský pokles atmosférického CO₂ rozběhl terestrické adaptace na plné obrátky – hlavně evoluci vodivých pletiv kompenzujících ztráty vody

Aglaophyton major




Horneophyton lignieri



Rhynia gwynne-vaughanii

průduch na příčném řezu; g = svěrací buňky; c = nálevkovitá podprůduchová dutina






Vodivé elementy sporofytu – protostélé

= jeden koncentrický cévní svazek ve středu stonku

xylem (bez dřeně) – uprostřed svazku


floem – vně xylemu



Xylem sporofytu tvoří:

Neztlustlé tracheidy



= hydroidy (jako u mechů)



nebo



Tracheidy S-typu

- houbovitá celulózní stěna,
- mechanicky zpevněná kruhovými nebo spirálními ztluštěninami
- snad i s tenkou ligninovou výztuhou na povrchu



Tracheidy ryniofyt – strukturně odlišné od jiných cévnatých rostlin

tracheidy ryniofyt



nezluštělé
hydrophytes

tracheidy
typu S


tracheidy
typu G

tracheidy
typu P

bez
ligninu

lignin just
tenc "pokrývá"
zluštění

tracheidy jiných cévnatých rostlin



zluštění stěn tracheid zcela vyplňené ligninem

Vznik lignifikovaných cévních svazků umožnil vyšší vzrůst a usnadnil kompetici o světlo

Diferenciace primárního xylemu ve sporofytu – endarchní

starší – protoxylem – zůstává ve středu

mladší – metaxylem – se tvoří vně
(centrifugálně)


U ryniofyt cévní svazek
jediný => střed stonku je zároveň i střed
svazku => endarchní tvorba primárního
xylemu = tvorba centrarchní

Endarchní (centrifugální) tvorba xylemu je
typická pro stonky většiny rostlin, kromě
plavuní



Xylem Development

by Andrew Wagner Spring
2000


Endarch Development




Exarch Development



Mesarch Development



Centrarch Development



Endomykorrhiza




v oddencích ryniofyt (arbuskulární = hyfy „stromečkovitě“ vrostlé do buněk primární kůry)

rostlina houbě – uhlíkaté látky

houba rostlině – uvolňuje ze substrátu pro rostlinu nepřístupné anorganické živiny

rostlinám tento „houbový servis“ k dispozici od počátku terestrializace!

Zjištěna u *Rhynia*,
Aglaophyton,
Horneophyton – u všech, kde se zachovaly podzemní části. Výjimečně zjištěna i v gametofyttech (*Lyonophyton rhyniensis*) tedy obdobně jako u hlevíků a játrovek




Rodozměna

Sporofyt a gametofyt – žily odděleně (jako u plavuní a kapradin)

Evoluce samostatného sporofytu

1. průduchy
2. apikální meristém
3. vidličnaté větvení
4. rhizoidy na sporofytu



Závislý sporofyt mechorostů

bez apikálního meristému má determinovaný růst

U semenných rostlin a heterosporických výtrusných rostlin s endosporickým gametofytom má determinovaný růst gametofyt





Nezávislý sporofyt protracheofyt

s apikálním meristémem má nedeterminovaný růst

Gametofyt – drobný, zelený, hvězdicovitě a vidičnatě větvený - s terčovitými receptákuly (gametantiofory) – podobnými jako má játrovka *Marchantia polymorpha*
Oproti sporofytu řádově menší, ale měl hydroïdní vodivý systém – jako mechy




Průduch na gametofytu
Lyonophyton rhyniensis




Oproti mechorostům měly gametofyty ryniofytů průduchy (a také kutikulu). Evoluce se v devonu patrně vydala k homoiohydrii gametofytu, ale nedotáhla to!

Gametofyt – talířovitá receptakula častěji jednopohlavná

– gametofyty jednopohlavné i oboupohlavné



Lyonophyton rhyniensis
♂




Langiophyton mackiei
♀

Spermatozoidy


– šroubovitě stočené (1-2 otočky – jako u mechorostů a parožnatek)

Spirálně stočené spermatozoidy v antheridiu *Lyonophyton rhyniensis*




bičíky zřejmě dva (?)


Spermatozoidy mechorostů a parožnatek




mechy



parožnatky



hlevíky



játrovky

Aglaophyton major

(dříve *Rhynia major*)

Devonská, 20 cm vys.,

Telomy 0,5 cm silné




Sporangia – elipsoidní, 12x4 mm
na všech koncích telomů

Nadzemní horizontální výběžky v nodech
„kořenující“ jednobuněčnými rhizoidy

Tracheidy - bez ztluštěnin, jako hydroidy
mechů



samčí gametofyt *Lyonophyton rhyniensis*
(antheridiofory nevětvené; samičí
gametofyt měl archegoniofory vidličnatě
větvené)



Horneophytton lignieri (dříve *Hornea*),

Devonský, do 20 cm vys., telomy do 2 mm tlusté


Rhizom – hlíznatě uzlovitý, „hlízy“ na spodu s rhizoidy

Tracheidy – **bez** ztluštěnin – jako hydroidy u mechů






Sporangia – válcovitá 7,5 mm dl.,

vidličnatě větvená, se středním sloupkem – jako u mechů nebo hlevíků! – terminálním otvorem – jako mechy!



Samičí gametofyt – *Langiophyton mackii*

větší – až 6 cm vys.; archegonia v receptákulech zanořená a obalená „pochvou“ – jako u hlevíků!



Rhynia gwynne-vaughanii

Devonská, do 18 cm vys.

Telomy – 2–3 mm tlusté, větvené dichotomicky i monopodiálně


Sporangia – elipsoidní; 3,6 x 2.4 mm

Tracheidy – ztluštělé, S-typu

Emergence uprostřed s otvory –
? hydatodami nebo sekrečními žlázkami

? Vyprášená sporangia opadávala z
miskovité abscisové zóny jako opadávající
listy

? Boční větve se mohly
odlamovat a sloužit
k vegetativnímu rozmnožování



Rhynia gwynne-vaughanii


Jednoduchý a drobný gametofyt

Remyophyton delicatum

1–2 cm vys., dvoudomý. xylem – S-tracheidy. Ze střední kulovité části hvězdicovitě vyrůstá až 200 tenkých nevětvených gametangioforů;


Samčí kyjovité antheridiofory s několika stopkatými kulovitými antheridiemi

Samičí nevětvené silnější lodyžky s jednotlivými zanořenými archegonii



Remyophyton delicatum – skupinka samčích a samičích gametofytů

archegonium




Cooksonia pertonii

drobné – do 2,5 cm vys., do 1 mm silné,
 nejstarší makrofosílie vyšších rostlin
 střední/svrchní silur = **428 miliónů let**
 podzemní části zatím neobjeveny
 tracheidy zřejmě S-typu
 objevena 1934 v Pertonském lomu ve
 Walesu, popsána 1937



vizualizace



trumpetkovitá sporangia

3D-model



Isabel Cookson
 1893-1973
 australská paleo-
 botanička, podle níž
 je rod pojmenován



Aberlemnia (Cooksonia) caledonica

Devonská, do 10 cm vys., telomy do 1,5 mm silné

Sporangia ledvinitá terminální, 2x3 mm, s příčnou dehiscencí jako u plavuní
(? přechod k odd. *Zosterophyllophyta*)

Nazvána dle lomu Aberlemno ve Skotsku, kde byla objevena



oddělení *Zosterophyllophyta*

Spodnodevonští předchůdci plavuní

Do 50 cm vys. – 2x vyšší než bezlisté ryniofyty

Zachovaly si zčásti vidličnaté větvení i circinátní vernaci telomů

Na telomech šupinovité vychlípeniny pokožky (emergence) bez inervace (enafyly)



oddělení *Zosterophyllophyta*

Listy (mikrofyly) s průduchy

Sporangia ledvinitá, laterální, někdy v terminálních klasech (dvouřadých nebo spirálních)

Tracheidy dvouvrstevně ztlustlé – typu G – vnitřní rezistentní, pravděpodobně lignifikovaná, vrstva tvoří prstencové ztluštění a zároveň souvislou stěnu s mnoha drobnými otvory



Asteroxylon mackei



celulóza – chybí (před fosilizací ji bakterie rozložily?)





FIGURE 8.2 Oblique view of *Gosslingia breconensis* conducting elements (Devonian). Bar = 10 µm. (From Edwards and Kenrick, 1988a.)



lignin – zachoval se

Vodivé elementy sporofytu – aktinostélé

= jeden koncentrický cévní svazek v tenkém stonku

xylem (bez dřeně) – uprostřed svazku na řezu hvězdicového tvaru


floem – mezi paprsky xylemu




Příčný řez aktinostelickým telomem rodu *Asteroxylon*

Stelární teorie

- naznačuje evoluci vodivých svazků z ryniofytního protostélé



Philippe Édouard
Léon Van Tieghem
1839 – 1914



Diferenciace primárního xylemu ve sporofytu – exarchní


= starší elementy (protoxylem) zůstánají na vnějších koncích xylemových „paprsků“, zatímco mladší elementy (metaxylem) se vytvářejí dovnitř (centripetálně)

Exarchní (centripetální) tvorba xylemu je typická pro stonky a kořeny plavuní a pro kořeny ostatních rostlin



Xylem Development

by Andrew Wagner Spring 2000


Endarch Development




Exarch Development



Mesarch Development



Centrarch Development




Zosterophyllum rhenanum

Vodní, do 0,5 m vys,

Oddenky v bahně (? kořeny)

Ledvinitá sporangia v terminálních klasech na koncích plodných větví nad hladinou




Telomy zčásti hladké, zčásti pokryté bradavčitými výchlípeninami (enafly)

Zosterophyllum rhenanum

Gametofyt = hermafroditní *Sciadophyton steinmannii* s obouohlavnými receptákuly



***Zosterophyllum shengfengense* – první rostlina s kořeny**



Dokud byly terestrické rostliny malé, obešly se bez kořenů.

Evoluce kořenů = důsledek zvětšování velikosti rostlin při kompetici o světlo

Asteroxylon mackei

Suchozemský až 50 cm vys., připomíná plavuně

Stonek – do 2 mm tlustý, monopodiálně větvený

Vedlejší větve vidličnatě větvené

Gametofyt není znám




Figure 7.5: Monopodial (left) and sympodial branching. First, second and third years of growth are red, blue and green, respectively.




Asteroxylon

© DK 2012 www.ifhdigital.com

Astroxyton mackei

„Listy“ bezcévné = až 5 mm dl. – s průduchami



Vedlejší cévní svazky sice odvětvovaly z centrálního aktinostélé a procházely skrz primární kúru, ale do enačních listů nevstupovaly



Asteroxylon mackei

Oddenek s protostélé




Vidličnatě větvené „kořeny“ (přechody mezi kořeny a oddenky) – adventivně z oddenku



Asteroxylon mackei

Sporangia ledvinitá – až 7 mm dl.




- krátce stopečkatá, stopky s cévním svazkem,
- vyrůstají mezi enafyly na koncích větví,
ne v paždí enafylů jako u plavuní.



oddělení *Trimerophyta*

Spodnodevonští ancestoři (předchůdci) megafylních rostlin – kapradin a semenných rostlin.



výška - několik cm až 3 m (*Pertica*),



oddělení *Trimerophyta*


hlavní stonek - větvený monopodiálně,
silnější než boční větve

boční větvě někdy ve spirále, mají
determinovaný růst





oddělení *Trimerophyta*

sporangia - vřetenovitá,
ve shlucích na koncích větví,
s odvozenější – podélnou – dehiscencí



oddělení *Trimerophyta*


sporangia - vřetenovitá,
ve shlucích na koncích větví,
s odvozenější – podélnou – dehiscencí



oddělení *Trimerophyta*




tracheidy - zpravidla **typu P** – dvouvrstevná stěna ?s dutinami a „plovákovitými“ výztuhami

střední válec - **protostélé**



aerenchymatické dutiny pod endodermis

lignin – zachoval se



celulóza – chybí (před fosilizací ji bakterie rozložily?)

oddělení *Trimerophyta*

strukturní přechody mezi oddenkem a kořenem

- pozitivně geotropicky orientované
 - adventivně vyrůstající z oddenku
 - vidličnatě větvené
- na stonku zahnuté trnovité výrůstky
(? ochrana proti herbivorům)



odd. *Trimerophyta* – poprvé se objevuje felogen (korkové kambium), který má u silnějších stonků význam hojivý
– u odvozenějších linií pak také funkci krycí




hojivá funkce felogenu u současných sukulentních pryšců



FIGURE 8.81 *Psilophyton crenulatum*. Bar = 2 mm. (Courtesy J. B. Doran.)

Zimmermannova telomová teorie:


Walter Zimmermann
1892-1980




Výchozí morfologická struktura = prostorově vidličnatě větvený telom

Z něj evolučně odvozeny všechny ostatní orgány

Evoluce telomů: převršení → monopodiální stonek




planace + kladofifikace + syntelomizace → list




odd. *Trimerophyta*

– větve dvojího typu fertilní a sterilní, na koncích vícekrát větvené – fertilní zpravidla 6x – nesou obvykle ~32 drobných sporangií (5 mm dl.)

předstupeň megafylů = planační a kladofikační fáze



Pertica quadrifolia



Psilophyton dawsonii