



# Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin

Bazální kryptosemenné

Petr Bureš




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# Bazální krytosemenné rostliny




# Bazální krytosemenné





# Bazální krytosemenné

27 nejprimitivnějších čeledí původně řazených k dvouděložným



	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Liliopsida</i>	<i>Rosopsida</i>
	<i>Bazální krytosemenné</i>	<i>Jednoděložné</i>	<i>Dvouděložné</i>
<b>pyl</b>	monokolpátní	monokolpátní	trikolpátní
<b>okvětí</b>	často nerozlišené	často nerozlišené	většinou rozlišené
<b>čepel listů</b>	jednoduchá, celistvá	jednoduchá, celistvá	jednoduchá i členěná
<b>žilnatina listová</b>	často jednoduše zpeřená	obloukovitě souběžná nebo rovnoběžná	dlanitá nebo složitě zpeřená
<b>dělohy</b>	2 (vzácně 1)	1	2
<b>stonkové cévní svazky</b>	eustélé, vzácně ataktostélé	ataktostélé	eustélé
<b>řapík listů</b>	ano	často bez	ano
<b>hlavní kořen</b>	vytrvává	zaniká, nahrazen adventivními	vytrvává
<b>habitus</b>	většinou dřeviny	většinou byliny	byliny i dřeviny
<b>četnost květů</b>	polymerické nebo trimerické	trimerické	tetra- a pentamerické
<b>xylem</b>	homo i heteroxylární	většinou heteroxylární	heteroxylární
<b>perforace trachejí</b>	schodovitá	jednoduchá	jednoduchá
<b>souměrnost květů</b>	většinou aktinomorfní	aktinomorfní i zygomorfní	aktinomorfní i zygomorfní
<b>květy</b>	acyklické nebo spirocyklické	cyklické	cyklické
<b>rozšíření</b>	tropy	různé	různé



primitivnější zástupci - xylem bez trachejí  
(*Amborellaceae*, *Magnoliaceae* a  
*Nymphaeaceae*, vzácněji *Lauraceae* a  
*Piperaceae*);  
pokud mají tracheje, tak s primitivní  
terminální **schodovitou perforací**



listy většinou jednoduché celistvé; střídavě postavené, pouze u *Magnoliaceae* s palisty, jinak bez nich



monokolpátní pyl – průduchy mají jedinou štěrbinu nebo otvor



## květní části

- neustálený větší počet,
- většinou ve spirále
  - nesrostlé obaly nerozlišené



Jen nejodvozenější (*Aristolochiales*)  
srostlé a zgomorfní  
s ustáleným počtem  
s obaly roslišenými




někdy  
přechody  
mezi květními  
částmi –  
nejčastěji  
mezi petaly a  
tyčinkami,

častá je  
přítomnost  
sterilních  
tyčinek –  
staminodií




**Gyneceum** - u původních apokarpní, u pokročilejších cénokarpní,  
plodolisty se uzavírají až během ontogeneze

nejprimitivnější konce zralých plodolistů uzavřeny jen slepením hustého porostu  
žláznatých trichomů lemujících okraje zpočátku pouze konduplikátně svinutých  
plodolistů



# Zárodečný vak má často jen 4 jádra

Čtyřjaderný zárodečný vak typu *Nuphar/Schizandra* typický pro bazální krytosemenné




Nejběžnější typ osmijaderného zárodečného vaku (typ *Polygonum*)


vajíčka často s malým embryem,  
silně vyvinutým perispermem a silným  
obalem (embryo : semeno = 0,05–0,1)

#### (D) Basal angiosperms: Nymphaeaceae


*Nuphar luteum*



#### (E) Angiosperms: Basal Eudicots Ranunculaceae





#### (F) Angiosperms: Core Eudicots



častým typem opylení je kantarogamie (opylení brouky) nebo jiná entomogamie

(brouci divergovali dříve než ostatní hlavní hmyzí opylovači)



## s entomogamním opylením úzce souvisí **termogenní květy**

- jsou schopné metabolicky se ohřívat nebo udržovat optimální teplotu a uvolňovat tak látky lákající hmyz
- mimo bazální krytosemenné mají tuto schopnost cykasy a vzácně je i v krytosemenných čeledích *Nelumbonaceae* (bazální dvouděložné) *Cyclanthaceae*, *Araceae* a *Arecaceae* (jednoděložné).



3 nejbazálnější větve krytosemenných tvoří řády:

1. *Amborellales*

2. *Nymphaeales*

3. *Austrobaileyales*

celkem k nim patří jen  
pět čeledí označovaných  
„ANITA“


**A***mborellaceae*,

**N***ymphaeaceae*,

**I***lliaceae (= Schisandraceae)*,

**T***rimeniaceae*,

**A***ustrobaileyaceae*



# 1. řád *Amborellales* s jedinou čeledí *Amborellaceae* – amborelovité



# *Amborellaceae* – amborelovité

Monotypická čeleď s jediným druhem *Amborella trichopoda*,

vlhké stinné horské lesy



Growth habit of *Amborella trichopoda* Baill. from Mt. Aoupinie, Province Nord, New Caledonia



endemickým na Nové Kaledonii.


Dvoudomý keř 6–8 m vysoký.





Official Publication of the Botanical Society of America, Inc.

Sesterský taxon všech ostatních krytosemenných. Oddělil se již počátkem druhohor – v triasu – před 230 miliony let



## Listy


- jednoduché, kožovité
- s celistvým, zvlněným až laločnatým okrajem
- střídavé, bez palistů
- se zpeřenou žilnatinou



# Xylem



bez trachejí



dřeňové paprsky multiseriátní




dvůrkaté dvojtečky

# Květy

- jednopohlavné, drobné,
- v latách


*Amborella trichopoda* – samčí květenství






B


**Samčí květ – několik**  
okvětních lístků ve šroubovici  
Tyčinek mnoho s plochými,  
lístkovitými, jednožilnými  
nitkami srostlými bázemi  
s okvětními lístky a široké  
konektivy.



A




B



C

*Amborella trichopoda* – samčí květy



## Samičí květ


Okvětí několik lístků ve šroubovici

### Staminodia

ukazují svojí přítomností na původní oboupohlavnost






Gyneceum apokarpní, plodolistů nejčastěji 5




## Plodolist

- neuzavřený
- s čnělkovým kanálem
- s mohutným bliznovým kartáčkem
- s jedním dvouobalým anatropním vajíčkem  
s velkým nucellem



Unikátní zárodečný vak má 9 buněk !  
Liší se tím od zbývajících bazálních krytosemenných

Od nejběžnějšího  
*Polygonum* typu se liší  
tím, že má o jednu  
synergidu víc



# Plod peckovice



**Semena** - velký endosperm  
malý perisperm  
malé embryo




## 2. řád *Nymphaeales* se 3 čeleděmi – významná je *Nymphaeaceae*, leknínovité



Vodní, ve dně kořenující rostliny

# *Nymphaeaceae* – leknínovité

4/48 po celém světě, s výjimkou  
nejsušších a nejchladnějších  
oblastí



Leknínovité jsou sesterskou linií  
ke všem kvetoucím rostlinám  
kromě amborelly, podle  
molekulárních hodin se oddělily  
před ca. 210 miliony let v triasu.

Dlouho u nich neexistovaly  
fosilní důkazy starší než z křídy




Ty byly učiněny až v roce 2002 (Kirkland et al.) ve vrstvách spodní jury na lokalitě St. George ve státě Utah v USA



## Listy - celistvé,

- zpravidla větší velikosti,
- extrémně dlouze řapíkaté,
- splývají na hladině,
- mají vzduchové dutiny



Stonek = tlustý oddenek v bahně




Řapíky listů –  
aerenchym,  
cévní svazky  
ataktostélicky  
rozmístěné,


Xylem bez  
trachejí



V aerenchymu četné astrosklereidy = idioblasty vyplněné krystalickým šťavelanem vápenatým




V pletivech alkaloidy




Květy velké, jednotlivé na dlouhých stopkách s aerenchymem vyrůstajících přímo z oddenku, zpravidla obouohlavné, spirocyklické, aktinomorfní, vonné, většinou heterochlamydní

Obal květu:  
4–6 sepalů  
mnoho spirálně uspořádaných petalů



Tyčinky mnoho (40–80), spirálně uspořádaných;  
přechody mezi petaly a tyčinkami,



Pestík = 5–35, apokarpní, plodolisty s mnoha (10–100) vajíčky s laminární placentací. Plodolisty často obrostlé květním lůžkem a pestík se proto jeví jako cénokarpní (pseudocoenokarpní)  
Opylení hmyzem



Plod měchýřek (v souplodí  
mnohoměchýřek - multifoliculus)




Zárodečný vak

- 4 jaderný

Endosperm


- diploidní




- Semena
- s dominantním perispermem (= zbytek nucellu),
  - s malým endospermem
- Embryo
- drobné
  - často s 1 dělohou



*Nymphaea* – semeno – příčný řez



*Nuphar* – semeno – příčný řez



V ČR rostou ve stojatých vodách 4 druhy.

Rod leknín má květy heterochlamydeické, semena s míškem.  
Leknín bělostný (*Nymphaea candida*) – vzácný a ohrožený  
původní druh, leknín bílý (*N. alba*) – často vysazovaný  
v různých barevných formách květu.



Stulík žlutý (*Nuphar luteum*) –  
vzácný a ohrožený druh,



stulík malý  
(*Nuphar pumila*)  
– vzácně roste v  
jižních Čechách  
a na jihozápadní  
Moravě.

Dužnatý plod stulíku se zachovalým bliznovým terčem  
(pseudocénokarpní - spojený květním lůžkem)



V jižní Americe *Victoria cruziana* nebo *V. amazonica* (=*V. regia*).

Ohromné listy, které díky pevnosti a mohutně vyvinutému aerenchymu unesou na vodě i malé dítě.

Viktorii královskou objevil náš botanik a cestovatel Tadeáš Haenke 1801 v poříčí Amazonky.





# magnoliidy

„Čtvrtá bazální“ větev krytosemenných

Má už složitější fylogenetickou strukturu, zahrnující 20 čeledí, patřících k pěti řádům:

- (1) *Canellales*,
- (2) *Chloranthales*,
- (3) *Laurales*
- (4) *Magnoliales*
- (5) *Piperales*


### 3. řád *Magnoliales* šácholánokvěté



dříve považované za nejprimitivnější větev krytosemenných




All branches have greater than 80% support.



**There are direct links from all terminal taxa and all internal nodes to the relevant page of the characterizations.**

**Řád *Magnoliales* – šácholanotvaré**  
dřeviny tropů a subtropů, nejdůležitější je čeleď *Magnoliaceae*

# **Magnoliaceae – šácholanovité 2/227**



dřeviny vlhkých lesů  
tropů a subtropů Ameriky  
a JV Asie

České jméno šácholán pochází od tvaru  
souplodí připomínající šíšku = šach.



© Jardin Mundan ©



Listy střídavé, jednoduché, celistvé, řapíkaté, opatřené  
**objímavými palisty** (záhy opadavými).

Tvar listů může být vzácně čtyrlaločný (*Liriodendron*), u fosliních i dvoulaločný.



květ

souplodí  
měchýřků

*Archaeanthus  
linnenbergeri* ze  
stř. křídy




Dřevo má tracheje s primitivní schodovitou perforací.



*Liriodendron tulipifera*, podélný řez tracheou

Květy velké, jednotlivé, homochlamydní, většinou obouohlavné, polymerické, acyklické nebo spirocyklické



Tyčinky

četné, spirálně uspořádané, hypogynické s páskovitými nitkami




Gyneceum apokarpní  
z mnoha plodolistů (často  
s difúzní blíznou) spirálně  
uspořádaných



# Vyklenuté květní lůžko





# Opylení kantarogamie nebo jiná entomogamie




# Karpely Semena

nesou dvě nebo více vajíček.  
s bohatým endospermem a malým embryem.



Plody nejčastěji měchýrky  
nebo nažky v šišticovitém  
souplodí



*Magnolia grandiflora*



Nejbohatší rod *Magnolia* - 80–120 druhů, klimaticky nejotužilejší – zasahují až po sever Japonska, u nás rostly v třetihorách,




# okrasné stromky

východoasijská *Magnolia liliiflora* (šácholan vejčitý)  
severoamerická *Magnolia grandiflora* (šácholan velkokvětý)  
popř. hybridní *Magnolia x soulangeana*  
pensum



Rod *Liriodendron* má jen dva druhy: *Liriodendron chinense* domácí v Číně a *L. tulipifera* domácí v USA.




# 4. řád *Piperales* pepřovníkovkveté



# 4. Řád *Piperales*


dřeviny, liány nebo bylinky  
převážně tropického a  
subtropického rozšíření,  
častěji zejména na jižní  
polokouli.



# 4. Řád *Piperales* - ze 4 čeledí jsou důležité:


*Piperaceae*

*Aristolochiaceae*



# *Piperaceae* – pepřovníkovité


5-8/3000, bylinky, keře a liány





pantropické rozšíření,  
zejména v oblastech deštných  
pralesů

# cévní svazky – skloný k rozptýlenosti – ataktostélia

tracheje s jednoduchou i schodovitou perforací



pletiva – prostoupená **sekretorními buňkami**  
**s ostře palčivými silicemi**




listy

jednoduché, většinou střídavé, obvykle s  
palisty.



*Piper nigrum*  
Piperaceae  
© G. D. Cam

květy drobné,  
většinou obouohlavné, v hustých  
klasech nebo hroznech,  
v paždí listenů



- P chybí
- A obvykle 2 nebo 3+3
- G obvykle (3)




plod bobule,  
obvykle  
jednosemenná

malé přímé  
embryo

menší  
endosperm

velký  
perisperm



*Piper Cubeba.*  
Vertical section of fruit  
(mag.).



*Piper nigrum.*  
Fruit cut vertically (mag.).


*Piper nigrum*  
Piperaceae  
G. K. Linney



# Pepřovník černý (*Piper nigrum*) – liánovitý keř z JV Asie, černý a bílý pepř = sušené bobule se slupkou nebo bez



Válcovité jehnědy až 15 cm dlouhé.



## Pepřovník betelový (*Piper betle*)

Malajci žvýkán s arekovými semeny a vápnem vypáleným z ulit měkkýšů. Stimulans při fyzické práci; tvoří červené sliny, jsou vyplivovány, takže místa žvýkání bývají dobře patrná. Zuby od betelu černají.




# Jihoamerické pepřovníky – např. *Piper geniculatum*, *P. caudatum* aj. využívány indiány k výrobě šípového nervového jedu **kurare**



*Phyllobates terribilis*



*Piper geniculatum*  
Piperaceae  
araudr@gmail.com



Links Curare-Bambusröhrchen, mit Bastfäden verschürt, im Original etwa 25 cm lang; in der Mitte Curare-Calebasse; rechts kleines Curare-Töpfchen, das mittels gekreuzter Bastbänder und Schnur an einem Pfeilkörper befestigt war.





*Peperomia argyreia*

Druhy rodu pepřinec (*Peperomia*) se pěstují v domácnostech pro listy (bez palistů) s okrasnou kresbou,


*Peperomia obtusifolia*



# **Aristolochiaceae – podražcovité**



9/490, nejodvozenější čeleď v rámci bazálních krytosemenných (především symetrií květů, srůsty květních částí a žilnatinou listů), kromě dřevin a lián často i **vytrvalé bylinky** vyskytující se od tropů a subtropů celého světa až po temperátní zónu.

U nás zastoupeny oba druhově nejbohatší rody čeledi *Asarum* a *Aristolochia*.



dřevo heteroxylární;  
 tracheje s **jednoduchou** perforací  
 pletiva se siličnými buňkami,  
 s éterickými oleji, terpenoidy a alkaloidy


široké mezisvazkové kambium tvoří široké parenchymatické paprsky mezi xylemem spojující trvale centrální dřeň s primární kůrou – tato struktura dodává zdřevnatělému liánovitému stonku elasticitu



listy

zpravidla jednoduché, střídavé, řapíkaté, bez palistů, mají **dlanitou žilnatinu** a často srdčitou bázi čepele.








květy

homochlamydní, obouohlavné, **cyklické, trojčetné, syntepalní**, aktinomorfní nebo **zygomorfní**, srostlé v esovitou trubku, často jednotlivé





*Aristolochia* **6 tyčinek**  
přirostlých k čnělce  
tvořících sloupek =  
gynostemium



*Asarum* **6+6 tyčinek** volných s  
mohutným konektivem


gyneceum  
semeník  
placentace

cénokarpní většinou ze 6 plodolistů, synkarpní  
**spodní**  
axilární,  
vajíček mnoho






plod většinou tobolka  
semeno s bohatým olejnatým  
endospermem a drobným  
embryem.



semeno



přehrádečná  
tobolka



## *Aristolochia galeata*

Květy se liší u rodů:

*Aristolochia*: P(3) A6, G(6) spodní



*Asarum*: P(3+3) A6+6, G(6) spodní




# *Asarum europaeum* pensum

## kopytník evropský


plazivý oddenek,  
stále zelené kožovité ledvinité listy,  
listnaté lesy a kroviny  
kvete v březnu a dubnu.

České jméno od tvaru listové čepele,  
připomínající koňské kopyto.

Vědecké jméno *Asarum* má různé etymologické výklady (řec. asaron = bez větví, řec. asé = hnus, ošklivost, řec. aséros = koberec atd.).




Rozemnuté listy voní kafram. **Jedovatý**, ale využívaný jako léčivka. Pepřovou až kafrovou chuť a zápach způsobuje silice tvořená z 30–35% jedovatým **asaronem**, ten působí místně dráždivě, po vstřebání ochrnuje cévy a CNS.



Po požití zvracení a silný průjem, podráždění ledvin, slabost, rozšíření zorniček, posléze smrt v kolapsu.

Sušený a na prášek utlučený - přísada do šňupavého tabáku.


Nenápadné přízemní květy často skryté pod spadaným listím slouží jako úkryt hmyzu nebo někdy i slimáků – kteří mohou přenášet pyl – **moluskogamie**.



slimák !

Podlouhlá semena mají olejnaté masíčko,

Masíčko je potravou pro mravence, kteří semena přenášejí a rostlinu tak rozšiřují – **myrmekochorie**.



Mnohé druhy podražců se pěstují pro bizarní tvary a zbarvení okvětí; u brazilské *A. gigantea* dosahují květy až 30 cm v průměru.

Jako léčivky se užívají evropský *Aristolochia clematitis* a severoamerický *A. serpentaria*, používaný dříve taky jako prostředek proti uštknutí chřestýšem.



*Aristolochia fimbriata*



*Aristolochia gigantea*

*Aristolochia littoralis*  
Aristolochiaceae  
G. K. Linney



*Aristolochia littoralis*  
Aristolochiaceae  
G. D. Carr



*Aristolochia elegans*



Dutchman's Pipe Vine  
(*Aristolochia elegans*)  
Jack Scheper  
© 2002 Floridata.com



*Aristolochia grandiflora*



*Aristolochia tricaudata*



*Aristolochia arborea*

V současném pojetí je do čel. *Aristolochiaceae* řazena i podčeleď *Hydnoroideae* (dříve samostatná čeleď) bizarních kořenových parazitických rostlin s masitým okvětím

