



Centrum pro výzkum  
toxických látek  
v prostředí

# Metody *in silico* stanovení výpočtem



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenční  
schopnost



UNIVERSITAS  
MASARYKIANA BRUNENSIS

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0213)  
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

# Predikční (eko)toxikologie odhad účinku pomocí alternativních metod

- metody stanovení (eko)toxicity chemických látok, které dosud nebyly testovány experimentálně – k určení toxickej vlastnosti látok bez použitia pokusných zvierať
- metody pre modelovanie toxicity smiesí
- využívajú shromáždené pokusné údaje a detailné charakteristiky chemické struktury látok
- na ich základe a zobecňovaním poznatkov vytvárajú expertné počítačové modely, pomocou nichž odhadujú toxicitu
- **expertní programy** pro odhad toxickej účinku výpočtom = súbory pravidiel, znalostí, údajov o toxickejch indexoch, statistického hodnocenia, výpočetných programov molekulových deskriptorov a metod matematickej statistiky
- !! K postaveniu dobrého modelu nutné široké súbory kvalitných dat !!



# *In silico* modely




## Modely pro odhad toxicity výpočtem (*in silico* testy):



- modely vytvořené a analyzované technikami QSAR
- kinetické fyziologické simulační modely (PBSM Physiologically-Based Simulation Models; PBPK Physiologically based pharmacokinetic Models)  
= Modely ADME - simulují kinetiku procesů v organismu, které zodpovídají za koncentraci účinné látky na místě účinku, tedy absorpci (A), distribuci (D), metabolismus (M) a exkreci (E). Modely pro různé organismy a různé způsoby expozice jsou rozlišeny fyziologickými parametry organismů.
- modely založené na biologické podobnosti (read-across)
- expertní systémy založené na souborech znalostí a pravidel
- modely vytvořené technikami molekulové grafiky
- kombinace různých modelů s umělou neuronovou sítí (Artificial Neural Network).



# Využití predikovaných dat pro hodnocení akvatické toxicity




Znalosti  
Rešerše...  
Zkušenosti...



Látka  
pravděpodobně  
toxická pro ...

## Predikovaná data

- Structure Activity Relationships (SARs)
- Cílem SAR je predikovat aktivitu/toxicitu látky – výsledky ověřitelné provedením experimentálních studií
  - Př. Toxicita obecně roste se vzrůstem  $K_{ow}$  pokud není příliš nízká rozpustnost
- Použití SAR je umožněno kompletací a revizí dat



# QSAR (Quantitative structure-activity relationship)

- kvantitativní modely vztahu struktury a aktivity látky
- předvídají vlastnosti chemických látok jako jejich toxický efekt či schopnost interakce s receptorem na základě jejich molekulárních struktur
- založeny na prostudování daného parametru (jako např. LC50, EC50, NOEC, log Kow, BCF nebo koncentrace způsobující subletální vliv) na skupině podobných látok (in vitro či in vivo), určení výsledných parametrů a postavení modelu vztahu strukturních charakteristik látky a sledovaného parametru
- mohou být použity k predikci toxicity (biologické aktivity, či jiných vlastností) např. u existujících látok, kde nejsou známy, i u látok, které dosud nebyly syntetizovány.

**QSARs představuje přístup, který poskytuje možnost podstatného snížení počtu potřebných toxikologických experimentů**



# Vztah toxicity a chemické struktury



## Statistické metody hodnocení toxicity

QSAR - quantitative structure-activity relationships

QSTR - quantitative structure-toxicity relationships

- Statistické hodnocení vlastností látek v chemických řadách
- Umožňují rychlý odhad toxicity (a dalších vlastností) látek na základě struktury a znalosti fyzikálních a chemických vlastností látky ze struktury vyplývajících.

SMP Toxicity vs. n-Alkanol Chain Length



# QSAR

## Quantitative Structure Activity Relationship

- Metoda odhadu biologického účinku na základě struktury látky – postavení QSAR modelu
- Účinek (aktivita) vs. set adekvátních deskriptorů
- Srovnání podobných skupin látek
- Studium založeno na různých strukturních parametrech
- Počítačová simulace/predikce toxicických, genotoxických a dalších účinků
- Aplikace korelací mezi vlastnostmi látky spojenými s molekulární stavbou a vlastnostmi spojenými s biologickým systémem
- Tyto vztahy je možno popsát matematickými vzorci nebo statisticky.

$$BA_i = f(X_i)$$



# Základní matematické vztahy

$$\text{Biologická Aktivita} = \text{konst} + (C_1 P_1) + (C_2 P_2) + (C_3 P_3) + \dots$$

**Biologická Aktivita** = Velikost (kvantita) biologického účinku

- Parametry z testu (LD50, stupeň kancerogenity, dráždivosti, rozložitelnosti... )

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

**r** - Korelační koeficient – r<sup>2</sup> nabývá hodnot 0 až 1.

## Molekulové deskriptory (P)

popisují strukturu molekuly látky či její vlastnosti

- teoretické vs. experimentální: velikost molekuly, molekulová hmotnost, počet a typ funkčních skupin, náboj molekuly, 3D struktura atd.
- fyzikálně-chemické vlastnosti: lipofilita, polarizovatelnost, bod varu, log P
- existuje několik tisíc deskriptorů




# QSAR: vztah-korelace aktivity/toxicity se strukturou


- Parametry toxicity z testu  $IC_{50}$ ,  $EC_{50}$
- Struktura namodelována v softwaru, získány deskriptory molekuly (velikost, tvar, polarita...)
- Vícerozměrnými statistickými metodami hledány vztahy a nalezen nejlepší model
- Možná predikce toxicity (vlastnosti) pro netestované látky podobné struktury

## Potence aza-PAHs k aktivaci AhR

$$\log(1/EC25) = 1.14 \text{ délka} - 2.12 \text{ planarita} + 2.82 \quad (R = .95)$$



$$\log(1/EC25) = 0.011 \text{ EllipsVol} + 1.544 \quad (R = 0.95)$$



# QSAR

- nutná validace modelu, statistické testy významnosti modelu

MODELOVACÍ DATA

TRENOVACÍ DATA

VALIDAČNÍ DATA

## QSAR – omezení využitelnosti

- Předpoklad působení shodným mechanismem
- Větší spolehlivost při interpolaci než extrapolaci

Nespecifická toxicita – především funkcí 3 hlavních vlastností látek

- Hydrofobicita
- Reaktivita
- Sterické faktory





## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Inovace tohoto předmětu je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem  
České republiky



Centrum pro výzkum  
toxických látek  
v prostředí